


Avdeling for øyesykdommer



72 57 53 00 (man-fre fra kl. 08.00-15.30)

eller 72 57 60 17 (kveld/natt/helg)

Ring eventuelt sentralbord – 72 57 30 00
(spør etter vakthavende øyelege)



Avdeling for øyesykdommer, St. Olavs hospital,
Harald Hardrådes gate 5, 7030 Trondheim
post.onh.kjeve.oye@stolav.no

www.stolav.no

Foto: Colourbox.com / Norsk Glaukomforening

02.10.19

PASIENTINFORMASJON

INFO OM BEHANDLING VED AMD (Aldersrelatert makuladegenerasjon)

Avdeling for øyesykdommer
St. Olavs hospital

INFO OM BEHANDLING VED ALDERSRELATERT MAKULADEGENERASJON - AMD

Makula er den gule flekken som er ansvarlig for skarpsynet. Med alderen endres makula, og det er disse endringene vi kaller aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD).

Det finnes 2 typer AMD – tørr og våt:

- *Tørr AMD* utvikler seg sakte over flere år og påvirker synet i lett til alvorlig grad og kan ikke behandles.
- *Våt AMD* utvikler seg raskt – i løpet av dager eller uker. Kan gi kraftig synstap. Synstapet skyldes nydannede blodkar under den gule flekk/skarpsynsfeltet. Man kan behandle med medisin som lukker de nydannede karene.

Behandling for våt AMD

- Vekstfaktorhemmere er en gruppe medisiner som lukker nydannede blodkar i skarpsynsfeltet.
- Det finnes 3 ulike medisiner på markedet i dag (Avastin, Eylea og Lucentis). Medisinen sprøytes inn i glasslegemet. Avastin er førstevalg ved St. Olavs hospital. Dette er et ikke-registrert preparat som er funnet likeverdig i store studier.
- Før behandling bedøves øyet med dråper. Selve innsprøytingen tar bare noen sekunder.
- Som regel gis behandlingen 3 ganger med 4 ukers mellomrom. Effekt vurderes 3-4 uker etter den 3. behandlingen. De fleste har behov for gjentatte behandlinger, ofte i flere år.

Før behandling

- Ta dine medisiner som vanlig - også blodfortynnende.
- **OBS! Slutt med øyesminke 1 dag før behandlingen**

- *Dersom du bruker øyedråper fra før, skal du ta disse som du pleier før og etter behandling – MEN: Husk å åpne nye flasker hver gang du har fått behandling!*
- *Pasienter med øyekatarr, forkjølelse, omgangssyke eller andre infeksjoner blir ikke behandlet før de er friske igjen. Dersom du har hatt hjerteinfarkt eller hjerneslag vil vi også utsette behandlingen. Ring oss på forhånd hvis du er i tvil!*

Etter behandling

- Etter behandlingen kan det oppstå forbigående ubehag – ruskfølelse i øyet.
- Komplikasjoner (utvikling av grå stær, netthinneavløsning, blødninger) er sjeldne. Den mest alvorlige komplikasjonen er kraftig infeksjon i hele øyet (endofthalmitt), men denne er meget sjelden – forekommer sjeldnere enn 1 av 1000 innsprøytinger, men kan gi varig sterk synssvekkelse.
- *Hvis det etter behandlingen oppstår problemer med smertefullt øye eller sterk synsnedsettelse, må du ringe Avdeling for øyesykdommer!*

Avslutte behandling

- Vi vil avslutte behandlingen når vi ser at du ikke lenger har nytte av den.
- Hvis det dannes arr i skarpsynsfeltet fungerer ikke denne delen lengre, og du har da ikke behov for behandlingen.
- Vi kan også forsøke å slutte med behandling hvis vi ser at behovet for sprøyter er lite. Det vil si at du trenger sprøyter sjeldnere enn hver 12. uke.
- Sidesynet ditt vil ikke rammes av denne sykdommen.