

BIDRAG TIL KUNDSKABEN
OM
COLEOPTERFAUNAEN

I DET TRONDHJEMSKE

AF

B. LYSHOLM

II

DET KGL. NORSKE VIDENSKABERS SELSKABS SKRIFTER, 1899. NO. 1

AKTIETRYKKERIEET I TRONDHJEM
1899

BIBLAG TIL KUNDSKABEN

COLLEOPTERFAUNAN

I DET TRODDELSKE

B. LYSBOM

II

DET KGL. ROSETE VIDEENSKABE, KJØBENHAVN, 1880

LAGT I TRYK I KJØBENHAVN

1880

Denne fortegnelse, der er fortsættelse af det i selskabets skrifter for 1896 begyndte „bidrag til kundskaben om coleopterfaunaen i det Trondhjemske“, vil behandle staphyliniderne. — Desuden kan jeg allerede efter 3 år supplere min første fortegnelse med 26 for den Trondhjemske fauna nye arter. Heraf hører 16 til carabiderne, 7 til dytisciderne, 2 til hydrophiliderne og 2 til parriderne.

Carabidæ.

Carabus L.

C. nemoralis Müll.

Ved forglemmelse udeladt i forrige fortegnelse. Den er af Storm gjentagne gange fundet på vestsiden af byen. På østsiden synes den at mangle. Den har her vistnok nået sin nordgrænse.

Dyschirius Bon.

D. globosus Herbst.

Sj. Fundet i Stjørdalen ved elvens udløb.

Elaphrus F.

E. uliginosus F.

Sj. Fundet enkeltvis østenfor byen. Af Storm taget i Mostadmarken.

Platynus Bon.

P. sexpunctatus L. udgår af faunaen.

P. micans Nicol.

Sj. Etpar eksemplarer ved Kropelven nedenfor Selsbak, Juni 1898. Tidligere kun fundet i det sydlige af landet, ved Kongsvinger og i Vestfjorddalen.

P. fuliginosus Panz.

Sj. Et enkelt exemplar fundet sammen med foregående art.

Bembidion Latr.

B. prasinum Duft.

Sj. Etpar exemplarer ved Kropelven nedenfor Selsbak, Juni 1898.

B. Schüppelii Dej.

Fundet hist og her i byens omegn.

Denne art er også fundet flere steder i det arktiske Norge (Saltdalen, Målselven, Malangen). Søndenfjelds er den mig bekjendt ikke fundet.

B. dentellum Thunb.

Sj. Et enkelt exemplar ved Mølledammen nedenfor Selsbak, August 1898.

Denne art er hidtil her i landel kun fundet hist og her i det sydlige.

Pterostichus Bon.

Pt. diligens Sturm.

Sj. Etpar exemplarer i byens omegn. Af Storm fundet i Mostadmarken.

Harpalus Latr.

H. 4-punctatus Dej. (= seriepunctatus Gyll.)

Denne art er af Storm fundet enkeltvis i byens gader.

H. luteicornis Duft.

Sj. Fundet enkeltvis i byens omegn.

Amara Bon.

A. nitida Sturm. var. Güntheri J. Sahlb.

Sj. Fundet etpar gange tidligt om våren i byens nærmeste omegn.

Denne sjeldne varietet er hertillands tidligere kun fundet ved Kragerø af skolebestyrer Ullmann. Hovedformen er kun fundet enkeltvis ved Christiania af Helliesen.

A. communis Panz.

Alm. overalt. Ved forglemmelse udeladt i forrige fortegnelse.

A. prætermissa Sahlb.

Sj. Et enkelt exemplar fundet østenfor byen.

A. interstitialis Dej.

Sj. Etpar exemplarer østenfor byen, Juni 1898. 1 exemplar ved Levanger og 1 ved Stenkjær 1897.

Denne utvivlsomt arktiske art er ifølge Sparre-Schneider almindelig udbredt i Tromsø og Nordlands amter. Søndenfor polar-cirkelen var den hidtil kun fundet i Jotunfjeldene af Münster.

A. consularis Dej.

Tml. sj. Fundet i byens nærmeste omegn. Denne art er ikke sj. i det sydlige af landet; i det nordlige er den hidtil kun fundet meget sj. i Saltdalen af Hagemann.

Dytiseidæ.

Coelambus Thoms.

C. novemlineatus Steph.

Sj. Et enkelt exemplar i tjern ved Johnsvandet 1897. Hidtil kun fundet i det sydlige Norge.

Hydroporus Clair.

H. fuscipennis Schaum.

Sj. Et enkelt exemplar i en liden dam ved Christiansten. Denne art er hidtil hertillands kun taget i Varanger af Sommerfeldt.

H. melanocephalus Gyll.

Sj. Et enkelt exemplar i byens omegn.

H. striola Gyll.

Sj. Etpar exemplarer i byens nærmeste omegn.

Ilybius Er.

I. aenescens Thoms.

Taget på Fondfjeldet i Meraker. Hidtil kun fundet i det sydlige af landet.

Agabus Leach.

A. Sturmii Gyll.

Fundet alm. i en dam på Kalvskindet. Af Storm taget i Mostadmarken. Hidtil ikke fundet nordenfor Dovre.

Rantus Lac.

R. bistriatus Er.

Etpar exemplarer i Stjørdalen 1897.

Hydrophilidæ.

Ochthebius Leach.

O. riparius Ill.

1 exemplar i en dam østenfor byen, Mai 1897. Flere eksemplarer ved Johnsvandet, Juni 1898. Hidtil kun fundet i det sydlige af landet.

Parnidæ.

Elmis Latr.

E. Volkmar Panz.

Sj. Etpar eksemplarer ved Kropelven, August 1898. Hidtil hertillands kun fundet ved Christiania og i Telemarken.

Lareynia Duv.

L. œnea Müll.

Sj. Etpar eksemplarer ved Kropelven, August 1898. Hidtil kun fundet i det sydlige.

Staphylinidæ.

Ocalea Er.

O. picata Steph.

Sj. Et exemplar fundet i fjæren under tang østenfor byen, April 1895.

Af denne sydlige art er hidtil hertillands kun et enkelt exemplar taget ved Drøbak af konservator Helliessen. I Sverige er den også kun fundet i det sydligste. Arten har vistnok her nået sin nordgrænse.

**O. rivularis* Mill.

1 enkelt exemplar i byens nærmeste omegn 1895. Ny for såvel Norges som hele Skandinaviens fauna. Denne art er hidtil kun iagttaget i Skotland og i Syd- og Mellem-Europa.

Acrostiba Thoms.

A. borealis Thoms.

Sj. Et enkelt exemplar fundet på blomstrende hæg østenfor byen 1893.

Denne meget sj. og utvivlsomt arktiske art er hidtil hertillands

kun fundet i det nordlige af Sparre-Schneider (ved Trondenæs og i Målselven).

Ischnoglossa Kraatz.

**I. prolixa* Grav.

I enkelt exemplar under barken af en rådden granstub ved Johnsvandet, August 1897. Ny for landets fauna.

Thiasophila Kraatz.

**Th. angulata* Er.

Ikke sj. i myretuer i byens omegn. Ny for landets fauna.

Oxypoda Mannh.

O. ruficornis Gyll.

Sj. Et enkelt exemplar østenfor byen, Juni 1894. I Norge er den hidtil kun fundet ved Christiania.

O. vittata Märk.

Sj. Et exemplar på murvæg i byen, Oktober 1896. Denne sydlige art er tidligere hertillands kun fundet ved Christiania. I Sverige og Finland er den også kun iagttaget i det sydlige.

**O. lateralis* Mannh.

Ikke sj. under mos og i sop i byens nærmeste omegn. Ny for faunaen. Denne art er i Sverige kun fundet i det sydlige og i Finland kun til 62^o.

O. opaca Grav.

Denne art er alm. udbredt overalt fra tidligt om våren til senhøstes.

O. umbrata Gyll.

Tml. sj. Dog fundet hist og her.

O. exoleta Er.

Sj. Et enkelt exemplar østenfor byen 1893. Tidligere kun fundet hertillands ved Kristiania af Helliesen. I Sverige er den kun fundet i Skåne.

O. longiracula Grav.

Sj. Fundet enkeltvis etpar gange i byens nærmeste omegn.

O. hæmorrhœa Sahlb.

Ikke sj. Oftest fundet i myretuer. Den er tidligere i Norge kun iagttaget ved Drøbak og Kristiania.

O. alternans Grav.

Alm. i raadden sop om høsten. Hidtil kun iagttaget i det sydlige Norge.

O. annularis Sahlb.

Tml. sj. Oftest fundet under mos i skov. Hidtil hertillands kun fundet ved Kristiania.

Aleochara Grav.*A. brevipennis* Grav.

Forekommer hist og her. Ikke alm.

A. bipunctata Ol.

Sj. Fundet under rådrende plantedele på østsiden af byen samt ved Vangvik på nordsiden af fjorden. Hidtil kun fundet i det sydlige af landet. I Sverige og Finland også kun iagttaget i det sydlige.

A. morion Grav.

Ikke sj. under rådrende dyre- og plantestoffe. Hidtil kun iagttaget i landets sydlige del.

A. lanuginosa Grav.

Tml. alm. overalt.

A. succicola Thoms.

Tml. s'. Dog fundet hist og her i byens omegn.

A. moesta Grav.

Tml. alm. overalt.

A. moerens Gyll.

Alm., især om høsten i rådden sop.

A. bilineata Gyll.

Sj. Et enkelt exemplar fundet krybende over veien østenfor byen, 1893.

A. nitida Grav.

Tml. sj. Fundet i byens nærmeste omegn og ved Levanger.

Polystoma Steph.*P. algarum* Fauv. (= *grisea* Thoms.)

Tml. sj. Fundet i fjæren under tang på østsiden af byen. Hidtil kun fundet i det sydligste Norge.

P. grisea Kr.

Tml. sj. Fundet sammen med foregående. Den er hidtil hertillands kun iagttaget på Jomfruland af Ullmann.

Dinarda Mannh.*D. Märkeli* Kiesw.

Ikke alm. i myretuer. Ny for landets fauna. Vil dog vistnok ligesom de øvrige omkring Trondhjem fundne myrmecophile coleoptera kunne påvises over størsteparten af gebetet, når myretuernes fauna blir gjenstand for systematisk undersøgelse.

Myrmedonia Er.*M. humeralis* Grav.

Ikke sj. under mos og stene, især i nærheden af myretuer.

Drusilla Leach.*D. canaliculata* F.

Alm. Forekommer ligesom forrige art helst i nærheden af myretuer.

Aleuonota Thoms.*A. macella* Er.

Sj. Etpar exemplarer fundet under sten ved Kropelven tidligt om våren. Denne art er hidtil hertillands kun fundet ved Kristiania af Helliesen. I Sverige er den kun fundet i Skåne. Arten tilhører egentlig Mellern-Europa, hvor den imidlertid også er meget sjelden.

Halobrechtha Thoms.**H. flavipes* Thoms. (= *atricilla* Er.)

Ikke sj. i fjæren under tang sammen med *Liogluta vestita*. Ny for landets fauna.

Notothecta Thoms.*N. flavipes* Grav.

Ikke sj. i myretuer. Hidtil eneste kjendte findested hertillands.

**N. anceps* Er.

Ikke sj. i myretuer sammen med foregående. Ny for landets fauna. I Sverige er denne art kun fundet i det sydlige.

Colpodota Rey.*C. sordida* Marsh.

Ikke sj. under rådnende dyre- og planterester.

C. aterrima Grav.

Tml. alm. overalt.

**C. parva* Sahlb.

Tml. sj. i gjødsel og rådnende plantedele. Ny for landets fauna. I Sverige er denne art kun fundet i det sydlige.

C. fungi Grav.

Meget alm. overalt.

C. orphana Er.

Sj. Fundet etpar gange under mos i byens omegn. Den er hidtil hertillands kun fundet ved Tromsø af Sparre-Schneider.

C. subsinuata Er.

Ikke sj. i mos og under rågnende vegetabilier. Hidtil kun fundet i det sydligste af landet.

Amischa Thoms.

A. analis Grav.

Meget alm., særlig tidligt om våren under stene og i mos.

A. cavifrons Sharp.

Sammen med foregående, men sjældnere. Den er hidtil kun iagttaget i det sydlige; i Sverige kun i Skåne.

A. talpa Heer.

Alm. i myretuer. Hidtil hertillands kun iagttaget i Ryfylke af Helliesen.

**A. exilis* Er.

Sj. tidligt om våren under stene. Ny for landets fauna. I Sverige er den kun iagttaget i Skåne.

Geostiba Thoms.

G. circellaris Grav.

Meget alm. overalt.

Dadobia Thoms.

D. immersa Er.

Sj. Fundet etpar gange under bark i byens omegn. Tidligere er den her i landet kun fundet i Ryfylke af Helliesen.

Dinaræa Thoms.

D. linearis Grav.

Sj. Et enkelt eksemplar i byens omegn. Ny for landets fauna.

Den er fundet i det sydlige og mellemste Sverige. I Finland går den ikke længere nord end til 62°.

Liogluta Thoms.

L. granigera Kiesw.

Ikke sj., særlig under mos.

L. nitidula Kr.

Sj. Etpar eksemplarer i byens omegn. Hidtil hertillands kun fundet i det sydlige.

L. graminicola Grav.

Tml. sj. I større mængde har jeg taget den ved Kropelven ved Selsbak.

L. vestita Grav.

Alm. i fjæren under opkastet tang.

Atheta Thoms.

A. euryptera Steph.

Tml. alm. overalt, særlig i udsivende træsaft og i sop.

A. diversa Sharp.

Fundet i byens omegn om høsten i rådrende sop. Tidligere hertillands kun fundet ved Tromsø af Sparre-Schneider.

A. trimotata Kr.

Tml. alm. overalt.

A. xanthopus Thoms.

Sj. Et enkelt eksemplar i byens omegn. Hidtil hertillands kun fundet ved Drøbak.

**A. pilicornis* Thoms.

Ikke sj. i sop om høsten i byens omegn. Ny for landets fauna. Synes at mangle både i det nordlige Sverige og Finland.

A. crassicornis F.

Ikke sj. om høsten i sop. Hidtil kun iagttaget hertillands i det sydlige.

A. nitidicollis Fairm.

Sj. Fundet i byens omegn i sop. Er også tidligere kun iagttaget i det sydlige af landet.

A. debilis Er.

Sj. Fundet under stene ved Kropelven tidligt om våren. Ny for landets fauna.

A. islandica Kr.

Sj. Etpar exemplarer ved Kropelven 1898. Denne art er i det arktiske Norge meget udbredt. I det søndenfjeldske er den ikke iagttaget.

A. elongatula Grav.

Alm. overalt. Hidtil hertillands kun fundet i det sydlige.

A. melanocera Thoms.

Forekommer ofte sammen med forrige art, men er sjeldnere.

**A. luridipennis* Thoms.

Sj. Dog fundet hist og her i byens omegn. Ny for landets fauna. I Sverige er denne art kun iagttaget i det sydligste. I Finland går den derimod helt op til 66°.

A. atramentaria Gyll.

Meget alm. overalt.

A. picipennis Mannh.

Alm. overalt, særlig under rådrende plantedele.

A. longicornis Grav.

Alm. overalt.

A. cauta Er.

Ikke sj. i gjødsel og rådrende plantedele.

A. sordidula Er.

Sj. Fundet i gjødsel i byens omegn.

A. celata Er.

Ikke sj. under mos og rådrende plantedele.

A. excellens Kr.

Tml. sj. Fundet i rådden sop i byens omegn. Hidtil hertillands kun fundet på Hillesø i Nordland af Sparre-Schneider.

A. monticola Thoms.

Ikke sj. i rådden sop i byens omegn. Hidtil kun fundet i det sydlige af landet.

A. corvina Thoms.

Sj. Etpar exemplarer østenfor byen, høsten 1898. Den er tidligere hertillands kun taget ved Kragerø af Ullmann.

Aloconota Thoms.*A. sulcifrons* Steph.

Denne art har jeg fundet af og til i byens omegn, særlig tid-

ligt om våren under stene på fugtige steder. Den er tidligere hertillands kun taget ved Kristiania af Helliesen. I Sverige er den kun iagttaget i Skåne.

A. currax Kr.

Fundet i temmelig stort antal under stene langs Kropelven. Det eneste kjendte findested i Skandinavien har hidtil været Kristiania, hvor den er taget af Helliesen.

A. gregaria Er.

Tml. alm. på fugtige steder.

Gnypeta Thoms.

G. carbonaria Mannh.

Sj. Etpar exemplarer ved Kropelven.

Thinonoma Thoms.

**Th. concolor* Er

Sj. Et enkelt exemplar fundet ved Kropelven, Juni 1898. Ny for såvel landets som hele Skandinaviens fauna. I Finland er den kun fundet i et enkelt exemplar. Arten tilhører egentlig Mellem-Europa.

Ischnopoda Thoms.

I. coerulea Sahlb.

Sj. Fundet i byens omegn.

I. leucopus Marsh.

Denne art, der altid opføres som sjelden, har jeg på enkelte steder i byens omegn, f. ex. ved en mølledam i nærheden af Selsbak, fundet i mængde.

Falagria Steph.

F. sulcata Payk.

Alm. overalt.

Autalia Steph.

A. puncticollis Sharp.

Tml. sj. Fundet af og til under rådrende plantedele og i hestegjødse. Hidtil hertillands kun fundet i Ryfylke af Helliesen.

Bolitochara Mannh.

B. lunulata Payk.

Sj. Fundet i sop i byens omegn. Ligeledes taget i Meraker. Hidtil hertillands ikke fundet nordenfor Dovre.

Leptusa Kr.

L. angusta Aub.

Ikke sj. under bark i byens omegn.

L. hæmorrhoidalis Heer.

Fundet sammen med foregående, men sjeldnere. Hidtil hertillands kun fundet i det sydlige.

Homalota Mannh.

H. plana Gyll.

Sj. Fundet i byens omegn. Hertillands er den tidligere kun fundet i det sydlige.

Placusa Er.

**Pl. infima* Er.

Sj. Fundet etpar gange i byens omegn. Ligeledes taget i Selbu. Ny for landets fauna. I Sverige er denne art ikke iagttaget nordenfor Stockholm.

Gyrophæna Mannh.

G. affinis Sahlb.

Ikke sj. i træsof i byens omegn. Hidtil hertillands kun iagttaget i det sydlige.

G. nana Payk.

Tml. alm. overalt. Denne art er også tidligere kun fundet i det sydlige.

G. manca Er.

Tml. sj. Hidtil hertillands kun fundet i Hitterdal af Helliesen.

G. boleti L.

Ikke sj. i træsof. Hertillands tidligere kun iagttaget i det sydlige.

Gymnusa Grav.

**G. variegata* Kiesw.

Af denne sjeldne art fandt jeg i Juni 1898 ved hovning græsset endel exemplarer nedenfor Selsbak. Ny for landets fauna. I Sverige er den kun fundet i Dalarne.

Oligota Mannh.

O. pusillima Grav.

Sj. Fundet på østsiden af byen under rådrende vegetabilier.

Trichophya Mannh.

T. pilicornis Gyll.

Sj. Et enkelt exemplar østenfor byen, Juni 1897. Hertillands er den tidligere taget ved Kristiania af Thomson.

Leucoparyphus Kr.

L. silphoides L.

Tml. sj. i byens omegn. Fundet i hestegjødse. Hidtil er den her i landet kun fundet i det sydlige. I Sverige og Finland er den også kun iagttaget i det sydlige.

Tachinus Grav.

T. flavipes Fab.

Tml. alm. overalt.

T. proximus Kr.

Tml. alm. overalt.

T. pallipes Grav.

Ikke sj. under rådne plantestoffer.

T. rufipes De Geer.

Alm. overalt.

T. laticollis Grav.

Ikke sj. i gjødse og under rådne plantedele.

T. collaris Grav.

Alm. overalt, særlig under stene på fugtige steder.

T. marginellus Fab.

Tml. alm. overalt.

T. elongatus Gyll.

Tml. sj.

Tachyporus Grav.

T. chrysomelinus L.

Meget alm. overalt.

T. obtusus L.

Tml. sj. Dog fundet hist og her i byens omegn.

T. pusillus Grav.

Tml. sj.

T. nitidulus F.

Tml. sj. Fundet i byens omegn under mos om høsten.

T. macropterus Steph.

Ikke alm. Fundet hist og her i byens omegn.

T. atriceps Steph.

Tml. sj. Fundet under mos på østsiden af byen. Denne art er tidligere hertillands kun taget ved Stavanger og Kragerø.

Conurus Steph.*C. littoreus* L.

Tml. sj. Fundet i byens omegn samt ved Stenkjær. Hertillands er denne art tidligere kun iagttaget i det sydlige. I Sverige og Finland er den heller ikke taget så langt nord.

C. pedicularius Grav.

Tml. sj. Fundet hist og her i byens omegn, særlig tidligt om våren under stene. Tidligere hertillands kun fundet ved Kristiania. I Sverige og Finland er den også kun iagttaget i det sydlige.

Bolitobius Steph.*B. lunulatus.*

Ikke sj. i rådden sop.

B. trinotatus Er.

Sj. Etpar eksemplarer i sop på østsiden af byen. Denne art er tidligere her i landet kun taget i det sydligste. I Sverige er den kun iagttaget i Skåne og på Øland.

B. pygmæus F.

Alm. overalt i søp.

Mycetoporus Mannh.*M. splendidus* Grav.

Ikke sj. Fundet hist og her i byens omegn.

M. nanus Er.

Tml. sj. Denne art er tidligere hertillands kun iagttaget på Dovre.

M. brunneus Marsh.

Tml. alm. overalt.

**M. clavicornis* Steph.

Tml. sj. Fundet på byens østside. Ny for landets fauna. I Sverige er den kun fundet i Skåne. I Finland også kun i det sydlige.

Heterothops Steph.*H. IV-punctula* Grav.

Sj. Et enkelt exemplar på østsiden af byen, Juni 1897. Hidtil her i landet kun fundet i det sydlige.

Qvedius Leach.*Q. brevis* Er.

Tml. sj. Fundet i myretuer i byens omegn. Hidtil hertillands kun fundet i Finmarken.

**Q. fulgidus* F.

Sj. Et enkelt exemplar på østsiden af byen. Ny for landets fauna.

Q. mesomelinus Marsh.

Ikke sj. Fundet hist og her i byens omegn.

Q. lævigatus Gyll.

Ikke sj. under bark.

Q. fuliginosus Grav.

Tml. sj. Fundet på østsiden af byen og i Hommelvik. Hidtil ikke fundet nordenfor Dovre. I Sverige og Finland kun iagttaget i det sydlige.

Q. molochinus Grav.

Alm. overalt.

Q. umbrinus Er.

Tml. alm.

Q. maurorufus Grav.

Tml. sj. under mos.

Q. attenuatus Gyll.

Sj. Fundet under mos på Ladehammeren.

Q. boops Grav.

Alm. overalt.

Creophilus Mannh.*C. maxillosus* L.

Alm. overalt.

Leistotrophus Perty.*L. murinus* L.

Alm. overalt.

Staphylinus L.

St. pubescens De Geer.

Alm. overalt.

St. erythropterus L.

Tml. alm.

St. caesareus Cederh.

Sj. Storm har for flere år siden taget et enkelt exemplar på nordsiden af fjorden.

Ocypus Kirby.

O. fuscatus Grav.

Alm. overalt. Hidtil nordligste kjendte findested hertillands.

O. aeneocephalus De Geer.

Sj. Et enkelt exemplar taget af Storm på Ladehammeren, Mai 1898. Denne art var hidtil hertillands kun iagttaget i det sydlige.

Cafius Steph.

C. xantholoma Grav.

Alm. i fjæren under tang.

Philontus Curtis.

Ph. puella Nordm.

Sj. Endel exemplarer fundet under rådrende vegetabilier på østsiden af byen.

Ph. splendens F.

Tml. alm. overalt.

Ph. laminatus Creutz.

Tml. alm. overalt.

Ph. nitidus F.

Tml. alm., særlig i hestegjødse.

Ph. chaldeus Steph.

Sj. Etpar exemplarer taget på østsiden af byen. Hidtil hertillands kun iagttaget i det sydlige.

Ph. politus L.

Meget alm. overalt.

Ph. cephalotes Grav.

Alm. overalt.

Ph. sordidus Grav.

Alm. overalt.

Ph. debilis Grav.

Ikke sj. Hidtil hertillands ikke fundet nordligere end til Valders.

Ph. discoideus Grav.

Tml. sj. Hyppigst fundet på mistbænker. Den er hidtil kun fundet i det sydlige.

Ph. concinnus Grav.

Alm. overalt.

Ph. sanguinolentus Grav.

Tml. sj. Hidtil kun fundet i det sydlige.

Ph. fimetarius Grav.

Alm. overalt.

Ph. nigritulus Grav.

Alm. overalt.

Ph. trossulus Nordm.

Sj. Et enkelt exemplar østenfor byen, 1897.

Ph. decorus Grav.

Alm. overalt.

Ph. fuscipennis Mannh.

Alm. overalt.

Ph. varius Gyll.

Tml. sj.

Ph. marginatus Müll.

Alm. overalt.

Ph. varians Payk.

Alm. overalt.

Ph. albipes Grav.

Tml. sj. Hyppigst fundet på mistbænker i byens omegn. Hidtil hertillands ikke fundet så langt mod nord.

Ph. micans Grav.

Sj. Et exemplar ved Stenkjær, Juni 1899.

Othius Steph.

O. fulvipennis F.

Sj. Et enkelt exemplar under mos på Gevingåsen ved Hommelvik, Juni 1898. Hidtil hertillands kun iagttaget i det sydligste.

O. melanocephalus Grav.

Sj. Et enkelt exemplar under mos i Ihlsvigen, September 1898.
Hidtil ikke iagttaget nordenfor Dovre.

O. myrmecophilus Kiesw.

Tml. alm. overalt.

O. lapidicola Kiesw.

Tml. sj. Etpar exemplarer østenfor byen.

Baptolinus Kraatz.

B. pilicornis Payk.

Ikke sj. under bark hist og her i byens omegn.

B. affinis Payk.

Sj. Et enkelt fundet på en murvæg i byen, 1895. Hidtil kun iagttaget i det sydlige af landet.

Leptacinus Erichs.

L. batychnus Gyll.

Tml. alm. Hidtil kun iagttaget i det sydlige.

L. lineatus Grav.

Tml. sj. under rådrende vegetabilier i byens omegn. Hidtil var den hertillands kun taget ved Kristiania af Münster.

L. formicetorum Märk.

Ikke sj. i myretuer. Hidtil eneste kjendte findested hertillands.

Eulissus Mannh.

E. fulgidus F.

Sj. Taget i et drivhus på Kalvskindet af Storm, 1897.

Xantholinus Serv.

X. punctulatus Payk.

Alm. overalt.

X. atratus Heer.

Ikke sj. i myretuer. Hidtil kun fundet i det sydlige af landet.

X. angustatus Steph.

Tml. alm. overalt.

X. tricolor F.

Alm. overalt.

Cryptobium Mannh.*C. fracticorne* Payk.

Sj. Et exemplar ved Levanger, Juni 1895. Hidtil hertillands ikke fundet nordenfor Dovre.

Lathrobium Grav.*L. brunnipes* F.

Tml. sj. Dog fundet hist og her i byens omegn.

L. elongatum L.

Tml. alm. overalt.

L. fulvipenne Grav.

Alm. overalt.

L. longulum Grav.

Tml. sj. Etpar exemplarer på østsiden af byen.

L. quadratum Payk.

Sj. Etpar exemplarer ved Selbusjøen, Juli 1898.

L. terminatum Grav.

Sj. Et enkelt exemplar under mos på Gevingåsen ved Hommelvik, Juni 1898.

Medon Steph.*M. ochraceus* Grav.

Sj. Et enkelt exemplar på mistbænk østenfor byen. Hidtil hertillands kun fundet ved Kristiania.

Stilicium Latr.*S. rufipes* Germ.

Tml. sj. Fundet i mængde under tang i fjæren østenfor byen. Hidtil kun iagttaget i det sydlige.

Dianous Sam.*D. coeruleascens* Gyll.

Tml. sj. Fundet i byens nærmeste omegn, i Vangvik på nordsiden af fjorden og ved Stenkjær. Hidtil hertillands kun iagttaget i det sydlige.

Stenus Latr.*S. nanus* Steph.

Tml. alm. i byens nærmeste omegn. Hidtil ikke fundet i det nordlige Norge.

S. carbonarius Gyll.

Alm. overalt.

S. clavicornis Scop.

Alm. overalt.

S. Juno F.

Ikke alm. Hyppigst og i størst mængde fundet ved Kropelven nedenfor Selsbak.

S. fasciculatus J. Sahlb.

Sj. Etpar eksemplarer ved Levanger, 1895.

S. bupthalmus Grav.

Tml. alm. overalt.

S. canaliculatus Gyll.

Tml. sj. Fundet i byens omegn, i Stjørdalen og ved Stenkjær.

S. palposus Zett.

Tml. sj. i byens omegn.

S. fuscipes Grav.

Tml. sj. Hidtil kun fundet i det sydlige.

S. crassus Steph.

Alm. overalt.

S. nigritulus Gyll.

Sj. Et enkelt eksemplar i Meraker, 1896.

S. fulvicornis Steph.

Sj. Et enkelt eksemplar i byens nærmeste omegn. Hidtil her- tillands kun taget ved Kristiania. I Sverige og Finland kun fundet i det sydlige.

S. tarsalis Ljungh.

Tml. alm. overalt.

S. similis Herbst.

Alm. overalt.

S. binotatus Ljungh.

Tml. sj. Fundet i større mængde ved Selsbak.

S. bifoveolatus Gyll.

Alm. overalt.

S. nitidiusculus Steph.

Sj. Et eksemplar fundet ved Levanger, Mai 1895. Hidtil her- tillands kun fundet ved Stavanger af Helliesen.

S. impressus Germ.

Tml. alm. i byens omegn.

S. geniculatus Grav.

Fundet ganske alm. i byens omegn. Ligeledes taget på Levanger.

S. Erichsoni Rye.

Ikke sj. under mos i byens omegn. Mærkelig nok er denne egentlig sydlige art hidtil hertillands kun taget i Finmarken af Sparre-Schneider.

Euaesthetus Grav.

Eu. bipunctatus Ljungh.

Tml. sj. Fundet i byens omegn tidligt om våren under sten.

Platysthetus Mannh.

P. arenarius Fourcr.

Alm. overalt.

Oxytelus Grav.

O. rugosus F.

Meget alm. overalt.

O. laqueatus Marsh.

Alm. overalt.

O. nitidulus Grav.

Tml. alm.

Haploderus Steph.

H. caelatus Grav.

Alm. overalt.

Bledius Mannh.

B. fracticornis Payk.

Sj. Et exemplar fundet ved Stenkjær, Juni 1896. Denne art er hidtil hertillands ikke fundet nordenfor Dovre.

Trogophloeus Mannh.

T. corticinus Grav.

Ikke alm. Fundet hist og her østenfor byen. Hidtil hertillands kun fundet i det sydlige.

T. elongatulus Er.

Tml. sj. Fundet i mængde under sten langs bækken på Hladehammeren. Hidtil kun fundet i det sydlige af landet.

T. pusillus Grav.

Tml. alm. under rådrende vegetabilier. Denne art er også hidtil kun fundet i det sydlige.

Geodromicus Redt.

G. plagiatus F.

Sj. Fundet langs Nidelven og i Ørkedalen.

Lesteva Latr.

L. pubescens Mannh.

Tml. sj. på fugtige steder.

L. longelytrata Goeze.

† ml. sj. Fundet i fjæren under sten på østsiden af byen.

Olophrum Er.

O. piceum Gyll.

Ikke alm. Særlig tidlig om våren og senhøstes under sten og mos.

O. boreale Payk.

Sj. Fundet i sop senhøstes i Ilsvigen.

O. consimile Gyll.

Sj. Et exemplar ved Hommelvik, Mai 1895.

Deliphrum Er.

D. tectum Payk.

Alm. overalt i gjødsel og rådrende sop.

Lathrimaeum Er.

L. melanocephalum Ill.

Sj. Etpar eksemplarer i Ilsvigparken, September 1898. Hidtil hertillands kun fundet ved Kragerø af Ullmann.

Acidota Steph.

A. cruentata Mannh.

Ikke alm. Især senhøstes. Hidtil hertillands kun iagttaget i det sydligste.

A. crenata F.

Sj. Fundet ved Skjækervandet ved Stenkjær.

Arpedium Er.

A. brachypterum Grav.

Tml. alm. under mos.

Micralymma Westw.

M. marinum Strøm.

Sj. Etpar eksemplarer østenfor byen.

Xylodromus Heer.

X. concinnus Marsh.

Tml. sj. Etpar eksemplarer østenfor byen. Hidtil hertillands kun fundet ved Kristiania.

X. depressus Grav.

Ikke alm. Særlig senhøstes.

Omalium Grav.

O. lapponicum Zett.

Tml. sj. under bark. Fundet i byens omegn og i Selbo.

O. monilicorne Gyll.

Sj. Fundet under granbark ved Johnsvandet. Hidtil hertillands ikke fundet nordenfor Dovre.

O. pusillum Grav.

Tml. sj. under bark.

O. rivulare Payk.

Meget alm. overalt.

O. riparium Thoms.

Ikke sj. under tang i fjæren østenfor byen.

O. cæsum Grav.

Tml. sj. Særlig fundet senhøstes på murvægge i byen. Hidtil hertillands kun fundet på Døvre og ved Tromsø.

O. florale Payk.

Tml. alm. overalt. Hidtil hertillands kun fundet i det sydlige.

Acrulia Thoms.

A. inflata Gyll.

Sj. Etpar eksemplarer i rådden sop østenfor byen, August 1895.

Anthobium Steph.

A. sorbi Gyll.

Tml. alm. Særlig på blomstrende hæg og rogn.

A. minutum F.

Alm. overalt.

Protinus Latr.

P. brachypterus F.

Ikke alm. i rådnende sop

P. atomarius Er.

Sj. Et enkelt exemplar østenfor byen, August 1895. Hidtil hertillands kun fundet ved Drøbak og i Ryfylke.

Megarthus Steph.

M. depressus Payk.

Tml. alm. under rådnende plantedele.

M. sinuatocollis Lac.

Sammen med foregående, men sjeldnere.

M. denticollis Beck.

Sj. Etpar exemplarer østenfor byen. Hidtil var den hertillands kun fundet i det sydlige.

Phloeocharis Mannh.

Ph. subtilissima Mannh.

Tml. alm. under bark. Hidtil hertillands kun fundet i Ryfylke af Helliesen.

Forts.