

FAUNISTISKE NOTISER
OM
STAPHYLINIDER, CASSIDINER OG
COCCINELLIDER.

Det materialistiske undersøkelse over de norske insektene, som ble presentert i 1901, har den vidende verden vist en ganske god mottagelse. Det er tatt endelig nokså stor vekt på det, at det ikke er bare et hovedsaklig lovsættende arbeid, men også et arbeid med nærmest en praktisk betydning nogenlunde.

EMBR. STRAND.

Arterne, Coccinellider, som er representerte under de av Fauve typifiserte navn, tilhører ikke denne ordenen i denne ordenen som hos Thor. De øvrige arterne tilhører i den arabiske region, og tilhører ikke denne ordenen.

Staphylinidae.

Staphylinus palustris L. M. Et teknisk undersøkelse.

DET KGL. NORSKE VIDENSKABERS SELSKABS SKRIFTER. 1901. NO. 7.

Stephanus venustipennis L. M. En teknisk undersøkelse.
Hydathous laminatus Gmel. Særlig ved hjælp af mikroskopet.
Pt. fascipennis Monach. En teknisk undersøkelse.
Pt. luteus Ge. Øgnet med mikroskopet.
En teknisk undersøkelse.
Pt. marinus Gyll. Et tekn. undersøkelse.
Pt. puncta Nordens. En teknisk undersøkelse.
En teknisk undersøkelse.
Pt. rufipes Nordens. En teknisk undersøkelse.
Pt. subnitens Nordens. En teknisk undersøkelse.

AKTIETRYKKERIET I TRONDHJEM

1902

LYONSIJSKE NOTISER

NO

SÄTAHULINDE, CASSIDINE, OC

COCCHINETTIDER

EMBR STRAND

GEL KAR HORSE LIDESKAVERA SLEKTA SKRIFTER 1909 NO 3

ANTIKVARIAAT / HANDBOKSBOEN
2001

No. 71 FAUNISTISK TIDSSkrift over STAPHYLINIDEN
10-11 1897-98

S. funestus Dufour. Fundt ved Søndre Sandvika i Larvik.
S. maurus Fauvel. Denne var den mest veludviklede af de tilhørende arter i samlingen.
S. maurus Fauvel. Denne var den mest veludviklede af de tilhørende arter i samlingen.
S. maurus Fauvel. Denne var den mest veludviklede af de tilhørende arter i samlingen.
S. maurus Fauvel. Denne var den mest veludviklede af de tilhørende arter i samlingen.
S. maurus Fauvel. Denne var den mest veludviklede af de tilhørende arter i samlingen.
S. maurus Fauvel. Denne var den mest veludviklede af de tilhørende arter i samlingen.

Det materiale av Staphylinider, som tilveiebragtes paa mine reiser i 1901, har den bekjendte specialist i denne gruppe Albert Fauvel i Caen havt den godhed at bestemme for mig. Da deri fandtes adskilligt av betydelig faunistisk interesse, skal jeg herved faa lov at meddele en fortegnelse derover, idet jeg samtidig ogsaa medtager nogle notiser om endel av mig selv bestemte *Cassida*-arter og *Coccinellider*. — Hvad Staphyliniderne angaar, er alle arter anførte under de av Fauvel benyttede navne; slechterne følger efter hinanden i samme orden som hos Thomson. — De arter, som er fundne i den arktiske region, er udhævede ved en stjerne (*).

Staphylinider.

Staphylinus pubescens D. G. Et enkelt eksemplar er fundet i Aal (Hallingdal).

S. stercorarius Ol. Et par stk. samledes i Suldal i Ryfylke.

S. caesareus Ced. Unicum ved Filtvedt (ved Kristianiafjorden)

Ocyphus aeneocephalus D. G. Fundet ved Stavanger og i Suldal.

Philonthus laminatus Creutz. Samlet ved Bergen og Stavanger.

Ph. fuscipennis Mannh. Et enkelt ekspl. fra Suldal.

Ph. decorus Gr. Ogsaa kun et eneste individ Larkollen (ved Kristianiafjorden).

Ph. varius Gyll. Er kun fundet i Suldal.

**Ph. puella* Nordm. Samledes paa to steder i Alten (Finmarken) nemlig i Komagfjord og ved Sopnes; desuden ved Snemyr i Nordreisen (Tromsø amt).

Ph. marginatus Str. Unicum fra Suldal.

Ph. nitidulus Gr. Denne sjeldne art toges kun ved Horten (un.).

Var ellers kun kjendt fra Kristiania og Holmestrand.

**Ph. aterrimus* Gr. Samlede ved Kristiania, Vikesund (Modum), i Suldal samt Nordreisen.

**Quedius fulvicollis* Steph. Denne vistnok for Skandinavien nye art synes at være adskillig udbredt i den arktiske region, idet den toges paa tre af de fire besøgte lokaliteter i Alten (Komagfjord, Kaafjord og Sopnes) samt i Nordreisen.

**Q. boops* Gr. Fandtes i Alten ved Bosekop og Komagfjord, desuden i Nordreisen og Suldal.

Q. mesomelinus Marsh. Kun fra Kristiania (un.)

**Q. molochinus* Gr. Samlede i Nordreisen, Suldal og ved Stavanger.

Q. xanthopus Er. Fundet ved Kristiania og Vikesund.

**Euryporus picipes* Pk. Av denne raritet, der før kun er fundet i Tysfjorden (ipse) og i Hardanger, fandtes et unicum i Nordreisen.

**Othius lapidicola* Kiesw. Denne i det arktiske gebet vidt udbredte art (jeg har saaledes før kunnet angive den fra Vefsen, Hatfjelddalen, Østvaagøen, Lødingen og Hadsel) haves nu fra Kaafjord, Komagfjord og Nordreisen.

**O melanocephalus* Gr. Fandtes paa lokaliteterne Stavanger, Suldal, Komagfjord, Sopnes og Nordreisen. Var i den arktiske region hidtil kun fundet av mig (Hatfjelddalen, Tysfjorden, Lødingen, Hadsel og Østvaagøen).

Baptolinus longiceps Fvl. Denne for Skandinavien nye art samlede i et enkelt ekspl. i Suldal og et par ved Vikesund.

Xantholinus ochraceus Gyll. Unica fandtes ved Stavanger og Vikesund.

X. linearis Ol. Er samlet ved Vallø (pr. Tønsberg), Stavanger og i Aal.

**X. tricolor* Fbr. Et par stykker toges ved Sopnes. Artens nordgrænse var hidtil Tromsø.

**Stenus clavicornis* Sc. Er fundet ved Vikesund, Vallø, Filtvedt, Horten, i Suldal og Nordreisen.

S. juno Fbr. Kun et eneste ekspl. fra Odnes (ved Randsfjorden).

S. similis Ljungh. Toges ved Aasgaardstrand, Vallø, Vikesund og i Suldal.

- S. binotatus Ljungh.* Kun et par ekspl. fra Larkollen.
- S. tarsalis Ljungh.* Unicum ved Vikesund.
- S. niveus Fvl.* Denne for Skandinavien nye art toges i Suldal. Hører hjemme i det sydvestlige Europa (Skotland, Frankrig).
- S. canaliculatus Gyll.* Et par st. fra Aal.
- S. brunnipes Steph.* Et unicum fandtes ved Bergen.
- S. bifoveolatus Gyll.* Fanget i Suldal og ved Odnes.
- **S. carbonarius Gyll.* Kun et par stykker fra Nordreisen.
- **S. flavipalpis Ths.* Samledes i et enkelt ekspl. ved Sopnes og et par i Nordreisen.
- **S. impressus Germ.* Er fundet i Kaafjord, ved Filtvedt og i Suldal.
- **Lathrobium fulvipenne Gr. v. alpestre Heer.* Fundet paa mange steder: Bosekop, Kaafjord, Komagfjord, Nordreisen, Vikesund, Horten og Suldal.
- **L. brunnipes Fbr.* Samlet i et par ekspl. i Suldal og et i Nordreisen.
- L. geminum Kr.* Unica fra Filtvedt og Vikesund.
- L. multipunctatum Gr.* Av denne hidtil kun ved Kristiania fundne art (Münster) haves et unicum fra Suldal.
- L. longulum Gr.* Haves ogsaa kun fra Suldal.
- Cryptobium fracticorne Pk.* Et par st. fra Suldal.
- Astenus angustatus Pk.* Er fundet ved Horten, Vallø, Aasgaardstrand og Vikesund.
- Myrmedonia limbata Pk.* Unicum fra Horten.
- **Astilbus canaliculatus Fbr.* Denne vistnok overalt i landet udbredte art samledes paa flg. lokaliteter: Bosekop, Sopnes, Kaafjord, Nordreisen; Filtvedt, Horten, Larkollen, Aasgaardstrand, Suldal og Vikesund.
- Aleochara brevipennis Gr.* Unicum fra Vallø.
- **A. verna Say.* Et eneste ekspl. fra Nordreisen av denne hos os kun i Asker og Telemarken fundne art. Den er altsaa ny for den arktiske region.
- A. nitida Gr.* Et enkelt stykke fra Stavanger.
- A. moerens Gyll.* Kun fra Suldal.

- **Autalia puncticollis* Sharp. Et par stk. fra Nordreisen og et fra Tysfjorden (1900).
- Ischnoglossa prolixa* Gr. Unicum fra Vikesund. Hidtil kun fundet ved Trondhjem (Lysholm), Hatfjelddalen, Røsvand og Tysfjorden (ipse).
- Leptusa analis* Gyll. Fundet i et enkelt ekspl. ved Vikesund.
- Falagria obscura* Gr. Denne hidtil kun ved Kristiania fundne art toges i et par ekspl. ved Vallø.
- F. sulcata* Ph. Ogsaa kun fundet ved Vallø.
- Tachypusa atra* Gr. Unicum fra Kristiania.
- Gnypeta labilis* Er. Kun fundet ved Larkollen (un.)
- **Acrostiba borealis* Ths. Et eneste ekspl. i Komagfjord og et par i Nordreisen er alt jeg har fundet av denne hidtil kun fra Tromsø og Trondhjem angivne art.
- Myllaena brevicornis* Matth. Denne for faunaen nye art fandtes ved Bergen.
- Placusa infima* Er. Unicum fra Vikesund. Hidtil kun i Trøndelagen (Lysholm).
- **Oxypoda opaca* Gr. Samlede i enkelte eksemplarer ved Bosekop, Komagfjord og Nordreisen.
- O. lateralis* Mannh. Unicum fra Suldal. Før kun ved Røsvandet (ipse).
- **O. longiuscula* Gr. Samlede ved Sopnes, Komagfjord og i Nordreisen. Ny for Finmarken.
- **O. cuniculina* Er. Denne sjeldne art toges i et par stk. i Nordreisen.
- O. alternans* Gr. Unicum fra Suldal.
- **O. soror* Ths. Er fundet i Nordreisen og Komagfjord, samt i Suldal. Var i det sydlige Norge hidtil kun fundet i Aal (ipse).
- Atheta aterrima* Gr. Er kun fundet i Suldal.
- **A. fungi* Gr. Samlede i Suldal, Vikesund. Bosekop, Sopnes, Komagfjord og Nordreisen.
- **A. longicornis* Gr. Unica fra Vikesund og Nordreisen. Nordgrænsen for denne art var hidtil Tromsø.
- **A. atramentaria* Gyll. Samlede i talrige ekspl. i Nordreisen og haves desuden fra Komagfjord og Suldal.

- **A. picipennis* Mannh. Haves fra de samme tre lokaliteter som forrige art. Nordgrænsen var hidtil Tromsø.
- **A. depressicollis* Fvl. Vikesund og Komagfjord (unica). Ny for faunaen. Arten hører hjemme i Pyrenærerne og Alperne.
- **A. melanocera* Ths. Haves kun fra Nordreisen.
- **A. frigida* J. Sahlb. I Nordreisen fandtes et eneste stykke av denne før kun ved Tromsø fundne art.
- **A. analis* Gr. Denne vidt udbredte art fandtes ved Vallø, Aasgaardstrand, Horten, Vikesund, i Suldal og Nordreisen samt ved Bosekop. Desuden Tysfjorden (1900).
- **A. cavifrons* Sharp. Fundet paa de samme steder som forrige art (med undtagelse av Vallø). Ogsaa i Tysfjorden (1900).
- **A. vestita* Gr. Unicum fra Komagfjord.
- **A. graminicola* Gr. Kun paatruffet i Nordreisen.
- **A. microptera* Ths. Samlede i Komagfjord og Kaafjord. Desuden haves et (desværre defekt) st. fra Nordreisen, der maaske er en varietet av denne art.
- **Geostiba circellaris* Gr. Er fundet ved Bosekop, i Nordreisen, Suldal, Lærdal (1900), ved Stavanger, Horten, Vikesund og Filtvedt.
- **Platystethus arenarius* Fourcr. Denne hidtil ikke nordendor Tromsø fundne art samlede i Nordreisen.
- Oxytelus rugosus* Fbr. Unica fra Stavanger og Vikesund.
- O. nitidulus* Gr. Unicum ved Vikesund.
- **O. laqueatus* Marsh. Fandtes ved Vallø, Komagfjord og i Nordreisen.
- **Haploderus caelatus* Gr. Fundet i Nordreisen. Nordgrænsen var hidtil Tromsø.
- Tachyporus obtusus* L. Er fundet i Suldal og ved Kristiania.
- T. chrysomelinus* L. Samlede ved Vallø, Vikesund, Kristiania, i Aal og Suldal.
- **T. macropterus* Steph. Toges i talrige eksemplarer ved Bosekop og i unica i Nordreisen og Kaafjord. Nordgrænsen var hidtil Tromsø.
- T. nitidulus* Fbr. Et ekspl. fandtes ved Stavanger.
- T. pusillus* Gr. Er fundet i Suldal og Aal.

- T. hypnorum* Fbr. Et par st. ved Vikesund.
- **Tachinus elongatus* Gyll. I 1900 toges et enkelt ekspl. i Tysfjorden.
- T. pallipes* Gr. Samledes kun i Komagfjord.
- T. rufipes* D. G. Fanget ved Bergen og i Hol (Hallingdal).
- **T. proximus* Kr. Samledes i Nordreisen og Komagfjord. Desuden Tysfjorden (1900).
- **T. laticollis* Gr. Kun fundet i et enkelt ekspl. i Komagfjord og et par i Nordreisen.
- Conurus pubescens* Pk. Unica ved Vikesund og Kristiania.
- Mycetoporus splendidus* Gr. Et eneste stykke i Suldal.
- **M. lepidus* Gr. Er fundet ved Bosekop, samt i Hemsedal.
- Bolitobius lunulatus* L.
- B. trinotatus* Er.
- B. pygmaeus* Fbr. Alle tre *Bolitobius*-arter er kun fundne i Suldal; av de to første kun unica.
- **Anthophagus caraboides* L. Fandtes ved Bosekop, Sopnes og i Suldal.
- **A. omalinus* Zett. Forekom talrig i Nordreisen, Kaafjord og ved Sopnes. Desuden fra Aal.
- **A. alpinus* Fbr. Samledes ved Bosekop, Sopnes, i Komagfjord, Kaafjord og Nordreisen.
- **Geodromicus globulicollis* Zett. v. *curtipennis* Fvl. Unicum fra Nordreisen. Ny for faunaen.
- **Micralymma marinum* Strøm. Et eneste ekspl. i Komagfjord.
- **Arpedium quadrum* Gr. Flere ekspl. fra Nordreisen, unica fra Suldal og Thorpe i Aal.
- **A. brachypterum* Gr. Samledes paa alle fire lokaliteter i Alten, samt i et unicum ved Bergen.
- **Olophrum boreale* Pk. Et ekspl. fra Komagfjord.
- **O. consimile* Gyll. Samledes i 1900 i Tysfjorden.
- **Deliphrum tectum* Pk. Er kun fundet i Nordreisen.
- **Homalium septentrionis* Ths. Av denne sjeldne art toges et ekspl. i Komagfjord.
- **Megarthrus depressus* Pk. Samledes i mange ekspl. i Nordreisen, i et eneste i Suldal.
- Protinus brachypterus* Fbr. Kun et unicum fra Suldal.

Cassidiner og Coccinellider.

Cassida nebulosa L. Samlet ved Skien, Kristiania og Vikesund.

C. flaveola Thbg. Er fundet i Lier (Wollebæk) og i Suldal.

C. vibex L. Kun ved Kristiania.

Hippodamia tredecimmaculata L. Et ekspl. tilhørende v. c. Gyll.
Lier (Woll.)

H. septemmaculata D. G. var. b. Gyll. Unicum fra Aal.

Anisosticta novemdecimpunctata L. Jeg har fundet denne art paa
Hvalørerne, ved Larkollen og Skien; hr. A. Wollebæk har sam-
let den i Lier.

Adalia obliterata L. Enkelte eksemplarer fandtes ved Ulefos, Vike-
sund og Stavanger.

A. bothnica Pk. Av denne meget sjeldne art har jeg fundet et
ekspl. ved Skien og et ved Vikesund.

A. bipunctata L. Denne almindelige art er samlet i Lærdal, Tune
(Smaalenene), paa Hvalørerne, ved Stavanger, Larkollen, Skien,
Odnes, Kristiania og i Aal. *Var. sexpustulatus L.* tog jeg
ved Bergen.

**Halyzia quatuordecimguttata L.* Haves fra Nordreisen, Skien,
Ulefos, Aal og Gol (Hall.), Vallø, Lavik (Sogn) og Odnes.

H. oblongoguttata L. Er fundet i Ødemark (Smaalenene), Suldal
og ved Aasgaardstrand.

H. sedecimguttata L. Forekom temmelig hyppig i Suldal og er
desuden fundet i Botne i Jarlsberg og ved Skien.

H. vigintiduopunctata L. Er fundet ved Skien, Ulefos og i Lærdal.

H. conglobata L. Haves fra Kristiania, Kongsberg, Ulefos, Skien,
Porsgrund, Lier, Onsø, Odnes, Botne og Sande i Jarlsberg
samt Suldal og Lærdal.

**Coccinella undecimpunctata L.* Et par stykker toges ved Bose-
kop, forresten haves arten i unica fra Hvalørerne og Onsø.

C. hieroglyphica L. Haves fra Bergen, Vikesund, Skien, Suldal,
Aal og Næs (Hall.).

**C. septempunctata L.* Er fundet ved Bosekup foruden mange
steder sydpaa.

C. quinquepunctata L. Er samlet paa flg. lokaliteter: Lærdal, Kongsberg, Gol, Aal, Sande, Tune, Ulefos, Skien, Porsgrund og Vallø.

C. quatuordecimpustulata L. Haves fra Ulefos, Skien, Vallø, Horten, Aasgaardstrand og Vikesund.

C. decempunctata L. Unica er fundne ved Kristiania, i Onsø og paa Hvalørerne.

**C. trifasciata L.* Et par stykker fandtes ved Bjøberg paa Hemse-dalsfjeldet; forresten har jeg kun unica fra Aal og Kaafjord.

Micraspis duodecimpunctata L. Paa Hvalørerne fandtes et eneste stykke av denne meget sjeldne art.

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata L. er kun funden i Aal.

Chilocorus renipustulatus Scriba. Unica haves fra Ulefos og Jondalen ved Kongsberg.

Ch. bipustulatus L. er kun fundet i Suldal.

Exochorus quadripustulatus L. haves kun fra Onsø.

Kristiania, april 1902.