

SPECIALIA LOCA NATALIA

PLANTARUM NONNULLARUM VASCULARIUM

& CHARACEARUM & LICHENUM

IN

AGRO ARCTICO NORVEGIÆ CONFINIISQUE

SPONTE NASCENTIUM

OBSERVAVIT

J. M. NORMAN.

1868 (mense Majo).

SPECIALIA LOCA NATALIA
VASSOUTALLES
PLANTARUM NORVEGICARUM VASCULARIUM

CHARACTERE & LICHENUM

AGRO ARCTICO NORVEGICIS COMPENSQUE

SPORTE NARCISSUM

J. M. JOHANN

1. VASCULARES.

DICOTYLEDONES.

RANUNCULACEÆ.

1. THALICTRUM KEMENSE, Fr.

Hab. quoque juxta *Tanaelv* latere *Fennico* prope *Væt-zetsjnjalbme*.

3. BATRACHIUM CONFEROIDES, Fr.

Hab. quoque in parochia *Throndenæs* in lacu prope *Nipen*; in tractu *Tromsøensi* ad cacumen alp̄is *Flöiffeld* in parvulo stagno ad marginem nivis perennis, ubi tempore autumnali florens visum est; in *Alten* infra *Reipas*, ut videtur (sterile visum); in *Varangria meridionali* ad *Pasvigelv* inter *Klostervand* & *Goalsejavre* nec non in *Bagjajavre*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad *Sjuosjavre* in flumine prope hospitium.

3b. BATRACHIUM HETEROPHYLLUM, Fr.

Hab. nov. civis Floræ arct. Norv. in *Maalselven* in rivulo prope *Sætermovandene* convallis *Bardu*, unde pastor *Ellesen* summitatem solam speciminis florentis misit, quod huic speciei vix dubie adnumerandum est.

4. BATRACHIUM PELTATUM, Fr.

Hab. quoque in *Porsangria* in lacu fluminis *Staburselv*, ut videtur (sterile visum); in *Varangria meridionali*, ubi ut pabulum gratum a bovis mire devoratur, secus flumen *Pasvigelv* in *Fuglebogten* lacus *Goalsejavre* copiosissime, in *Bossojavre* parcius, in *Gaddeluobat* parce, in *Fagetinjavre* latere quidem *Rossico* prope *Savasuolo*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore in parte suprema fluminis *Jesjok* infra lacum *Sjuosjavre*, in quo ipso copiosissime

adesse dicitur. Pluribus locis hujusce agri Batrachia sterilia nimis inevoluta, ut speciem dignoscere non valuerim, sic ex. gr. in flumine *Reisenelv* parochiæ *Skjervö*, in lacu supra mare elevatiore *Lappojavre*, *Finmarkiæ interioris* vidi.

5. RANUNCULUS GLACIALIS, L.

Hab. quoque in *Bejeren* in alpe prope *Arstaddal*; in *Ofoten* in *Lillelaxetind*; in *Sör-Reisen* in *Middagsfjeld* & in alpibus prope *Östgaard* convallis *Gumpendal*; in *Maals-elven* in alpibus *Istinderne*, in ejus cacumen altius quam ceteræ Phanerogamæ adscendit; nec non in insula *Sciland* in alpe *Hönsebyfjeld* (latit. bor. 70° 30—31).

6. RANUNCULUS REPTANS, L.

Hab. quoque in *Throndenæs* ad *Lysvand* intra prædia *Skaanland*; in *Skjervö* ad *Kjelderen* & *Bergskoven* convallis *Reisen*; in *Varangria meridionali* secus *Pasvigelv* ad *Klostervand*, ad cataractam inter hunc lacum & *Goalsejavre*, ad *Gaddeluobal*, nec non latere *Rossico* ad insulam *Sava-suolo* lacus *Vagetimjavre*, infra radicem alp̄is *Galgoaive*, ad insulam *Store-Menikasö*; præterea in *Finmarkia* continentali interiore juxta flumen *Altenelv* ad *Spjerkajokka* paullo infra terminum *Betulæ*, ad *Masi*, ad *Duogasjemoske*; ad lacus montanos *Lappojavre* & *Sjuosjavre*; juxta flumen *Karasjok* ad *Beshinjarga*, inter pagum *Karasjok* & *Dafteroavve*, ad *Mannevarrenjarga*; juxta partem superiorem fluminis *Tanaelv* ad *Holmen*. In *Börselv* *Porsangria* ad ripas stagni infra alp̄em *Silfavarre* siti forma sterilis foliis p. p. in laminam anguste lanceolatam longe petiolatam ornata adest, in *R. Flammulam* vergens.

7. RANUNCULUS LAPPONICUS, L.

Hab. species, quam juxta *Anarjok* ut locum specialem unicum Norvegiæ antehac indicavi, quoque in *Varangria meridionali* juxta *Pasvigelv* ad *Klostervand* quum ad paludem vastam ex adverso insulæ *Menikasö* passim, tum prope prædium *Svanvig* (circa 500 pass. septentrionem versus extra sepes), ubi *Listera cordata* & *Nardosmia frigida* sociæ ejus sunt.

8. RANUNCULUS HYPERBOREUS, Rottb.

Hab. quoque in *Skjervö* ad *Kjelderen* convallis *Reisen* copiose, ad *Norbotten* sinus *Kvænangen*; in *Porsangria* inter *Valdak* & *Stabursnæs* & ad latus boreale rivi *Staburselv*; in *Varangria boreali* ad *Paddeby*; in *Varangria meridionali* juxta partem inferiorem fluminis *Neidenelv* suo

loco copiose; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta flumen *Karasjok* ad loca adusta (!) inter pagum & *Dafteroavve*. In jugo *Seidafjeld* loco 7—800 ped. supra mare elevato occurrit.

9. RANUNCULUS AURICOMUS, L.

Hab. quoque in *Gildeskaal* Nordlandiæ meridionalis ad prædium pastoris, ad *Dal*; in insula *Hadselö* *Vesteraaliæ*; in *Throndenæs* ad prædium pastoris; in insula *Senjen* ad *Gibbstad*; ad prædium pastoris *Tranö*; in *Maalselven* ad *Bangen* convallis *Bardu*; juxta sinum *Tana fjord* ad *Store-Lerpollen*; in *Varangria meridionali* ad littora maris prope *Elvenæs*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Karasjok* ad *Oadsessanjarga*.

9b. RANUNCULUS NIVALIS, L.

Planta, in alpibus nive perenni v. subperenni gaudentibus per magnam partem territorii frequenter occurrens, quoque infra terminum *Betulæ* habitat ex. gr. in *Maalselven* juxta *Beinelv* ad fundum ipsum convallis in margine pratorum a natura procreatorum, quæ quotannis metuntur, nec non in jugo montano humiliore *Finmarkiæ interioris* prope *Jotkajavre*, sed notandum est, utroque loco congeries nivis per longum tempus æstatis perdurare.

9c. RANUNCULUS FICARIA, L.

Hab., antehac unico loco Nordlandiæ indicatus, quoque in *Gildeskaal* ad *Indyr* & ad *Gjeldstad* infra rupes v. clivos, ubi nix per hiemem accumulatur.

10. CALTHA PALUSTRIS, L. VAR. RADICANS.

Hab. quoque in *Throndenæs* inter *Skaanland* & *Nipen*; nec non ad *Komafjord* *Finmarkiæ Altensis*.

11. ACONITUM SEPTENTRIONALE, Köll.

Hab. quoque in *Gildeskaal* inter prædium pastoris & *Skovvold* frequenter, tam ad radices montium quam in vicinia littoris maris; luxurians per totam convallem *Bejeren* ad radicem alpium frequenter copiosissime, ad *Arstadaasen* adscendens ad terminum *Betulæ*; in *Meroftenklumpen* singularem etiam altius supra hunc; in *Ofoten*, ubi a me prius indicatum, quoque ad tractum prædii *Lerosen* & convallem intrajacentem, in alpe *Laxetind* etiam statione hac maxime septentrionali usque ad ipsum terminum *Betulæ* adscendens.

12. ACTÆA SPICATA, L.

Hab. quoque per convallem *Bejeren* ex. gr. supra *Solö*

& *Muldjord*, ad *Seglfjeld*, ad *Arstadaasen*, supra *Heminghyt*; in *Hadselö Vesteraaliæ* prope *Melbo* altius quam 500 ped. supra mare ascendens; in *Kvæffjordeidet* prope *Rödmuldheien*, ibi quoque altius supra mare; in *Ofoten* ad *Evnæs*; in *Maalselven* ad *Akka*, ad partem interiorem convallis supra *Nergaard*, supra *Överby*, ad radicem alpis *Blaabjerg* convallis lateralis longius protracti *Bardu*.

NYPHÆACEÆ.

14b. NUPHAR INTERMEDIUM, Ledeb.

Hab. nov. civis Flor. arct. Norv. in *Finmarkia continentali* interiore ad tractum pagi *Karasjok* sc. in parvulo lacu v. stagno infra alpem *Dafteroavve* (latit. bor. c. 69° 17—19).

PAPAVERACEÆ.

15. PAPAVER NUDICAULE, Rottb.

Hab. quoque in *Maalselven* ad alpes *Langfjeldene* prope *Beinelv* parce altitudine c. 800 ped. supra terminum *Betulæ*. Erronee hanc plantam in Ind. suppl. arct. Norv. a me in *Finmarkia* primum lectam dixi.

15b. CORYDALIS FABACEA, Pers.

Hab. quoque in *Gildeskaal* ad *prædium pastoris*; in *Hadselö* prope *Melbo* altius quam 400 ped. supra mare ascendens; in *Kvæffjordeidet* prope *Rödmuldheien*; in *Sör-Reisen* supra *Östgaard* convallis *Gumpendal*; in *Maalselven* ad radicem alpium *Vasbrönden* & *Rostafjeld*, ad clivos supra *Nergaard* nec non in parte interiore convallis *Bardu* ad radicem alpis *Blaabjerg* copiose, ubi sociæ ejus *Paris* & *Polygonalum verticillatum*, ut vulgo, unacum *Bartsia alpina* & *Sedo Rhodiola*.

15c. FUMARIA OFFICINALIS, L.

Hab., antehac sat dubia civis Flor. arct. Norv., in *Bejeren* ad agros prædii *Arstad*; prope *Bodö*; nec non in *Throndenæs* ad prædium *Lille-Skaanland*, ubi latit. bor. attingit c. 68° 35.

CRUCIFERÆ.

16. NASTURTIUM PALUSTRE, DC.

Hab. quoque in *Maalselven* inter *Fredriksberg* & *Myre*, ad *Nordmoen*; in *Varangria meridionali* ad cataractam inter *Klostervand* & *Goalsejavre*; nec non in *Finmarkia conti*

mentali interiore juxta *Karasjok* ad *Oadsessanjarga* ut forma luxurians procumbens.

17. BARBAREA STRICTA, Fr.

Hab. quoque in *Kvæfjord* ad loca elevatiora clivorum prope *Vig & Vogteren*; in *Maalselven* ad *Bakkehoug*, ad *Skjeggenæs*; in *Varangria meridionali* ad *Elevenæs*, ad cataractam inter *Goalsejavre & Bossojavre*, nec non latere *Rossico* prope pagum Lapponum ad *Bagjajavre*; secus *Tana-fjord* ad *Store-Lerpollen*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Altenelv* ad *Masi*. Ut videtur, frequentior in tractibus magis borealibus Norvegiæ arcticæ quam in meridionalibus a me visitatis.

18. ARABIS HIRSUTA, L.

Hab. quoque in *Gildeskaal* ad *Del* copiose; in *Bejeren* supra *Solö & Muldjord*, ad *Arstadausen*, ad *Troelid*; in *Ofoten* ad *Lidland*, ad *Lidlandskaret*, ad *Evenæs*; in *Kvæfjord* ad tractum prædiorum *Vig & Vogteren* copiose, in *Throndenæs* ad *Harstadhavn*, prope *Lysvand* intra *Skaanland*; in insula *Rollen* prope *Havnvig*; in *Salangen* prope *Øvre-Vand*, prope *Krogen*; in insula *Senjen* ad *Solberg*, ad *Renlidkollen*; in *Sör-Reisen* ad *Finsæt*, ad *Dybvaag*; in *Maalselven* inter *Storbakken & Sollid*; in insula *Hukö* (c. 70° 1); in *Porsangria* ad partem inferiorem convallis *Børselv*, ubi latit. bor. 70° 18–20 attingit.

18b. ARABIS THALIANA, L.

Hab. nov. civis Flor. arct. Norv. in insula *Hadselö* ad clivos supra *Melbo*, ad radicem alpis *Husebykollen*, attingens latit. bor. c. 68° 30.

19. CARDAMINE BELLIDIFOLIA, L.

Hab. quoque in *Ofoten* ad *Laxetind*; in *Sör-Reisen* ad *Middagsfjeld*, ad alpes prope *Östgaard* convallis *Gumpendal*; in *Maalselven* ad alpem *Mauken*; in *Seiland* ad *Hösebyfjeld*.

20. CARDAMINE PRATENSIS, L.

Hab. quoque in *Bejeren* prope *Solövand*; in *Kvæfjord* supra *Vig & Vogteren*; in prædio pastoris *Tranö*; in *Sör-Reisen* ad *Nordstrømmen*; in *Lenvig* prope *Finfjordvand*; in *Maalselven* ad *Baadkjosmoen* copiose; ad *Nordmoen*, ad *Kirkesnæs*, ad *Stormoen* convallis *Bardu*; in insula *Tromsö*; in *Skjervö* ad *Vinnelys* convallis *Reisendal*, in *Hukö*; in parochia *Hammerfest* ad partem infimam convallis *Riper-*

fjorddal, ad jugum alpinum vastum inter hanc & *Russemark Porsangriæ*; ad *Repvaag Porsangriæ* in alpes adscendens supra terminum Betulæ; in *Varangria meridionali* juxta *Pasvigele* ad *Gaddeluobal*, nec non latere *Rossico* prope *Galgoive*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Altenelv* prope templum *Masi*. Propaguliferis foliis (cfr. Bot. Not. 1865 p. 25) quoque in *Maalselven* ad *Nordmo*, in insulis *Tromsö* & *Seiland* observata est.

21b. ERYSIMUM CHEIRANTHOIDES, L.

Hab. quoque per convallem *Bejeren* a prædiis *Arstad* & *Solö* inde ad *Heminghyt* & *Troelid* copiose in agris; nec non in *Ofoten* ad *Sommervig* & *Evenæs* parce, ubi attingit latit. bor. 68° 27—29.

22. ERYSIMUM HIERACIFOLIUM, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad radicem alpium *Seglfjeld*, supra *Solö* & *Muldjord*, prope *Heminghyt*; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lidlandskaret*, intra *Evenæs*; in *Hadselö* ad *Melbo*; in *Kvæfjord* ad *Vig* & *Vogteren*; in *Thronenæs* ad prædium pastoris, inter *Skaanland* & *Lysvand*; in *Salangen* prope *Övre-Vand*, ad *Krogen*; in *Sör-Reisen* ad *Dybvaag*, ad montem *Bærkollen*, ad clivos supra *Finsæt*; in *Maalselven* in præruptis montis *Akka*, ad radicem alpium *Blaabjerg* in *Bardu*; in *Porsangria* luxurians inter ostium fl. *Børselv* & *Hestenæsset* (70° 18—20); in *Varangria boreali* ad *Flintenæszen* prope *Jakobselv*; præterea ad fines *Finmarkiæ continentalis* interioris ad *Spjerkojokka*.

22b. DRABA NIVALIS, *Liljebl.*

Hab. quoque rarior hujusce territorii in *Sör-Reisen* ad alpes prope *Gumpendal*; nec non, ut videtur (specimina marcida autumnis serotino visa), in *Porsangria* ad alpes prope *Laxevandene* (*Skovanvarre*).

22c. BRAGA ALPINA, Sternb.

Hab. rarissima Scandinaviæ in parte exteriori convallis *Beieren* ad radicem montium supra *Muldjord* & *Solö*, socia *Epipontidis latifoliæ*, ad radicem alpium *Arstadaasen*, utroque loco in solo calcareo & infra terminum Pini (latit. bor. c. 66° 59); in *Maalselven* ad latera alpium *Rostafjeld* supra terminum Betulæ in schistis micaceis nascens (lat. bor. c. 68° 55); nec non in *Skjervö* in insula *Hukö* infra terminum Betulæ solo calcareo, ibi latit. bor. 70° ægre transgrediens.

23. THLASPI ARVENSE, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Solö*, ad *Heminghyt*; in *Ofoten* ad tractum prædii *Lidlandskaret*. In insula *Tromsö* & locis magis septentrionem versus positis tantummodo adventitia rarior, altero anno apparens, altero disprens, nec, meo sensu, ut civis horum locorum Floræ considerandum.

24. CAKILE MARITIMA, Scop.

Hab. quoque ad *Kjöllefjord Finmarkiæ orientalis* (latit. bor. c. 70° 57').

25. SINAPIS ARVENSIS, L.

Hab. quoque in *Kvæfjord* ad *Vig* & *Vogteren*; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*; in *Skjervö* ad *Rotsundelv*, in insula *Skjervö*; in *Alten* ad *Storjordet* & alibi in agris visa, ibi ut locis pluribus aliis forsitan ut adventitia consideranda.

26. BRASSICA CAMPESTRIS, L.

Hab. quoque in *Kvæfjord* ad *Vig* & *Vogteren*; in insula prædii pastoris *Tranö*; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*; in *Maalselven* ad *Nordmoen* (1865); in insula *Senjen* ad *Gibbostad*; in *Skjervö* ad *Vinnelys* convallis *Reisendal*.

27. SUBULARIA AQUATICA, L.

Hab. quoque in *Skjervö* ad *Bergskoven* convallis *Reisendal*; in *Varangria meridionali* juxta fl. *Pasvigelv* ad *Elvenæs*, ad cataractam inter *Vagetimjavre* & *Bagjajavre* (lacum lacui *Enare* proximum), nec non latere *Rossico* tractu alpium *Galgoaive*.

DROSERACEÆ.

27b. DROSEROTA ROTUNDIFOLIA, L.

Hab. quoque in *Bejeren* prope *Solövand*, inter *Heminghyt* & *Troelid*, in jugo supra *Heminghyt*; prope *Bodö*; in *Ofoten* intra *Lerosen*; in *Kvæfjord* intra *Vig* & *Vogteren*, in insula *Kvæö*; in insula *Senjen* ad partem interiorem convallis *Laxelv*, tractu prædii *Gibbostad* frequenter, ad *Hegvand* & *Lysbottenvand* copiose; in *Lenvig* prope *Finsjordvand*; in *Maalselven* ad *Elvskiftningen* & alibi; in insula *Tromsö* & ad continentem adjacentem; in *Varangria meridionali* in jugo prope *Elvenæs* termino *Betulae* appropinquans, juxta *Klostervand* ad paludem vastam ex adverso insulae *Menikasö*.

27c. DROSEROTA LONGIFOLIA, L.

Hab. quoque in *Bejeren* prope *Solövand*, in jugo supra *Heminghyt* & supra *Troelid*; in *Ofoten* intra *Evenæs*; in

Kvæfjordeidet & in insula *Kvæö*; in *Salangdal* prope *Krogen*; ad *Harstadvavn*; in *Sör-Reisen* prope *Sörfosbogen*; in insula *Senjen* ad partem interiorem convallis *Laxelv*, circa *Gibbostad* frequentius, in alibus prope *Lysbottenvand* termino Betulæ appropinquans; in *Lenvig* prope *Finsjordvand*; in *Maalselven* ad *Foslid*, juxta *Beinelv*; in insula *Tromsö*; in *Alten* ad alpem *Borras* supra terminum Betulæ adscendens; in *Laxefjord Finmarkiæ orientalis* prope *Veinæs*; in *Varangria meridionali* prope *Elvenæs* termino Betulæ appropinquans.

VIOLARIEÆ.

28. VIOLA PALUSTRIS, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Solö*, ad *Troelid*, in *Meraftenklumpen* supra terminum Betulæ adscendens; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*, in *Laxetind* supra terminum Betulæ; in *Kvæfjordeidet* prope *Rödmultheien*; in *Thronenæs* intra *Skaanland*; in *Salangen* prope *Lund*; in insula *Senjen* ad *Laxelv*, ad *Gibbostad*, prope *Lysbottenvand* in alpes ad viciniam termini Betulæ adscendens, ad *Græsmyrskoven*; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*, ad *Hestö*, in *Gumpendal* in alpes supra terminum Betulæ adscendens; in *Maalselven* ad *Fleshemoen*, ad *Aasen*, inter *Rogumo* & *Bakkehoug*, in alpem *Mauken* supra terminum Betulæ adscendens; in insulis *Skjervö* & *Hukö*; ad *Komagfjord* & *Lille-Lærrisfjord*; in *Porsangria* ad *Repvaag*.

29. VIOLA SVECICA, Fr.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Troelid*; in *Gildeskaal* ad *Indyr*; in *Ofoten* prope *Lidland*; in *Kvæfjordeidet*; in *Salangen* prope *Lund*; in insula prædii pastoris *Tranö*; in insula *Senjen* ad *Laxelv*, ad *Kvanaas*, ad tractum prædii *Gibbostad*; in *Lenvig* inter *Finsjordvand* & *Renvand*; in *Sör-Reisen* prope *Tömmervigvand*, ad *Sörfosbogen*; in *Maalselven* ad *Lerbekmo*, ad *Guldhav*, ad *Fleshemoen*, ad *Bakkehoug*, ad *Nordmoen*, ad *Stormoen* convallis *Bardu*; in insula *Tromsö*; in *Skjervö* ad partem superiorem convallis *Reisendal*, in insula *Hukö*; in præfectura *Alten* ad *Nedre Alten*, ad *Talvig*, ad *Komagfjord*, ad *Lille-Lærrisfjord*; in *Varangria meridionali* juxta flumen *Pasvigetv* ad *Elvenæs*, ad *Klostervand* in palude ex adverso insulæ *Menikasö*, ad cataractam inter *Klostervand* & *Goal-sejavre*, ad flumen intra lacum intimum *Bagjajavre*, nec

non latere *Rossico* in *Store-Menikasö*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Altenelv* ad *Spjerkojokka*, ad tractum templi *Masi*, ad jugum inter *Gætkaşjduodar* & *Liuosjavre*, juxta flumen *Karasjok* ad *Beskinjarga* copiose, ad *Nitomokke*, ad *Nitomokkejogasj*, nec non infra radicem alpis *Dafteroavre*.

29b. VIOLA MIRABILIS, L.

Hab., antehac pro *Saltdalen* indicata, quoque in convalli *Bejeren* supra *Muldjord* & *Solö* copiose, ad radicem alpis *Srglfjeld*, ad *Arstadaasen*, ad clivos prope *Heminghyt*, ad *Troelid*; nec non in *Gildeskaal* ad prædium *pastoris* & ad *Indyr* copiose.

29c. VIOLA ARENARIA, DC.

Hab. quoque in *Ofoten* ad *Sommervig*, ad *Evenæs*; in *Salangen* ad alpes prope *Lund* supra terminum *Betulæ* copiose nascens nunc grandiflora nunc parviflora fl. albo; in *Maalselven* ad partem superiorem convallis *Dividal* sc. ad cataractam inter *Sörlid* & *Frihedslid* copiose; in *Flöifjeld* prope *Tromsö* supra terminum *Betulæ* parcellissime visa; in *Alten* ad radicem alpis *Sakkabani*, ad *Storvigsnæs*; in insula *Hukö*, ubi latit. bor. 70° ægre transgrediens; nec non ad limitem *Finmarkiæ continentalis* interioris prope *Spjerkojokka*.

29d. VIOLA SYLVATICA, Fr.

Hab., semper ut forma grandiflora, ubi florifera observata est, in *Bejeren* ad *Solö*, ad *Arstadaasen*; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Sommervig*; in *Kvæfjord* in insula *Kvæö*, in *Kvæfjordeidet* prope *Rödmuldheien*; in *Throndenæs* ad *Lille-Skaanland*; in insula *Rollen* prope *Ibbestad*; in *Sör-Reisen* inter *Gottesjord* & *Tömmervig*.

30. VIOLA TRICOLOR, L.

Hab. quoque in *Gildeskaal* ad *Indyr* in arvis; in *Ofo-ten* ad clivos graminosos supra *Lidland* & *Lidlandskaret* copiose; in *Kvæfjord* ad *Vig* & *Vogteren*; in insula *Rollen* ad *Ibbestad*; in *Salangen* ad *Sjöccien* in arvis agrisque copiose; in *Sör-Reisen* ad latera superiora montis *Bærkollen* copiosissime; in insula *Senjen* ad *Solberg* & ad parvulam insulam *Havneholmen* prædii *pastoris* *Tranøensis*; in *Alten* ad *Storvigsnæs*.

SILENEÆ.

31. DIANTHUS SUPERBUS, L.

Hab. quoque in *Porsangria* ad *Börselev*; in *Tanafjord*

ad *Lille-Lerpollen*, ubi ad latera schistosa jugi altius quam 200 ped. supra mare adscendens; in *Varangria boreali* juxta *Jakobselv* ad radices montium c. $\frac{1}{8}$ milliar. norv. a litore maris sese removens.

32. SILENE INFLATA, L.

Hab. quoque in convalli *Bejeren* a *Solö* inde ad *Heminghyt & Troelid*; in *Kvæffjord* ad tractum prædiorum *Vig & Vogteren* copiose; in *Salangen* ad *Sjøveien*; in *Throndenæs* ad prædia *Skaanland* & in agris & extra eos copiose; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*; in insula *Senjen* ad ostium fl. *Laxelv* ex. gr. prope *Jonsgaard* copiose, ad *Varselvmo* districtus *Græsmyrskoven*, locum c. $\frac{3}{4}$ milliar. norv. a litore maris remotum, quoque copiose.

33. SILENE MARITIMA, With.

Hab. quoque in *Hadselö Vesteraaliæ*, in insula prædii pastoris *Tranøensis Havneholmen* dicta; in insula *Senjen* ad *Kvanaas*; in *Sör-Reisen* ad *Dybvaag*; in *Tanæffjord* prope *Lille-Lerpollen* ad schistosa siccissima.

33b. SILENE RUPESTRIS, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad jugum prope *Muldjord & Solö*, ad *Arstadaasen*; in *Ofoten* ad clivos supra *Lidland & Lidlandskaret*, ad latus alpis *Lille-Laxetind* usque ad 1800 ped. supra mare adscendens; in *Kvæffjord*, unde jam a *Gunnere* indicata, in tractu prædiorum *Vig & Vogteren* frequentius, in *Kvæffordeidet* ad loca a *Rödmuldheien* non remota passim; in insula *Rollen* prope *Ibbestad*; in *Salangen* ad *Krogen*, ad jugum prope lacus *Övre- & Nedre-Vand* passim copiose; in *Sör-Reisen* in montem *Bærkollen* altius quam 800 ped. supra mare adscendens; in insula *Senjen* ad *Solberg*, ad loca supra *Lysbottenvand* elevatiora a litore remotius, ibi *Ajugæ pyramidalis* socia; in *Maalselven* in parte superiore convallis ad *Nordmo* infra radicem alpis *Mauken*, ad latera montium supra *Nergaard* altius quam 800 ped. supra ripas fluminis.

34. VISCARIA ALPINA, Fr.

Hab. quoque in *Bejeren* in alpibus prope *Arstaddal* parcius; in *Hadselö Vesteraaliæ* in alpe *Husebykollen*; in *Salangdal* ad alpes prope *Moholtet*; in *Maalselven* ad ripas fluminis infra *Nordmo* (infra terminum Cerealiæ), in alpibus *Mauken & Istinderne* supra terminum *Betulæ*; in *Skjervö* ad *Hukö* & insulam *Skjervö* in littora

maris descendens; in *Seiland* ad *Hönsebyffjeld*; in *Porsangria* inter *Stabursnæs* & *Valdak*; per totum jugum vastum inter *Lerpollen* sinus *Tanen* & *Nyborg Varangriæ* passim frequentius; in *Varangria boreali* ad *Flintenæs* prope *Jakobselv*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad *Gamasvarre* intra *Tverelvdalen* Altensem passim copiose, juxta *Altenelv* ad *Spjerkokjokka* ad ripas fluminis, ad tractum templi *Masi*, ad *Duogasjmoske*, ubi quoque *fl. albo*, porro ad ripas fluminis *Karasjok* ad *Skaida*, ad *Oadses-sanjarga*.

35. MELANDRIUM SYLVESTRE, Röhl.

Flore lacteo in *Maalselven* ad radicem alpis *Mauken* & in *Skjervö* ad insulam *Hukø* visum est.

36. MELANDRIUM APETALUM, Fenzl.

Hab. quoque in *Sör-Reisen* ad alpes prope *Östgaard* convallis *Gumpendal*, ad *Middagsfjeld*; nec non in *Maalselven* ad *Mauken*, ad alpes *Langfjeldene* prope *Beinelv*.

37. LYCHNIS FLOS CUCULI, L.

Hab. omnino spontanea a cultis remota in *Ofoten* ad insulam *Unysmalö* prædio *Lidland* adjacentem (latit. bor. 68° 28'–29').

ALSINÆ.

38. SPERGULA ARVENSIS, L.

Hab. quoque in *Bejeren*, ad *Heminghyt* copiose; in *Ofoten* ad *Lidland* & *Lidlandskæret*; in *Kvæfjord* tractu prædiorum *Vig* & *Vogteren*; in *Sör-Reisen* ad *Nordstrømmen*; in insula *Senjen* ad *Grönlid* convallis *Laxelv*, ad *Kvanaas*.

39. SAGINA NODOSA, Fenzl.

Hab. quoque in *Bejeren* (magis grandiflora quam in littoribus) ad latera montium prope *Muldjord* & *Solö* paullo supra mare ascendens; ad *Bodö*; porro ad littora maris: in *Kvæfjord* prope *Vig* & *Vogteren*; in *Ofoten* ad *Evenæs* & insulam *Unysmalö*; in *Throndenæs* ad *Skaanland*; in insula *Senjen* prope *Gibbostad*; in parochia *Hammerfest* ad littus occidentale sinus *Riperfjord*; præterea procul littoribus maris ut forma grandiflora juxta *Pasvigelv Varangria meridionalis* ad ripas lacus *Gaddeluobal* nec non latere *Rossico* in tractu alpis *Galvoaive*.

40. ARENARIA SERPYLLIFOLIA, L.

Hab. quoque in parte interiore convallis *Bejeren* ad *Troelid*; in *Kvæfjord* ad clivos supra *Vig* & *Vogteren* co-

piose; in *Throndenæs* ad colles inter *Lille- & Store-Skaanland*.

41. ARENARIA CILIATA, L.

Hab. qvoqve in *Gildeskaal* ad prædium *Dal* prope littora; in *Ofoten*, jam a *I. W. Zetterstedt* lecta, ad rupes littorales copiose, ad *Ungsmalö*; in *Throndenæs* ad *Skaanland*; in *Maalselven* ad ripas fluminis *Divielv* intra *Frihedslid*; in *Porsangria* ad introitum sinuli *Kulvig*, ad ripas fluminis *Staburselv* prope ostium, ad montem adjacentem. Differentes formas plantæ agri hujusce distinguere non valeo; quamquam a „*A. norvegica*“ maxime typica forsitan paullo recedentes, tamen omnes huic, ut videtur, adnumerandæ sunt.

41b. ARENARIA TRINEROIA, L.

Hab., antehac in *Saltdalen* a *Sommerfelt* lecta, qvoqve in *Bejeren* ad *Arstadaasen*; in *Salangen* ad angustias jugi prope *Övre- & Nedre-Vand*; in *Sör-Reisen* ad clivos rivuli supra *Finsæt* (latit. bor. c. 69° 7); in *Maalselven* ad partem inferiorem convallis tractu prædii *Solid*, ubi latit. bor. c. 69° 9 attingit.

42. LEPIGONUM SALINUM, Fr.

Hab. qvoqve in *Throndenæs*, unde id prius indicavi, pluribus locis in tractu prædiorum *Harstadhavn & Seljestad*; in insula *Senjen* ad *Stagnæs*; nec non ad parvulam insulam *Havneholmen* prædio pastoris *Tranøensis* adjacentem, ubi latit. bor. c. 69° 10 attingit.

43. ALSINE STRICTA, Wg.

Hab. qvoqve rara herba hujusce agri in cacumine alpis *Silfavarre* convallis *Börselv Porsangriæ* parce, ibi latit. bor. 70° 18—20 attingens. Cum *Wahlenberg* & post eum plures auctores huc speciei sepala „*sine ullis nervis*“ attribuunt, hoc de plantis exsiccatis fructiferis vix unquam valet, quorum sepala nervis elevatiusculis subtribus, lateralibus apicem versus subevanidis notata sunt.

44. ALSINE BIFLORA, Wg.

Hab. qvoqve in *Ofoten* ad *Laxetind*; in *Salangdal* ad alpes prope *Lund*; in *Sör-Reisen* in alpe *Middagsfjeld*; in *Maalselven* in *Mauken*, in *Kalvehovedet*, in *Langfjeldene* prope *Beinelv*, in *Istinderne*; in *Skjervø* ad jugum inter *Rotsundelv & Sörkjosen*; in *Börselv Porsangriæ* in *Silfavarre*, ubi latit. bor. 70° 18--20 attingit.

LINEÆ.

46. LINUM CATHARTICUM, L.

Hab. quoque in *Bejern* ad *Solö* & *Muldjord*, ad *Arstadaasen*; in *Gildeskaal* ad *Indyr*, ad *Dal* copiose; in *Ofoten* ad *Lidland* & *Lidlandskaret*; in *Kvæsfjord* tractu prædiorum *Vig* & *Vogteren* copiose; in *Throndenæs* ad *Skaanland* (latit. bor. c. 68° 35').

GERANIACEÆ.

46b. GERANIUM ROBERTIANUM, L.

Hab. nov. civ. Floræ arct. Norv. in *Stegen* ad radicem alpis *Præstkontinden*, unde agronomus *I. Haukland* specimen misit. Loco latit. bor. attingit c. 67° 56'.

HYPERICINEÆ.

46c. HYPERICUM HIRSUTUM, L.

Hab. nov. civ. Floræ arct. & rara Norvegiæ in *Bejeren* ad *Arstadaasen*, ubi specimina optime evoluta florifera d. 15^{to} Aug. æstatis infaustæ 1867 legi; nec non in *Gildeskaal* ad radicem jugi supra *Indyr*, ubi non florens sed caulibus marcidis præcedentis anni calyce characteristico etiamtum ornata visa est. Loco ultimo latit. bor. 67° 3-4 attingit. Sic arctica Flora Norvegiæ, si *Hyperica* antehac indicata rite determinata sint, tres species generis hujusce mire numerat.

OXALIDEÆ.

47. OXALIS ACETOCELLA, L.

Hab. quoque in convalli *Bejeren* ad *Muldjord*, prope *Solövand* ad radicem alpis *Seglfjeld*, ad *Arstadaasen*; in *Ofoten* ad *Lidland*, ad rupes intra *Evenæs*; in *Hadselö Vesteraaliæ* ad *Melbo* altius quam 500 ped. supra mare ascendens; in insula *Rollen* ad *Ibbestad*; in *Salangen* prope *Övre-Vand*, ad *Lund* convallis *Salangdal*; in *Sör-Reisen* ad clivos supra *Finsæt*; in *Maalselven* per totam convallem frequenter copiose ad radices jugorum ex. gr. quoque ad prædia *Sandnæs*, *Svultenvig*, *Bugten*, *Moen*, ad convallem lateralem *Tagelvdal*, porro ad *Grönlid*, ad *Löberg* altius quam 500 ped. supra ripas fluminis ascendens, ad *Iselvmo* convallis lateralis *Kirkesdal*, ad *Nordmoen*, ad *Nergaard*, ad *Rostamo*, nec non per convallem lateralem longissimam *Bardu* ad *Brandmo*, ad *Stormoen*, ad radicem alpis *Blaa-*

bjerg, ad *Strömsmo*, ad alpem adjacentem *Rubben* partis intimæ convallis supra terminum Pini adscendens, socia *Ara-bidis alpina*; in insula *Tromsö* antehac indicata parcius sed seminibus maturis gaudens. Ut herbæ vernaes plures ex. gr. *Circæa alpina* & *Corydalis fabacea* quoque *Oxalis* præcipue in filicetis agri arctici sedem figit, ante expansionem perfectam frondis filicum florens, dein ab his inumbrata & occultata, ut vera amplitudo distributionis extra tempus breve veris difficulter cognoscatur.

TAMARISCINEÆ.

48. MYRICARIA GERMANICA, *Desv.*

Hab. quoque in *Maalselven* non solum ad partem inferiorem fluminis *Divielv* sed etiam ad superiorem intra prædium intimum *Frihedslid*; in *Skjervö* ad partem interiorem convallis *Reisendal*; in *Porsangria* ad ostium littorale fluminis *Staburselv*; juxta fl. *Börselev* tam remotius a mari quam fere ad ostium.

LEGUMINOSÆ.

49. PHACA FRIGIDA, *L.*

Hab. quoque in *Salangdal* ad alpes prope *Lund*; in *Sör-Reisen* ad *Middagsfjeld* altius supra terminum Betulæ; in *Maalselven* ad montem *Akka* infra terminum Pini, ad alpem *Kalvehovedet*, ad *Mauken*, juxta *Beinelv* infra terminum Betulæ, ad *Istinderne* item; in *Balsfjord* juxta *Sagvand* infra terminum Pini; in *Skjervö* ad *Vinnelys* convallis *Reisendal*; in *Varangria meridionali* ad cataractam inter *Klostervand* & *Goalsejavre*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Altenelv* ad tractum templi *Masi*, ad jugum inter *Lappojavre* & *Gæthasjduodar*, ad rivum lacui *Sjuosjavre* affluentem prope hospitium, juxta fl. *Jesjok* ad *Oudaldas*, juxta fl. *Karasjok* ad *Beskinjarga*, ad *Holganjarg* ad *Nitomokke*.

49b. OXYTROPIS LAPPONICA, *Gand.*

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Meraftenklumpen*; in *Salangdal* ad alpes prope *Lund*; in *Sör-Reisen* ad *Middagsfjeld*, in *Maalselven*, unde antehac non notata, ad *Kalvehovedet*, ad *Langfjeldene* juxta *Beinelv*, ad *Rostoffjeld*, omnibus locis supra terminum Betulæ vulgo nascens.

49c. OXYTROPIS CAMPESTRIS, *DC.* β SORDIDA.

Hab. quoque in *Varangria meridionali* ad *Bugönæs* copiose prope littora maris.

49d. ASTRAGALUS ALPINUS, L.

Varians *dilutus*: calyce & legumine pilis stramineis (non nigricantibus) hirsutis occurrit in *Finmarkia* *Altensi* ad jugum inter *Nalganas* & *Spjerkojokka*.

49e. ASTRAGALUS OROBOIDES, L.

Hab., antehac ad *Fiskevaagfjeldet* *Saltdaliae* lectus, quoque in *Bejeren* ad *Meraftenklumpen* supra terminum *Betulae*.

50. TRIFOLIUM PRATENSE, L.

Hab. quoque in *Gildeskaal* ad *Indyr*; ad *Bodö*; in *Kvæfjord* ad clivos prope *Vig* & *Vogteren* copiose; in *Salangen* ad *Sjöveien*, ingrediens fere ad mediam partem lacus *Övre-Vand*; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen* passim, ad *Dybvaog*; in insula praedii pastoris *Tranöensis*; in insula *Senjen* prope *Gibbostad* parcissime.

50b. TRIFOLIUM REPENS, L.

Hab. quoque in *Gildeskaal* ad *Indyr*; in *Bejeren* a litore maris procedens per totam convallem usque ad *Heminghyt*, ubi copiose et ad *Troelid* passim; ad *Bodö*; in *Vesterålia* ad *Hadselö*; in *Kvæfjord* tractu praediorum *Vig* & *Vogteren*; in *Ofoten* ad *Ungsmalö*, inter *Lidland* & *Lerosen*, in *Laxetind* 4–500 ped. supra mare ascendens, in convallem subalpinae intra *Lerosen* c. $\frac{1}{4}$ milliar. a litore maris omni cultura procul sese removens, 900–1000 ped. supra mare ascendens; in *Salangen* a *Sjöveien* inde ad *Elvevold* ingrediens, ubi copiose, nec non in jugum juxta *Övre-* & *Nedre-Vand* positum ascendens; in *Sör-Reisen*, ubi in *Bærkollen* 8–900 ped. supra mare ascendens, juxta *Reisenvand* usque ad *Finsæt* ingrediens; in insula pastoris *Tranö*; in insula *Senjen* juxta *Laxelv* usque ad *Grönlid* (c. $1\frac{1}{2}$ milliar. a mari) ingrediens, ad *Kvanaas*, in tractu praedii *Gibbostad* frequenter; in *Lenvig* quoque juxta *Finfjordvand*; praeterea in territorio magis boreali ad littora ipsa & prata sublittoralia saepe frequenter sed locis a litore remotioribus hactenus non visum, sic quoque ad littus sinus *Kjöllefjord* (latit. bor. c. $70^{\circ} 57'$) *Finmarkiae orientalis*.

51. LOTUS CORNICULATUS, L.

Hab. quoque in *Bejeren* passim per convallem a praediis littoralibus *Solö* & *Arstad* inde ad *Troelid*, in *Meraftenklumpen* & alpes interiores prope *Arstaddal* supra terminum *Be-*

tulæ altius adscendens; in *Gildeskaal* ad *Indyr*; ad *Bodö*; ad *Rostnæsodden* sinus *Bejerenfjord*; in *Ofoten* supra *Lidland*, in alpem *Laxetind* supra terminum *Betulæ* adscendens usque ad 1800 ped. supra mare, ad *Ungsmalö*, ad rupes calcareas intra *Evenæs*; in *Vesteraalia* in insula *Hadselö* ex gr. prope *Melbo*; in *Thronenæs* per tractum totum inter *Harstad* & *prædium pastoris*, secus viam per isthmum latum totum *Kvæfjordeidet*, ibi ad radices montium sat adscendens, ad *Skaanland* & intra hæc prædia $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ milliar. a littore sese removens; in *Salangen* ad *Sjøveien*, unde ad partem exteriorem lacus *Övre-Vard* ingrediens; in *Sör-Reisen* in *Bærkollen* c. 1000 ped. supra mare adscendens, juxta *Reisenvand*, juxta *Tömmervigvand* & alibi, ad alpes prope *Östgaard* convallis *Gumpendal* altius occurrens; in insula *Senjen* tractu interiore ad *Langhouy* districtus *Græsmysrkoven*, ad *Renlidkollen* (c. $\frac{3}{4}$ milliar. a littore), ad tractum prædii *Gibbostad* frequenter, prope *Lysbottenvand* a littore remotius.

52. LATHYRUS MARITIMUS, Big.

Hab. quoque in *Kvænangen* inter *Lille-Strømmen* & *Navet*; ad *Store-Lærrisfjord*; in *Porsangria* inter *Valdak* & *Stabursnæs*; in *Tanaffjord* ad *Lille-Lerpollen*; in *Varangria meridionali* ad *Elvenæs* & ad littora partis interioris sinus *Kjøffjord* frequenter.

54. LATHYRUS PRATENSIS, L.

Hab. quoque in *Bejeren* prope *Muldjord* & *Solö*, ad *Arstadaasen*; in *Gildeskaal* ad *Dal*; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*, ad *Ungsmalö*, in alpem *Laxetind* 4—500 ped. supra mare adscendens; in *Vesteraalia* ad insulam *Hadselö*; in *Kvæfjordeidet* ad radices montium altius adscendens; in *Thronenæs* inter *Skaanland* & *Lysvand*; in *Sör-Reisen* ad *Nordstrømmen*, in montem *Bærkollen* c. 500 ped. supra mare adscendens; in insula *Havneholmen* prædii pastoris *Tranöensis*; nec non in insula *Senjen* ad tractum prædii *Gibbostad*.

55. VICIA SEPIUM, L.

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Solö* & *Muldjord*, ad *Arstadaasen*; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lidlandskaret* præcipue in alnetis pygmæis clivorum sicciorum; in *Hadselö* *Vesteraaliæ* adscendens prope *Melbo* altius quam 500

ped. supra mare; in *Kvæfjord* altius ad clivos prope *Vig & Vogteren*, in *Kvæfjordeidet* monte *Rödmuldheien* non procul.

56. VICIA CRACCA, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Solö*, ad *Arstadaasen*, in alpem *Merastenkumpen* altius supra terminum *Betulæ* ascendens, per convallem usque ad *Troelid* procedens; in *Gildeskaal* ad tractum inter *Sund & Skovvold* frequenter; ad *Bodö*; in *Ofoten* ad *Evenæs*, inter *Lidland & Lerosen*, ad *Ungsmalö*, in alpem *Laxetind* ad terminum *Betulæ* 12—1300 ped. supra mare ascendens; in *Vesteraalia* ad *Hadselö*; in *Kvæfjord* ad tractum prædiorum *Vig & Vogteren*, in isthmo *Kvæfjordeidet* elevatius supra mare; in *Salangen* a *Sjövvien* inde ad *Övre-Vand* ingrediens; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*, in *Bærkollen* 900—1000 ped. supra mare ascendens; in insula *Senjen* juxta *Laxelv* ad partem superiorem convallis procedens, ad *Kvanaas*, ad *Gibbostad*, ubi etiam in paludosis, in alpes a litore remotiores prope *Lysbottenvand* ad terminum *Betulæ* ascendens; in *Lenvig* in jugum humiliter inter *Finfjordvand & Maalselven* positum ascendens; in *Maalselven* ad *Aasen*, quoque ad partem interiorem convallis ex. gr. ad clivos supra *Nordmoen & Nergaard* & per fundum convallis frequentius usque intra *Sverrevold* ingrediens, prope *Skjæggenæs* in montem *Kalvehovedet* c. 1100 ped. supra ripas fluminis ascendens; in *Skjervö* ad *Sokkelvig*, in *Hukö*; ad *Komagfjord*; in insula *Seiland*, ad *Komagæs*; in parochia *Hammerfest* ad *Riperfjorddal*; in *Porsangria* ad *Repvaag*, juxta *Børselv* c. 1 milliar. a litore ingrediens; ad introitum sinuli *Kalvig*; in *Tanafjord* ad *Lille-Lerpollen*, juxta *Tanaelv* ingrediens usque intra cataractam *Storfossen* (longius intra *Polmak*); in *Varangria meridionali* juxta *Pasvigelv* ad *Svanvig*, immoda cataractam inter *Klostervand & Galsejavre* ingrediens.

56b. VICIA SYLVATICA, L.

Hab., antehac pro *Saltdalen & Sörfolden* annotata, quoque ad radices jugorum convallis *Bejeren* frequenter sc. prope *Muldjord & Solö*, ad *Arstadaasen*, prope *Heminghyt*, ad *Troelid*; nec non in *Gildeskaal* inter *Sund & Skovvold* sat frequenter.

57. ANTHYLLIS VULNERARIA, L.

Hab. quoque in infima parte convallis *Bejeren* ad clivos supra *Solö & Muldjord* parcius; in *Ofoten* supra *Lidland &*

Lidlandskaret copiose; in *Throndenæs* ad *prædium pastoris*, ad prædia *Skaanland*, unde a littore $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ milliar. sese removens.

ROSACEÆ.

58. RUBUS ARCTICUS, L.

Hab. quoque in *Maalselven* ad partem intimam convallis *Dividal* intra *Frihedslid* non parce; in *Skjervö* in parte inferiore convallis *Reisendal* passim usque ad *Seima*, si non interius; in *Alten* per convallem *Tverelvdal* & ramos terminales ejus usque ad *Stilla* & in convallem *Vestelvdal*; in *Porsangria* juxta partem extimam fluminis *Staburselv* parcius; in *Varangria meridionali* juxta *Pasvigelv* ad *Risto* prope *Klostervand*, ad cataractam inter *Klostervand* & *Goalsejavre*, inter *Goalsejavre* & *Bossojavre*, ad *Gaddehuobal*, inter *Vagetimjavre* & *Baggjavre*, nec non intra lacum hunc intimum juxta flumen ipsum, porro latere *Rossico* ad pagum prope *Baggjavre*, in insula *Savasuolo* nec non in *Store-Menikasö*, dein juxta *Langvand* copiose, juxta *Neidenelv* frequenter; præterea in *Finmarkia* continentali interiore juxta *Altenelv* frequenter copiose sc. loco c. 1 milliar. infra *Masi*, ad tractum templi *Masi*, ad *Duogasmoske*, in betuletis jugi montani ad ripas lacus *Lappjavre*, prope *Gatkasjduodar* copiose sed tantummodo steriliis (a. 1864) visus, inter hunc locum & lacum *Sjuosjavre*, ad ripas hujus & rivi ei prope hospitium affluentis frequenter copiose, juxta flumen *Jesjok* ad *Oudaldas* & alibi frequenter, juxta fl. *Karasjok*, ubi ad pagum ejusdem nominis loco altius quam 400 ped. supra mare elevato maturas baccas die 14to Aug. 1864 legi, denique ad partem supremam fluminis *Tanaelv* ad *Holmen*, ad *Bavda*.

60. RUBUS IDÆUS, L.

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Solö*, ad *Arstadaasen*, ad *Heminghyt*, ad *Troelid*; in *Ofoten* in alnetis clivorum supra *Lidland* & *Lidlandskaret*, ad rupes intra *Evenæs*; in *Kvæffjord* prope *Vig* & *Vogteren*, in *Kvæffjordeidet* ad radicem montium; in *Throndenæs* ad *Harstadhavn*, inter *Skaanland* & *Lysvand*; in *Salangen* ab *Övre-Vand* inde ad *Lund* & *Moholtet*, ubi in alpes supra terminum *Betulæ* altius adscendens; in *Sör-Reisen* ad *Finsæt* copiosius, ad *Nordströmmen*, ad *Dybvaag*, prope *Östgaard* convallis *Gumpen-*

dal; in insula *Senjen* ad *Solberg*, ad *Gibbostad* parce; in *Maalselven* a *Vasbrönden* prope ostium inde frequenter copiosissime usque ad *Ulleberg* convallis lateralis *Dividal*, per convallē *Bardu* usque ad *Blaabjerg* & *Strömsmoen*, ubi ad *Rubben* supra terminum Pini adscendens, in alpes *Istinderne* male evolutus singillatim altius quam 1100 ped. supra ripas fluminis adscendens; in *Balsfjord* ad *Storstennæs* copiose; in insula *Tromsö* parce, ad *Flöifjeld* in regionem betulinam superiorem adscendens; in *Skjervö* per convallē *Reisendal* usque ad *Vinnelys* & *Hurrika*, si non etiam interius, copiose, ad *Rotsundelv*, in *Hukö* (c. 70° 1) parce, ad *Norbotten* sinus *Kvænangen* copiosius, ad *Kjækan*; in *Alten* inter *Jöraholmen* & *Eiby* parcus.

60 b. POTENTILLA NIVEA, L.

Hab. quoque in *Salangdal* ad alpes prope *Lund* supra terminum Betulæ; in *Maalselven* ad *Rostafjeld* supra terminum Betulæ, ad ripas fluminis *Divielv* intra *Frihedslid* infra terminum Pini delapsa; in *Porsangria* ad monticulum *Tsjokkasj* prope *Staburselv*, in tractu lacus *Laxevand* (*Skovanvarre*); præterea in *Finmarkia continentali* interiore tractu *Masi* ad rupes juxta rivum flumini prope templum affluentem, omnibus locis novissime nominatis infra terminum Betulæ occurrens.

60 c. POTENTILLA NORVEGICA, L.

Hab. nov. civ. Flor. *Finmarkicæ* in *Varangria meridionali* ad ripas fluminis *Pasvigelv* infra cataractam inter *Golsejavre* & *Bossojavre*, ab omni cultura remotissima, sed parcissime lecta, tamen bene evoluta.

61. POTENTILLA TORMENTILLA, Scop.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Arstadaasen* prope terminum Betulæ, ad clivos supra *Muldjord* & *Solö*, prope *Heminghyt* per sylvas montanas elevatius adscendens, ad *Troelid* copiose; in *Gildeskaal* prope *Skovvold* copiose; ad *Bodö*; in *Ofoten* ad *Lidland*, ad paludosa intra *Lerosen*, in alpem *Laxetind* paullo supra terminum Betulæ adscendens; in *Vesteraalia* ad *Hadselö*; in silvis betulinis isthmi *Kvæfjordeidet* frequentius præcipue in regione elevatiore; in *Throndenæs* in sylvis betulinis intra *Skaanland* tam ubique quam ubicunque *Norvegiæ meridionalis*; in insula *Senjen* juxta partem exteriorem fluminis *Laxelv* vulgaris, in partem interiorem quoque ingrediens, inter *Övre- & Nedre-Kvanaas* copiose; in *Maalselven* juxta *Beinelv* infra terminum Pini

occurrens; in insula Tromsø jam ab I. W. Zetterstedt notata non parce; in *Allen* ad jugum interius *Gamasvarre* passim copiose mox infra terminum *Betulæ*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore in jugo inter *Gætkaşduodar* & *Sjuosjavre* in regione betulina suprema frequentius juxta rivos lacubus *Vuoddasjavre* & *Sjuosjavre* affluentes.

62. POTENTILLA ANSERINA, L.

Hab. ad littora maris quoque in *Bejeren* extra *Solö*; in *Gildeskaal* ad *Skovvold*; ad *Bodö*; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*, ubi quoque a littore ipso ad marginem agrorum paullo recedens, ad *Ungsmalö*; in *Vesteraalia* ad *Hadselö*; in *Kvæffjord* intra *Vig* & *Vogteren*; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen* & ad ripas lacus subsalini *Reisenvand*; in insula *Tranö*; in insula *Senjen* ad ostium fluminis *Laxelv*, ad *Kvanaas*, ad *Gibbstad*; in *Skjervö* ad *Rotsundelv*, ad *Sokkelvig*; in insula *Seiland* ad *Kvistnæsffjord*; in parochia *Hammerfest* ad *Riperffjord*; in *Varangria meridionali* ad *Elvenæs* &cet.

63. POTENTILLA ARGENTEA, L.

Hab., antehac a me parcissime lecta ad *Harstadhavn*, passim parcius in hoc tractu, sic quoque ad *Seljestad* & ad prædium pastoris.

64. FRAGARIA VESCA, L.

Hab. quoque per convallem *Bejeren* prope *Solö*, *Heminglyt*. *Troelid* frequentius; in *Gildeskaal* ad *Indyr* & *Skovvold*; in *Ofoten* supra *Lidland* & ad rupes intra *Evnæs*; in *Vesteraalia* ad *Hadselö*; in *Kvæffjord* ad *Vig* & *Vogteren*; in *Thronenæs* inter *Skaanland* & *Lysvand*; in *Sör-Reisen* ad *Dybvaag* copiose, ad *Nordströmmen*, in *Bærkollen* adscendens, ad *Finsæt*, ubi altius quam 400 ped. supra mare adscendens; in insula *Senjen* ad *Solberg*, ad *Gjövög*, ad *Renlidkollen* & *Langhoug* districtus interioris.

64b. GEUM URBANUM, L.

Hab. nov. civ. Flor. arct. Norvegiæ in *Stegen* ad radicem alpium *Præstkontind* secundum specimen ab *Haukland* missum, ibi latit. bor. c. 67° 56' attingens.

66. ROSA MOLLISSIMA, Fr.

Hab. in *Bejeren* ad introitum convallis supra *Solö* & *Muldjord*, ad *Arstadausen*; in *Gildeskaal* ad *Indyr*, ad *Dal*; in *Vesteraalia* ad *Hadselö*, ubi supra *Melbo* c. 400

ped. supra mare adscendens; in *Kvæfjord* ad *Vig & Vogteren* copiose.

67. PRUNUS PADUS, L.

Hab. quoque in *Bejeren* prope *Solövand & ad Troelid*; in *Gildeskaal* ad *prædium pastoris & Indyr*; in *Ofoten* intra *Evenæs*; in *Vesteraalia* in *Hadselö* parcius ex. gr. ad radicem montium inter *Husebykollen & Melbö*; in *Kvæfjord* tractu prædiorum *Vig & Vogteren*; in *Salangdalen* ad *Moholtet*; in *Balsfjord* ad *Sagvandet & cet.*; in *Varangria meridionali* ad *Elvenæs*, ad cataractam inter *Klostervand & Goalsjavre*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Attenelv* ad *Spjerkajokka*, ad locum c. 1 milliar. infra *Masi*, ad tractum templi *Masi*, juxta fl. *Karasjok* ad *Beskinjarga*, ad *Holganjarga*, prope pagum *Karasjok* orgyalis sed fructificans. Interdum variat *pubescens*: foliorum tota pagina inferiore (quoque extra nervos) pubescente. Hæc forma parum notabilis ad *Balsfjord & ad Karasjok* lecta est. Glandulæ petiolares in eodem specimine nunc adsunt, nunc altera nunc ambæ desunt. In omnibus speciminibus a me lectis etiam Nordlandiæ meridionalis racemi erecti; utrum penduli hoc in agro quoque occurrant, animadvertere neglexi.

ONAGRARIÆ.

67b. CIRCÆA ALPINA, L.

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Muldjord & Solö*, ad radicem alpium *Seglfjeld* copiose, ad *Arstadaasen*, ad latera jugi prope *Heminghyt*; in *Ofoten* prope *Lidland*; in *Salangen* prope effluvium lacus *Övre-Vand*; in *Sör-Reisen* ad *Dybaag*, ad *Nordströmmen*, ad *Finsæt* copiose; in *Maalselven*, ubi a Lund prius observata, passim frequenter per majorem partem convallis sc. prope *Svultenvig & Sandnæs* ad radicem alpium *Vasbrönden*, ad *Akka*, prope *Moen*, ad radicem alpium *Mauken*, supra *Skjeggenæs*, supra *Nergaard*, ad radicem alpium *Rostafjeld* visa. Hæc planta in filicetis occulta & facile tempore æstivo prætervisa forsitan multo frequentior est, quam opinari facit.

68. EPILOBIUM MONTANUM, L.

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Solö & Muldjord*, ad radicem alpium *Seglfjeld* copiose, ad latera jugi prope *Heminghyt*; in *Ofoten* prope *Lidland* passim, in alpem *Laxetind* 4—500 ped. supra mare adscendens, ad rupes intra *Evenæs*; in *Kvæfjordeidet* monte *Rödmuldheien* non procul;

in *Throndenæs* inter *Skaanland* & *Lysvand*; in insula *Rollen* prope *Ibbestad*; in *Salangen* prope effluvium lacus *Övre-Vand*, ad *Krogen*; in *Sör-Reisen* ad *Dybvaaq*, ad *Finsæt*, ubi c. 400 ped. supra mare adscendens; in insula *Senjen* ad *Renlidkollen*, ad tractum prædii *Gibbstad*; in *Lenvig* inter *Finfjordvand* & *Renvand*; in *Maalselven* ad angustias *Traangen*, ad latera montium prope *Nergaard* & *Övergaard*.
68b. EPILOBIUM COLLINUM, Gmel.

Hab. nov. civ. Flor. arct. Norvegiæ in *Bejeren* ad *Arstadaasen*; in *Gildeskaal* ad *Indyr*; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*; in insula *Hadselö*; in *Sör-Reisen* ad *Dybvaaq*, ad *Nordströmmen*, ad *Finsæt*; in insula *Senjen* ad *Solberg*; in *Maalselven* inter *Storbakken* & *Solid*, ad radicem alpis *Mauken*; in insulis *Skjervö* & *Hukö*, ubi lat. bor. 70° ægre transgreditur. Nisi fallor, eandem speciem aut ad *Alten* aut ad *Talvig* anno 1852 legi. Forma arctica interdum in *E. lanceolatum* paullo vergere videtur.

68c. EPILOBIUM LINEARE, Mühlenb.

Hab. quoque in insula *Kvæö*; in *Sör-Reisen* supra *Finsæt*; in insula *Tromsö*; in insula *Hukö*; in *Aiten* passim ex gr. ad *Garråjok* copiose; in *Porsangria* ad tractum ostii fluminis *Börselv*, ubi latit. bor. 70° 18—20 attingens; in *Varangria boreali* ad *Sandskjær* (Nordvi); in *Varangria meridionali* ad tractum prædii *Elvenæs*, ad cataractam inter *Klostervand* & *Goalsejavre*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad *Spjerkojokka*, nec non juxta fl. *Karasjok* ad *Oadsessanjarga*.

HALORAGEÆ.

69. CALLITRICHE VERNA (L) Lönr.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Solö* & *Troelid* (*); in *Kvæfjordeidet*; in *Throndenæs* ad *Harstadhavn* (*); in *Salangen* ad *Eløervold*; in *Sör-Reisen* in lacunis subsalinis lacus *Reisenvand* (*), ad *Finsæt*; in insula *Senjen* ad *Laxelv*, inter *Nedre-* & *Övre-Kvanaas*, in tractu lacuum *Hegvand* & *Lysbottenvand*; in *Maalselven* ad *Lerbekmo* (*), ad *Nordmoen* (*), ad *Skjeggenæs*, paullo extra *Övergaard*; in *Skjervö* ad partem exteriorem convallis *Reisendal*; in *Porsangria* prope pagum *Laxelv* (*), ad tractum lacus *Laxevand* (*); in *Varangria boreali* ad *Iakobselv* prope *Vandelv* (*); in *Varangria meridionali* juxta *Pasvigelv* ad *Elvenæs*, ad *Klo-*

stervand (*Brandhoug*), ad *Bagjajavre*, nec non latere *Rossico* in insula *Savasuolo* & prope pagum ad lacum *Bagjajavre*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Karasjok* ad *Nitomokke*, ad *Spininjarga*, juxta partem interiorem fluminis *Tanaelv* ad *Holmen*. — Supra asterisco loca notata sunt, unde specimina aut viva aut bene in herbario conservata tam exacte examinare potui, ut ea ad hanc speciem non ad *C. polymorpham* (Lønr.) attinere certe dijudicare audeam. Hæc ultima hactenus non a me in agro arctico visa est. In speciminibus arcticis sitgmata sæpe etiam breviora sunt, qvam cel. *Lönnroth* ea in Botan. Notis (1867 Nr. 1) delineavit.

70. CALLITRICHE AUTUMNALIS, L.

Hab. quoque in *Porsangria* prope pagum *Laxelv*; in *Varangria meridionali* non tantummodo in lacu *Klostervand* sed quoque in lacu intrapósito *Goalsejavre*.

70b. HIPPIURIS VULGARIS, L. * MARITIMA, *Heil.*

Hab. foliis latis eximie evoluta in *Porsangria* inter ostium fluminis *Staburselv* & *Valdak*. Forma primaria, sæpe ut „fluviatilis“ aberrans, per majorem partem agri passim frequenter occurrit, sic quoque in lacu subsalino *Reisevand*, ibi ad „maritimam“ paullo accedens.

71. MYRIOPHYLLUM SPICATUM, L.

Hab. quoque in *Throndenæs* in lacu prope *Nipen*; in *Varangria meridionali* in *Goalsejavre* fluminis *Pasvigelv*, utroque loco sterile lectum.

72. MYRIOPHYLLUM ALTERNIFLORUM, DC.

Hab. quoque in *Bejeren* in *Grönvatne*, in *Arstadvand*; in *Ofoten* intra *Evenæs* in *Kirkevand*; in insula *Senjen* in *Laxelv*; in *Throndenæs* in lacu prope *Nipen* (florens!); in *Alten* in lacunis infra *Reipas*; in *Porsangria* prope ostium fluminis *Börselv*, ubi latit. bor. 70° 18—20 attingens; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv* in lacu supremo rivi *Vandelv*; in *Varangria meridionali* in *Klostervand*, in *Goalsejavre*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore in *Altenelv* prope *Masi*, in lacu *Lappojavre* jugi montani, in flumine *Iesjok*, in flumine *Karasjok* frequentius & florens lectum. Ad plurima loca tantum sterili lecto, de determinatione tamen vix dubitandum esse videtur.

PORTULACEÆ.

73. MONTIA FONTANA, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Dokmo*, prope *Heminghyt*; in *Gildeskaal* ad *Skovvold*; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*, in *Kvæffjord* ad prædium *Vig*; in *Vesteraalia* ad *Hadselö*; in *Salangdal* ad *Moholtet*; in insula prædii pastoris *Tranö*; in *Skjerrö* ad *Sokkelvig*; ad *Komagffjord* & *Lille-Lærrisffjord*; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*; in *Varangria meridionali* ad littora sinus *Kjöffjord*.

CRASSULACEÆ.

74. SEDUM ACRE, L.

Hab. planta, in hoc agro vulgo littoralis v. sublittoralis, quoque prope introitum convallis *Bejeren* ad *Arstadaasen* & ad clivos supra *Muldjord* & *Solö* nonnihil supra mare ascendens; in *Ofoten* ad clivos graminosos supra *Lidland*, item in *Kvæffjord* supra *Vig* & *Vogteren*; nec non in *Sör-Reisen* ad ripas lacus subsalsi *Reisenvand*.

GROSSULARIÆ.

76. RIBES RUBRUM, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad jugum supra *Muldjord* & *Solö*, ad radicem alpium *Seglfjeld* copiosius, ad *Heminghyt* & latera jugi juxtapositi, ad *Troelid* prope *Tullaaen*; in *Gildeskaal* supra *Indyr*; in *Ofoten* ad radices rupium intra *Evenæs* passim copiosius; in *Kvæffjord* ad *Vig* & *Vogteren* parcius; in *Throndenæs* ad tractum prædii *Harstad*, ad prædium pastoris in ipso littore parce; in *Salangen* prope effluvium lacus *Övre-Vand* & prope *Lund* convallis *Salangdal*; in *Sör-Reisen* supra *Finsæt*; in *Maallselven* ingrediens juxta fl. *Divielv* intra *Frihedslid*, & ad *Ulleberg*, ubi copiose fructificans d. 19no Sept. 1866 visum est, c. 400 ped. supra ripas fluminis ascendens, per convallem logissimam *Bardu* usque ad *Strömsmo* procedens; in *Skjervö* ad *Vinnelys* & *Hurrikov* & *Seima* convallis *Reisendal*, in insula *Hukö* parcissime; ad *Komagffjord*; in *Porsangria* juxta fl. *Staburselv* frequentius; in *Tanaffjord* ad *Store-Lerpollen*; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv* infra *Flintenæs*; in *Varangria meridionali* juxta *Pasvigelv* ad cataractam inter *Klostervand* & *Goalsejavre*, nec non latere *Rossico* in insula *Store-Menikasö*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Al-*

tenelv ad *Spjerkojokka* ibi elevatius supra ripas fluminis adscendens, ad tractum templi *Masi*, ad *Duogasjmoske*, in jugo in insula lacus *Lappojavre*, juxta fl. *Karasjok* ex. gr. ad *Beskinjarga*, ad *Holganjarga* ad lingvam pagi *Karasjok*, ubi baccas maturas legi, nec non juxta partem interiorem fluminis *Tanaelv* ad *Holmen*.

SAXIFRAGÆ.

77. SAXIFRAGA COTYLEDON, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad latera jugi prope *Arstad*, ad *Rostnasodden* sinus *Bejerenfjord* prope æqvor maris; in *Gildeskaal*, unde a *Gunnero* jam memorata, ad rupes supra *Indyr* & ad *prædium pastoris* passim frequenter & largiter florens fere ad littora ipsa singillatim procedens. Hoc loco afferre liceat, plantam in præfectura *Altensi Finmarkiæ*, locis prius a me indicatis, hactenus non florigeram visam esse.

78. SAXIFRAGA ADSCENDENS, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Arstadaasen*.

78b. SAXIFRAGA TRIDACTYLITES, L.

Hab. quoque in *Ofoten* ad *Evenæs*, nec non in *Throndenæs* ad *Blaabjergskaret* supra *Nipen*, ut secundum specimina pauca & manca videtur. Qvales hæc species & præcedens in speciminibus arcticis meis repræsentantur, hoc in agro non bene distinctæ apparent. Specimina nempe *S. adscendentis* sæpe humiliora magisque viscosa quam vulgo sunt, dum *S. tridactylites* e contrario interdum paullo altior quam solet, ut illa æquet immo superet, dein nudiuscula minusque viscosa evadit. *Saxifraga adscendens* alterâ tamen vulgo robustior, pedicellis brevioribus, fructibus forsitan magis ovalibus, stigmatibus sæpe paullo excedentibus distincta. Specimina e *Blaabjergskaret* reportata ad *S. adscendentem* fere eodem jure quam ad *tridactylitem* referenda sunt, & si plantam prius (Ind. supp. Norv. arct.) ad *Havnvig* insulæ *Rollen* notatam quoque ad *tridactylitem* alicui referre placeat, non rationes bene fundatas objicere possim. Plantæ ad *Arstadaasen*, ad *Evenæs*, ad *Harstadhavn* (l. c.) nominatæ vix alii speciei, quam cui subjunxi, adnumerari possunt.

78c. SAXIFRAGA HIRCULUS, L.

Hab., jam a *Gunnero* pro „*Varangria*“ (s. *Varangria boreali*) indicata sed ultimo tempore ibi non denuo reperta.

qvoqve in *Finmarkia continentali* interiore ad paludem lon-
gissime protractam in jugo montano inter *Masi & Lappojavre*
positam copiose, paullo infra terminum *Betulæ* nascens; nec
non in *Varangria meridionali* ad paludes vastissimas inter
Övre-Klostervand & montes Vætsjer passim copiosius.

78d. CHRYSOSPENIUM TETRANDRUM, *Lund.*

Hab. qvoqve ad *Store-Lerpollen* sinus *Tanafjord* passim.

UMBELLIFERÆ.

79. ANGELICA SYLVESTRIS, *L.*

Hab. qvoqve in *Bejeren* supra *Muldjord & Solö*, ad
Arstadaasen, prope *Heminghyt*; in *Gildeskaal* ad *Skovvold*;
ad *Bodö*; in *Ofoten* ad tractum prædii *Evenæs*, ad *Ung*
smalö, ad paludes supra *Lerosen*; in *Vesteraalia* ad *Hadselö*;
in *Salangdal* ad *Lund*; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*, ad
Finsæt; in insula *Senjen* ad *Tranöbotten*, prope *Trollduvand-*
convallis Laxelv, ad *Elvebakken* districtus *Græsmyrskoven*,
ad *Kvanaas*, ad *Gibbostad*, prope lacus *Lysbotten & Heg-*
vand; in *Lenvig* inter *Renvand & Finfjordvand*; in *Maals-*
elv n prope *Tagvand*, supra *Löberg*, in alpem *Kalvehovedet*
c. 1100 ped. supra ripas fluminis adscendens, juxta *Beinelv*,
ad *Övrby*, in radicem alp̄is *Rostafjeld* adscendens, ad *Ulle-*
berg convallis *Dividal*, in *Bardu* ad *Aasen*, ad *Braadmo*, ad
radicem alp̄is *Blaabjerg*; in *Balsfjord* prope *Storstennæs*; in
Skjervö in insula *Hukö*; in *Börselv Porsangriæ* qvoqve ad
ostium fluminis.

80. CARUM CARVI, *L.*

Hab. qvoqve in *Bejeren* ad *Solö*, ad *Heminghyt*; in
Gildeskaal ad *Skovvold*; ad *Bodö*; in *Ofoten* inter *Lidland*
& *Lerosen*; in *Kvæfjord*; in *Salangen* ad *Sjöveien*, ad *Elv-*
vold; in *Sör-Reisen* ad *Dybvaag*, ad *Nordströmmen*; in
insula prædii pastoris *Tranö*; in insula *Senjen* ad *Elvebakken*
districtus *Græsmyrskoven*, ad *Kvanaas*, ad *Gibbostad*; in
tractu maxime elevato isthmi inter *Finfjordvand & Maals-*
elven positi ad rudera prædii deserti *Solhaug* hodie parce, prius
secundum relata vicini copiosius; in *Maalselven* ad prædium
exterius *Finbakken* copiose, ad interius *Övergaard* non parce
& hodie omnino ut spontaneum, sed ante c. 43 annos ibi a;
primo colono (*Anders Johnsen*), secundum quæ ipse mihi dixit,
seminibus a *Balsfjorden* allatis seminatum, ad prædia *Kong-*
lid & Gannæs juxta lacum *Rostavand* copiose sed ibi qvo-
qve a primo colono seminatum, ad *Ulleberg* convallis *Divi-*

dal, ad *Fagerliddal*, ad *Finkrogen* convallis *Bardu*; in *Balsfjord* ad *Storstennæs*; in insula *Tromsö* & continente adjacente; in *Skjervö* ad *Rotsundelv*, ad *Sokkelvig*, in insula *Skjervö*.

80b. HERACLEUM SIBIRICUM, L.

Hab. nov. civ. Flor. arct. Norvegiæ, quam ut talem recipere non prius ausus sum, quoque i *Throndenæs* ad ipsa littora maris prædii *Skaanland* humile nec bene evolutum sed tamen fructificans & vix dubie hoc loco ut spontaneum considerandum (latit. bor. c. 68° 35.)

81. PIMPINELLA SAXIFRAGA, L.

Hab. quoque in *Gildeskaal* tractu prædii *Indyr* tam ad radicem jugi quam ad rupes maritimas; ad *Bodö*; nec non in *Kvætfjord* prope *Vig* & *Vogteren* copiose.

CAPRIFOLIACEÆ.

81b. VIBURNUM OPULUS, L.

Hab. in *Bejeren* ad introitum convallis in jugo supra *Solö* & *Muldjord*posito passim copiosius, nec non ad *Arstadaasen* copiose, ubi plantam non alibi hujus agri a me visam primos flores aperientem die 15to Aug. 1867 legi.

RUBIACEÆ.

82. GALIUM BOREALE, L.

Hab. in *Bejeren* ad partem exteriorem convallis tractu prædii *Solö* sed ibi non tam vulgare quam in pluribus districtibus magis borealibus; in *Gildeskaal* ex. gr. tractu prædii *Dal* frequentius; ad *Bodö*; in *Ofoten* ad *Evenæs*, inter *Lidland* & *Lerosen*; in *Vesteraalia* in insula *Hadselö*; in *Kvæfjordeidet*; in *Throndenæs* ad tractum prædiorum *Skaanland* commune; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen* passim, juxta *Tömmervigvand* copiose; in insula *Senjen* ad partem exteriorem convallis *Laxelv* sc. extra *Gamnæsvand*, ad tractum prædii *Gibbostad* sat commune; in *Skjervö* in insula exteriore *Hukö* (70°—70° 1); in parochia *Hammerfest* ad *Riperfjorddal*, locum polo proximum hactenus observatum, latit. bor. c. 70° 26 attingens; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Altenelv* ad *Spjerkojokka*, ad locum c. 1 milliar. extra templum *Masi*, ad tractum *Masi* copiose, ad *Duogasmoske*, juxta *Jesjok* ad *Bæjaljnes* (c. 2 milliar. intra ostium) procedens, juxta fl. *Karasjok* frequentius copiosius ex. gr. intra *Beskinjarga*, ad *Nitomkkejogasj*, ibi in ju-

gum forsitan 2—300 ped. supra ripas fluminis adscendens, ad *Mannevarrenjarga*, ad lingvam pagi *Karasjok*, ad *Holganjarga*, nec non juxta partem interiorem fluminis *Tanaelv* ad *Holmen*, ad *Barda*.

83. GALIUM ULIGINOSUM, L.

Hab. quoque in *Skjervö* ad partem interiorem convallis *Reisendal*; in *Alten* per convallem *Tverelvdal* usque ad *Mandsverk* frequenter; in *Varangria meridionali* juxta fl. *Pasvigelv* prope *Elvenæs*, ad *Borisgleb*, ad effluvium lacus *Nedre-Klostervand*, ad cataractam inter *Klostervand* & *Goalsejavre*, inter *Goalsejavre* & *Bossojavre*, ad *Gaddelnobal*, inter *Vagetinjavre* & *Bagjajavre*, juxta flumen ipsum intra *Bagjajavre*, nec non latere *Rossico* ad pagum juxta *Bagjajavre*, in insula *Savasuolo*, in *Store-Menikasö*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Altenelv* frequenter ad *Spjerkojokka*, ad locum c. 1 milliar. infra *Masi*, ad tractum templi *Masi*, ad *Duogasmoske*, in jugo in insula lacus *Lappojavre*, juxta *Sjuosjavre* & ad rivum ei prope hospitium affluente, ad lingvam pagi *Karasjok*. Variat quoque latitudinem foliorum, sic ex. gr. forma insigniter latifolia prope effluvium lacus *Klostervand* lecta est.

84. GALIUM PALUSTRE, L.

Hab. quoque in *Bejeren* prope *Solö*; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*, ad *Ungsmalö*; in *Vesteraalia* ad *Hadselö*; in *Salangen* ad *Elvevold*; in insula prædii pastoris *Tranö*; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*, ad isthmum inter *Dybvaag* & *Tömmervigvand* luxurians; in insula *Senjen* ad *Laxelv* prope *Troldbuvand*, ad tractum prædii *Gibbostad* frequenter; in *Lenvig* juxta *Finsjordvand*; in *Maalselven* inter *Storbakken* & *Sollid*, inter *Fredriksberg* & *Myre* frequenter, circa *Nordmoen* passim, prope *Övergaard*, ad *Foslid*; in insula *Tromsö*; in *Skjervö* ad partem exteriorem convallis *Reisendal*, ad *Sokkelvig*.

85. GALIUM TRIFIDUM, L.

Hab. quoque in insula prædii pastoris *Tranö* parce; in *Maalselven*, unde antehac non notata, ad *Kirkenæs*, ad *Nordmoen*, utrobique parce; in *Skjervö* ad *Norbotten* sinus *Kvænangen*; nec non in insula *Seiland* prope littora sinus *Kvistnæsfiord*.

87. GALIUM APARINE, L. — INFESTUM, Kit.

Hab. quoque prope *Grötö* Nordlandiæ, unde ægre agnoscendum specimen florigerum *Haukland* misit.

+ GALIUM VERUM, L.

In agro arctico investigandum, cum id in confiniis *Nordlandia* ad *Nærö* legi.

87b. ASPERULA ODORATA, L.

Hab. nov. civ. Flor. arct. Scandinaviæ in *Bejeren* ipso introitu convallis ad *Arstadaasen*, ad radicem alp̄is *Seglfjeld*, utroque loco præcipue ultimo inter filices & herbas luxuriantes copiose; nec non in *Gildeskaal* ad radicem jugi prope *Skovvold* non parce (c. 68° 58).

DIPSACEÆ.

88. TRICHFRA ARVENSIS, *Schrad.*

Hab. quoque in *Gildeskaal* ad *Indyr*; in *Ofoten* ad clivos graminosos supra *Lidland* tam copiose, ut ab eo cærulescant, ibi quoque socia *Dactylidis glomeratæ*, nec non inter *Lidland* & *Lidlandskaret*; in *Throndenæs* ad *Lille-Skaanland* parcius; in insula *Rollen* (latit. bor. c. 68° 47) secundum specimen a pastore *Ellefsen* missum.

88b. SUCCISA PRATENSIS, *Mönch.*

Hab. antehac pro duobus locis agri arctici nostri indicata quoque in *Gildeskaal* ad *Skovvold*, ad *Indyr* quum ad radicem jugi tum ad rupes sublittorales.

COMPOSITÆ.

89. NARDOSMIA FRIGIDA, *Hook.*

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Merastenkumpen*, ad *Grönvatne*, utroque loco paullo infra terminum *Betulæ*; in *Sör-Reisen* in *Middagsfjeld* supra terminum *Betulæ*; in *Maalselven* in *Mauken* termino *Betulæ* elevatius, in *Rostafjeld*; in *Skjervö* ad ipsum fundum convallis *Reisendal* ad *Kjelderen*, ad *Vinnelys*, loca parum supra mare elevata; in *Alten*, unde indicata, ex. gr. ad *Goskavarre*, in tractu pagi *Talvig*; in parochia *Hammerfest* ad partem interiorem convallis *Riperfjorddal*; in *Porsangria* intra *Igeldas*; in *Varangria* meridionali ad *Klostervand* prope *Svanvig* & alibi, juxta partem intimam fluminis *Pasvigelv* intra lacum supremum *Bagjåvare*; præterea in *Finmarkia* continentali interiore juxta *Altenelv* ad *Spjerkojokka*, ubi *Paridis quadrifoliæ* & *Ranunculi reptantis* socia, ad totum tractum *Masi* copiose in ripis *Betula* & *Salicibus* consitis, ad *Sjuosjavre*, infra alp̄m *Rastegåise*. Ad locum p̄enultimum folium legi,

ejus lamina ab auricula baseos ad apicem diametro 25 centimet. metitur.

90. TUSSILAGO FARFARA, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Solö*, ad *Arstad*, ad *Heminghyt*; ad *Bodö*; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*; in *Kvæfjord* prope *Vig* & *Vogteren*; in *Throndenæs* ad *Harstadhavn*; in *Salungen* supra effluvium lacus *Övre-Vand*, ad *Lund* & *Moholtet* convallis *Salangdal*, ibi in alpes elevatius supra terminum *Betulæ* adscendens; in insula *Senjen* ad *Laxelv*; in insula *Tromsö* & continente adjacente; in *Skjervö* ad insulam *Hukö*; ad *Komagfjord* & *Lille-Lærrisfjord*; in parochia *Hammerfest* ad *Riperfjorddal*; in *Porsangria* prope *Bækgeoppe*, ad *Børselv* latit. bor. 70° 18—20), ad *Laxevandene* (*Skovanvarre*); in *Tana*fjord ad *Store-Lerpollen*; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*.

91. ACHILLEA MILLEFOLIUM, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad littore maris prope *Solö*; ad *Bodö*; in *Ofoten* ad *Lidland*; in *Vesteraalia* ad insulam *Hadselö*; in *Kvæfjord* ad tractum prædiorum *Vig* & *Vogteren*; in *Salungen* ad jugum humile prope lacus *Övre- & Nedre-Vand*; in *Sör-Reisen* ad *Nordstrømmen*; in insula prædii pastoris *Tranöensis*; in insula *Senjen* ad *Gibbstad*; in *Skjervö* ingrediens per convallem *Reisendal* usque ad *Vinnelys* & *Sappen*, in insulis *Skjervö* & *Hukö*; in *Alten* ingrediens per convallem principalem usque ad *Eiby*, per *Tverelvdalen* ad radicem alpium *Nalghanas*; in parochia *Hammerfest* ingrediens per *Riperfjorddal* usque supra domicilium supreme habitantis, c. 2 milliar. a mari sese removens; in *Porsangria* ad pagum *Laxelv* c. $\frac{1}{4}$ milliar. a mari remotum, ad *Stabursnæs*, ad *Børselv*, ad *Repvaag*; ad *Kjöllefjord*; in *Tana*fjord ad *Store-Lerpollen*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore, unde prius a me commemorata, juxta fl. *Karasjok* ad lingvam pagi quum in cultis tum extra; præcipue tamen ad ripas ex alluvie recente fluminis mæandrici formatas & ad latus inferius lingvarum memorabilium positas, sc. ad *Spininjarga*, ad *Bagjevuoppenjarga*, ad *Holganjarga*, ad *Itkonjarga*, nec non juxta partem superiorem fluminis *Tanaelv* ad *Holmen*, ad *Bavda*.

92. PYRETHRUM INODORUM, Sm.

Hab. in littoribus frequentior quoque in insula *Senjen*

ingrediens juxta fl. *Laxelv*, ad *Troldbuwand*, ad *Varselvmo* tractus *Græsmyrskoven*; per *Salangdal* usque ad *Mohottet*, prædium fere supremum; in *Maalselven* per convallem *Bardu* usque ad *Strömsmo*; in *Finmarkia orientali* ad *Kjöllefjord*; in jugo *Seidaffjeld* loco c. 600 ped. supra mare elevato visum ad fossam lateralem viæ tunc nuper erutæ.

93. ARTEMISIA VULGARIS, L.

Hab. quoque in *Bejeren* a *Solö* inde ad *Hemingshyt* & *Troelid* ingrediens; ad *Bodö*; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*; in *Throndenæs* ad prædium *Skaanland*; in *Salangen* ad *Sjövcien* & ad *Elvevold*, ingrediens usque ad *Præstebakken*; in *Sör-Reisen* ad *Bakkefjord*, ad *Nordströmmen*, ad *Finsæt*; in insula *Senjen* ad *Solberg*, ad *Grönlid* convalis *Laxelv*, per *Græsmyrskoven* ingrediens ad *Varselvmo* & *Langhouy* (copiose), dein ad *Gibbstad*; in *Lenvig* procedens ad *Finfjordejdet*.

94. TANACETUM VULGARE, L.

Hab. quoque in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lidlandskaret*, intra *Evenæs*, in *Vesteraalia* ad *Hadselö*; in *Kvæfjord* ad *Vig* & *Vogteren*; in *Throndenæs* in juniperetis ad prædia *Skaanland* & inter hæc & *Lysvand*; in insula prædii pastoris *Tranöensis*; in *Sör-Reisen* juxta lacum *Tömmervigvand*, ad *Nordströmmen* in juniperetis frequentius; nec non valde inopinate in insula *Hukö* pluribus locis & omnino spontaneum, ubi latit. bor. 70° ægre transgreditur.

95. ANTENNARIA CARPATHICA, Bl. & Fing.

Hab. rara planta quoque in *Sör-Reisen* in cacumine alpis *Middagsfjeld* altius supra terminum *Salicum* majorum; nec non in *Maalselven* ad alpem *Mauken* supra terminum *Betulæ*.

95b GNAPHALIUM SYLVATICUM, L.

Hab. per convallem *Bejeren* passim sc. supra *Solö* & *Muldjord*, & frequentius, ut videtur, in parte interiore magis continentali convalis ad latera jugi prope *Hemingshyt*, ad *Troelid*; in *Throndenæs* ad isthmum jugi prope *Nipen*, latit. bor. atingens c. 68° 35'. Cæterum in iisdem tractibus & præcipue in magis borealibus *Gnaphalium Norvegicum* frequenter copiosissime occurrit, in *Nordlandia* boreali & *Finmarkia* utraque sola species, quantum constat, generis (sensu strictissimo limitati).

95c. SENECIO VULGARIS, L.

Hab. quoque ad *Bodö*; in *Throndenæs* ad ipsa littora maris prope *Skaanland* copiose, certe spontaneus. Quoque magis arctoam versus occurrit & antehac indicatus est, ex. gr. in insula *Tromsö*, ubi eum sæpius & semel copiosissime offendi, sed omnibus locis hisce tamen, ut videtur, majore jure ut adventitius considerari debet.

96. CREPIS TECTORUM, L.

Hab. quoque in *Bejeren* per convallem a *Solö* inde ad *Heminghyt* & *Troelid* frequentior procedens; in *Ofoten* ad clivos supra *Lidland* & *Lidlandskaret*; in *Kvæffjord* ad tractum prædiorum *Vig* & *Vogteren*; in *Sör-Reisen* ad *Finsæt* ad clivos & in tectis; in insula *Senjen* ad ostium fluminis *Laxelv* in tectis, per *Græsmyrskoven* ad *Elvebakken* progrediens, prope *Gibbostad* ad littora maris; in *Maalselven* ad *Nordmo*; in *Finmarkia continentali* interiore, unde prius eam indicavi, copiose ad prata pagi *Karasjok*.

97. CREPIS PALUDOSA, Koch.

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Solö* & *Muldjord*, ad *Arstadaasen*, supra *Heminghyt*; in *Kvæffjord* ad tractum prædiorum *Vig* & *Vogteren*, ad *Kvæffjordeidet* prope *Rödmuldheien* copiose; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*; in insula *Senjen* ad *Laxelv* prope *Troldbuvand*, ad *Kvanaas*, ad tractum prædii *Gibbostad*, ad *Lysbottenvand*; in *Lenvig* juxta *Finfjordvand*; in *Maalselven*, unde jam a Lund indicata, ad radices alpium *Mauken*, *Kalvehovedet*, *Rostafjeld*, supra prædium *Nergaard*; in *Skjervö* ad *Rotsundelv*, ad *Reisendal* in *Bergskoven*, in insula *Hukö*; in *Alten* frequentior præcipue per convallem *Tverelvdal*; ad convallem sinui *Lille-Lærrisfjord* adjacentem; in parochia *Hammerfest* ad partem interiorem convallis *Riperfjorddal*, ubi latit. bor. attingit fere eandem atqve ad *Russemark Porsangriæ*, ubi eam prius notavi.

98. LEONTODON AUTUMNALIS, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Solö*, ad *Heminghyt*; in *Ofoten* prope *Evenæs*, ad *Ungsmalö*; ad *Kvæffjordeidet*; per convallem *Salangdal* passim; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*, ad *Finsæt* (ibi varians flore ochraceo); in insula *Senjen* ad *Laxelv*, ad *Kvanaas*, ad *Gibbostad*, juxta *Hegvand* & *Lysbottenvand*; in *Skjervö* ad convallem *Reisendal* ex. gr. prope *Vinnelys*, in insulis *Hukö* & *Skjervö*; in insula

Seiland ad *Komagnæs*; in *Porsangria* inter *Stabursnæs* & *Valdak*, ad *Börselv*, ad *Repvaag*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta partem superiorem fluminis *Tanaelv* ad *Holmen*, juxta fl. *Karasjok* prope pagum, nec non juxta affluens *Jesjok* passim usque supra *Oudaldas*.

99. MULGEDIUM SIBIRICUM, *Less.*

Loca specialia juxta fl. *Karasjok* sunt *Javrasmuotkenjarga* & *Holganjarga*, ubi ad alluvies recentes lateris inferioris lingvarum betuliferarum nascitur.

99b. MULGEDIUM ALPINUM, *Less.* FL. ALBO.

Hab. in *Finmarkia* ad *Talvig*.

100. SONCHUS ARVENSIS, *L.*

Hab. quoque in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*; in *Throndenæs* ad tractum prædii *Harstadhavn* infra *Sama* & ad prædium pastoris, dein ad prædia *Skaanland*; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*; in insula *Senjen* ad ostium fluminis *Laxelv*, ad *Kvanaas*, ad *Gibbstad*; in *Balsfjord* ad *Storstennæs*; in *Skjervö* ad *Rotsundelv*; in *Porsangria* ad *Rusemark*, ubi latit. bor. attingit 70° 28–29. Nullibi hujusce agri observatus est nisi ad littora ipsa maris.

100b. HIERACIUM PILOSELLA, *L.**)

Hab. quoque in *Vesteraalia* in insula *Hadselö* ad clivos supra *Melbo*; nec non in *Tanafjord* ad *Lille-Lerpollen*, ubi latit. bor. 70° 29–30 attingit. Alibi agri, extra locum antehac indicatum, nunquam visum est a me.

101. HIERACIUM CYMOSUM, (*L.*) *Fr.*

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Arstadaasen*; in *Porsangria* prope ostium fluminis *Börselv*, ibi latit. bor. 70° 18–20 attingens; in *Tanafjord* ad *Lille-Lerpollen*; præterea in limite *Finmarkiæ continentalis* interioris juxta fl. *Altenelv* ad *Spjerkojokka*.

101b. HIERACIUM HYPERBOREUM, *Fr.*

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Arstadaasen*, ad clivos jugi supra *Solö* & *Muldjord*; in *Throndenæs* ad *Lille-Skaanland*; in *Skjervö* ad insulam *Hukö* (ubi „optimum“), latit. bor. 70° ægre transgrediens.

*) Hieracia fere omnia hoc in opusculo allata ab illustrissimo monographo eorum Professore E. Fries benigne determinata sunt secundum specimina ad omnia loca specialia his nominata lecta.

101c. *HIERACIUM ALPINUM*, L.a. *H. alpinum*, *Backh.*

Hab. quoque in *Bejeren* ad alpes prope *Arstaddal*; in *Kvæfjord* ad *Kvæö*; in *Throndenæs* ad *Lille-Skaanland*; in *Maalseven* ad *Dividal*; in *Malangen* ad *Mortenshals*; ad alpes circum *Tromsödal*; in *Alten* ex. gr. ad *Borras*, ad *Pescades*, ad *Goskavarre*, ad alpes prope *Talvig*; ad alpes convallis *Lille-Lærrisfjord*; in insula *Seiland* ad *Hönsebyfjeld*; prope *Hammerfest*; in *Porsangria* ad *Repvaag*, ad *Silfavarre* convallis *Börselv*, ad *Veinæs* prope *Russemark*, ad tractum lacuum *Laxevandene*; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad tractum templi *Masi*, prope *Sjuosjavre*

b. *H. holosericeum*, *Backh.*

Hab. formæ huc proxime accedentes in *Bejeren* ad alpes prope *Arstaddal*; ad alpes circum *Tromsödal* (*Flöifjeld*); in insula *Seiland* ad *Hönsebyfjeld*; in *Porsangria* prope *Repvaag* (latit. bor. 70° 45'—46').

c. *H. eximium*, *Backh.*

Hab. in *Kvæfjord* ad *Kvæö*, ad *Borkenæs*; ad alpes *Altenses*; ad alpes inter *Kaafjord* & *Talvig* positas; in *Tanen* ad *Rastegaise*, alpem a *Wahlenberg* visitatam; præterea in Lapponia Rossica *Varangria meridionali* adiacente ad alpem *Galgoaive*.

d. *H. gracilentum*, *Backh.*

Hab. in *Alten* ad *Tverelvdalen*.

101d. *HIERACIUM NIGRESCENS*, *Wild.*

Hab. in *Bejeren* ad alpes prope *Arstaddal*; in insula *Senjen* inter *Lysbottenvand* & *Hegvand* („forma recedens“); in alpebus *Altensibus* ex. gr. *Goskavarre*; ad alpes inter *Kaafjord* & *Talvig* positas, prope *Talvig*; in insula *Seiland* ad *Hönsebyfjeld* („forma ad *H. atratum* vergens“); in parochia *Hammerfest* ad *Riperfjorddal*; in *Porsangria* ad *Veinæs* prope *Russemark*, ad tractum lacuum *Laxevandene*; in *Tanen* ad jugum *Seidafjeld*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad jugum inter *Lappojavre* & *Masi*, nec non prope *Sjuosjavre*.

101e. *HIERACIUM RUPICOLUM*, *Fr.*

Hab., antehac a cle. *Th. Fries* ut „*H. anfractum*“ e *Fjeldma Tanensi* indicatum secundum notulam ipsius, quoque in insula *Senjen* ad tractum prædii *Klöven*, ad *Gibbostad*

(„ff. recedentes“); ad tractum pagi *Talvig* (ubi quoque „forma recedens a me hactenus non visa“ Fries); in *Tanen* ad *Lille-Lerpollen* copiosius & bene evolutum. Sic species, antehac e terris *mediterraneis*, *Gallia* & *Germania* australi, *Hungaria* (Fries *Epier. Hierac. p. 83*) cognita, hoc loco latit. bor. 70° 29–30 mire attingit.

101f. *HIERACIUM PALLIDUM*, *Biv.*

Hab. quoque in *Kvæfjord* ad *Vig* & *Vogteren*; in insula *Skjervö*; ad convallem sinui *Lille-Lærrisfjord* adjacentem (forma primaria & *H. pallidum* * *crinigerum*, *Fr.*); ad *Kjöllefjord* (*H. pallidum?* *persicifolium*, *Fr.*), ibi latit. bor. 70° 57 attingens; nec non in *Tanafjord* ad *Lille-Lerpollen*.

101g. *HIERACIUM SAXIFRAGUM*, *Fr.*

Hab. in *Kvæfjord* ad *Borkenæs* („optimum“), ad *Vig* & *Vogteren*; in *Ofoten* ad *Lidlandskaret*; in insula *Rollen* prope *Ibbestad* (Pastor *Ellefsen* & ipse), ubi latit. bor. attingit c. 68° 47.

101h. *HIERACIUM MURORUM* * *SILVATICUM*, *L.*

Hab. in insula *Rollen* ad tractum prædiorum *Ibbestad* & *Havnvig* in convalli *Maalselven* (loc. spec. non notata); in *Alten* prope *Reipas*, ad *Eibydal*, ad jugum *Borras* prope terminum *Betulae*, ad *Eibydal*; ad *Komagfjord* & *Lille-Lærrisfjord*; prope *Hammerfest*; in *Porsangria* ad *Veinæs* prope *Russemærk*, ad *Børselv*; in *Varangria meridionali* ad effluvium lacus *Klostervand*.

* *H. atrovirens*, *Froel.*

Hab. in insula *Senjen* ad tractum prædii *Klöven*; in *Alten* infra *Reipas*; in *Varangria meridionali* ad effluvium lacus *Klostervand*.

* *H. medium*, *Jord.*

Hab. in *Sör-Reisen* ad *Finsæt*, inter *Gottesjord* & *Tömmervig*; in *Maalselven* ad *Nordmoen*; in insula *Tromsö* (f. dubia); in *Alten* prope *Reipas*; ad tractum pagi *Talvig*; in *Varangria meridionali* ad *Elvenæs* & alibi juxta fl. *Pasvigelv*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad *Karasjok*.

* *H. m. alpestre*, *Grieseb.*

Hab. in *Kvæfjord* ad *Kvæö*; in insula *Maasö* (c. 71°); nec non in *Laxefjord* ad *Lebesby*.

101i. *HIERACIUM MURORUM* * *SUBCÆSIUM*, *Fr.*

Hab. per majorem partem agri frequens in *Kvæfjord* ad

Kvæö, ad *Vig & Vogteren*, ad *Kvæfjordeidet*; in *Thron denæs* ad prædium pastoris; in *Salangdal* ad *Krogen*; in *Sör-Reisen* ad *Gottesjord*, ad *Nordströmmen*, ad *Finsæt*; ad *Kastnæshavn*; in insula *Senjen* ad tractum prædii *Gibbostad*; in *Malangen* ad *Mortenshals*; ad insulam *Tromsö*; in *Skjervö* ad insulam *Hukö*; ad *Alten*, ad *Kaafjord*, ad *Talvig*; ad *Komagfjord & Lille-Lærrisfjord*; in insula *Seiland* ad *Komagnæs*; in *Porsangria* ad *Börselv*; in *Tana fjord* ad *Store-Lerpollen*, ad *Lille-Lerpollen*; in *Varangria meridionali* ad *Elvenæs*; præterea prope limitem *Finmarkiæ continentalis* interioris juxta *Altenelv* ad *Spjerkojokka*, juxta^a partem mediam fluminis *Tanaelv* ad alpem *Rastegaise*.

* *H. aggregatum*, *Backh.*

Hab. in *Maalselven* ad tractum prædiorum *Sollid & Storbakken* (latit. bor. 69° 9—12.

* *H. atrato-murorum*, *Fr.*

Hab. in *Ofoten* ad *Evenæs*, inter *Sommervig & Lidlandskaret*, ad *Lerosen*, ad alpem *Laxetind* supra terminum *Betulæ*; in *Kvæfjord* ad *Kvæö*; in insula *Senjen* ad tractum prædii *Gibbostad*; in *Maalselven* ad tractum prædiorum *Sollid & Storbakken*, ad *Nordmorn*, ad *Rostafjeld*; in insula *Tromsö*; in insulis *Skjervö & Hukö*; ad *Alten*, ad *Talvig*; ad *Komagfjord*; in *Porsangria* prope *Repvaag*, ad *Börselv* in alpe *Silfavarre*, ad tractum lacuum *Laxevandene*; in *Tana fjord* ad *Store-Lerpollen*, ad *Lille-Lerpollen*; in *Lapponia Rossica Varangriæ meridionali* adjacente ad *Gaddeluobal*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Altenelv* ad *Spjerkojokka*, porro ad *Sjuosjavre*, ad alpem *Dafteroavve* prope *Karasjok*.

101k. HIERACIUM CÆSIUM, *Fr.*

Hab. in *Ofoten* ad *Lidland*; in *Kvæfjord* ad *Kvæö*, ad *Vig & Vogteren*; in insula *Rollen* prope *Ibbestad*; in insula *Tromsö*; in insula *Hukö* (f. dubia); ad *Talvig*; ad *Komagfjord & Lille-Lærrisfjord*; in insula *Seiland* in alpem *Hönsebyfjeld* adscendens; in *Porsangria* ad *Börselv*; in *Tana fjord* ad *Lille-Lerpollen*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore prope *Sjuosjavre*.

101l. HIERACIUM ATRATUM, *Fr.*

Hab. in *Bejeren* ad alpes prope *Arstaddal*; in insula *Senjen* ad *Laxelv*, ad tractum prædii *Gibbostad*; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*; ad alpes circum *Tromsödal*; ad

alpes prope *Talvig* & inter tractum huncce & *Kaafjord*; prope *Hammerfest*; in *Porsangria* ad *Veinæs*, ad jugum inter *Russemark* & *Oldervig*; in *Tanaafjord* ad *Lille-Lerpollen*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad jugum vastissimum inter *Masi* & *Sjuosjavre*, dein prope hunc lacum, nec non juxta partem superiorem fluminis *Jesjok*.

101m. HIERACIUM VULGATUM, *Fr.*

Hab., semper „magis paucifolium & macrum quam in Scandinavia meridionali“, in *Kvæfjord* ad *Kvæö*, ad *Vig* & *Vogteren*; in insula prædii pastoris *Tranöensis*; in insula *Senjen* ad tractum prædii *Klöven*, ad *Græsmyrskoven* (quoque „forma dubia *H. Dovrensi* forsitan potius adnumeranda“), ad *Gibbostad*, ad *Hegvand* & *Lysbottenvand*; in *Maalselven* ad *Foslid*; in *Malangen* ad *Mortenshals*; in *Skjervö* ad insulam *Hukö*; in *Alten* ex. gr. infra *Reipas* (quoque f. latifolia); in parochia *Hammerfest* ad *Riperfjorddal* („macilentum!“); in insula *Maasö*, ubi latit. bor 71° attingens; in *Porsangria* ad *Repvaag*, ad *Veinæs* prope *Russemark*; in *Tanaafjord* ad *Lille-Lerpollen*; in *Varangria meridionali* ad *Elvenæs*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Altenelv* ad *Duogasjmoske*, dein prope *Sjuosjavre*, juxta fl. *Karasjok* ad *Assebakke*.

* *H. vulgatum* * *nemorosum*, *Pers.*

Hab. in *Kvæfjord* ad *Kvæö*; in insula *Senjen* ad *Klöven*; in *Alten* ad partem inferiorem convallis; in *Porsangria* ad tractum lacuum *Laxevandene*; in *Varangria meridionali* prope *Elvenæs*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad pagum *Karasjok*, juxta fl. *Tanaelv* ad *Holmen*.

101n. HIERACIUM LAPPONICUM, *Fr.*

Hab. quoque in insula *Senjen* ad *Græsmyrskoven* („f. ramosa“); in *Alten* prope *Reipas* (ubi quoque „forma singularis recedens“), ad *Tverelvdal*; in *Tanaafjord* ad *Lille-Lerpollen*.

101o. HIERACIUM GOTHICUM, *Fr.*

Hab., „macilentius quam in Scandinavia australi“, in *Kvæfjord* ad *Kvæö*, ad *Vig* & *Vogteren*; in *Throndenæs* ad prædium pastoris; in *Sör-Reisen* frequenter ad *Tömmervig*, ad *Gottesjord*, ad *Nordströmmen*, ad *Finsæt*; in insula *Senjen* ad tractum prædii *Klöven*; in *Maalselven* ad tractum prædiorum *Storbakken* & *Sollid*; in *Alten* ex. gr. ad

ripas fluminis infra *Reipas*; in parochia *Hammerfest* ad *Riperfjorddal* (juxta *Dybelv*), ibi latit. bor. 70° 26' attingens; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Karasjok* frequenter copiose (plures formæ! quoque „ad H. umbellatum vergens“) ex. gr. ad pagum ejusdem nominis, ad *Beskinjarga*, ad lingvas betuligeras inter hæc loca.

101p. *HIERACIUM TRIDENTATUM*, *Fr.* (?)

Hab., „a typo primario valde recedens“, in *Kvæfjord* ad *Borkenæs*, ubi latit. bor. c. 68° 46' attingit.

101q. *HIERACIUM PRENANTHOIDES*, *Vill.*

Hab., hoc in tractu eximie polymorphum, in *Bejeren* ad *Arstadaasen*, ad *Heminghyt*, ad *Troelid*; in *Ofoten* intra *Evenæs*; in *Kvæfjord* ad *Vig & Vogteren*, ad *Kvæfjordeidet*; in insula *Rollen*; in *Sör-Reisen* ad *Gottesjord*, ad *Nordströmmen*, ad *Finsæt*; in insula prædii pastoris *Tranöensis*; in insula *Senjen* ad *Laxelv*, ad tractum prædii *Gibbstad*, ad *Lysbottenvand*; in *Maalselven* ex. gr. ad tractum prædiorum *Storbakken & Sollid*, ad *Nordmoen*, ad radices alpium *Rostafjeld* convallis intimæ; in *Malangen* ad *Mortenshals*; in insula *Tromsö* & continente adjacente; in *Skjervö* ad *Hukö* (ubi quoque f. paucifolia), ad insulam *Skjervö* (quoque f. paucifolia); in *Alten* ad *Bosekop*, ad *Nedre-Alten*, ad *Tveretvdalen* & alibi; ad tractum prædii *Talvig* (quoque f. paucifolia); in insula *Sörö* ad *Bredvig*; in *Porsangria* ad *Repraag*; in *Tanaifjord* ad *Lille-Lerpollen*, ad *Store-Lerpollen*; nec non in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*.

101r. *HIERACIUM ELATUM*, *Fr.* (?)

Hab., ut forma huc pertinens secundum determinationem acutissimi *C. J. Lindberg*, in *Ofoten* ad *Lidland*.

101s. *HIERACIUM CROCATUM*, *Fr.*

Hab., ut „forma recedens & dubia“, in *Throndenæs* ad prædium pastoris, ad *Lille-Skaanland*, ad *Nipen*; in *Porsangria* ad *Börselv*, ibi latit. bor. 70 c 18–20 attingens; in *Varangria meridionali* ad effluvium lacus *Nedre-Klostervand*.

101t. *HIERACIUM RIGIDUM*, *Hartm.*

Hab. in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*; in *Kvæfjord* ad *Kvæö* („typicum“), ad *Vig & Vogteren*, ad *Kvæfjordeidet*; in insula prædii pastoris *Tranöensis*; in insula *Senjen* ad tractum prædii *Klöven*, ad *Lysbottenvand* („dubium“); in *Alten* prope *Reipas* (latit. bor. fere 70°); in

Varangria meridionali ad *Nedre-Klostervand* („f. ad *H. crocatum* nimis vergens“); præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Karasjok* (ubi quoque „forma involucris pilosis recedens“).

101u. *HIERACIUM UMBELLATUM*, L.

Hab. in *Bejeren* ad *Arstadaasen*; in *Throndenæs* ad *Lille-Skaanland*; in *Skjervö* ad insulam *Hukö* (c. 70° 1); in *Allen* ex. gr. ad *Elvebakken*, ad *Reipas*; in parochia *Hammerfest* ad *Riperfjorddal*, ibi latit. bor. c. 70° 26 attingens; in *Varangria meridionali* secus fl. *Pasvigelv* ad effluvium lacus *Klostervand* („dubium“, *H. æstivum* secund. determ. amici *C. I. Lindberg*), nec non latere *Rossico* ad *Store-Menikasö*, ad tractum alpis *Galgoaive*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad ripas fluminis *Karasjok* frequenter copiose ex. gr. ad pagum, ad *Assebakke*, nec non juxta fl. *Jesjok* usque ad viciniam lacus *Sjuosjavre*.

* *H. umbellatum* v. *lactaris*, Bertol.

Hab. in *Throndenæs* ad *Sandtorv*.

102. *CARDUUS CRISPUS*, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Solö*; in *Gildeskaal* ad *Indyr* (incertus, rosula foliorum sola tempore verno visa); in *Ofoten* ad *Lidlandskaret*; in *Kvæfjord* ad *Vig & Voyteren* non parce; in *Throndenæs* ad tractum prædii *Harstadhavn* frequentior, ad *Lille-Skaanland*; in *Salangen* prope effluvium lacus *Övre-Vand* & ingrediens per convallem usque ad *Præstebakken*; locum c. 1 milliar. a littore maris remotum; in *Sör-Reisen* ad *Bakkejord*, ad *Nordstrømmen*; in insula *Senjen* ad *Gibbostad*.

102b. *CIRSIUM ARVENSE*, Scop.

Hab., per tractum *Nordlandiæ* a me visitatum præcedente certe multo rarius, quoque in *Ofoten* ad *Lidlandskaret*; in *Kvæfjord* ad *Vig & Voyteren* (fere var. *ferox*) parcius.

102c. *CENTAUREA SCABIOSA*, L.

Hab. nov. civ. Flor. arct. Norvegiæ in *Stegen* ad radices alpis *Præthkontinden*, unde specimen bene evolutum misit Agronomus *Haukland*, qui in litt. plantam certe spontaneam & sat copiosam esse refert. Hoc loco latit. bor. c. 67° 56 attingit.

CAMPANULACEÆ.

102d. CAMPANULA LATIFOLIA, L.

Hab., antehac e *Saltdalen* indicata, quoque in *Bejeren* ad *Arstadaasen* copiose; nec non in *Gildeskaal* ad *Skovvold*.

VACCINIEÆ.

103. OXYCOCCOS PALUSTRIS, Pers.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Dokmo*; in *Ofoten* ad paludosa intra *Evenæs* circum *Kirkevand*; in *Vesteraalia* ad insulam *Hadselö*; in *Kræfjord* intra *Vig & Vogteren*; in insula prædii pastoris *Tranöensis*; in *Sör-Reisen* ad *Bærkollen* loco 8—900 ped. supra mare elevato; in insula *Senjen* ad tractum prædii *Gibbstad*; in *Maalselven* supra *Nordmoen* ad radicem alpis *Mauken*, ad *Skjeggrenæs*; in insula *Skjervö*; in *Varangria meridionali* prope *Elvenæs*, ad cataractam inter *Klostervand & Goalsejavre*, nec non latere *Rossico* ad *Store-Menikasö*, ad radicem alpis *Galgoaive*, ibi supra terminum Pini adscendens; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad jugum inter *Lappojavre & Masi*, inter *Lappojavre & Gøthasjduodar*, ibi termino Betulæ sat appropinquans, prope *Sjuosjavre*, nec non juxta fl. *Karasjok* infra radicem alpis *Dafteroavve*. Omnia specimina a me lecta ad varietatem „O. microcarpus“ dictam pertinent, etiam specimina ad *Nærö* in limite dioecesis Nidarosiensis carpta. Transitus ad formam primariam tamen non omnino desunt. Sic ad *Store-Menikasö* baccis majoribus & pedunculis ad latus alterum passim puberulis occurrit, in *Bejeren* quoque pedunculis passim puberulis.

ERICEÆ.

104. CASSIOPE HYPNOIDES, Don.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Arstadaasen*, ad *Meraftenklumpen*; in *Ofoten* ad *Laxetind*; in *Salangdal* ad alpes supra *Moholtet*; in *Sör-Reisen* ad *Middagsfjeld*, ad alpes supra *Östgaard* convallis *Gumpendal*; in *Maalselven* ad *Istinderne*, ad *Mauken*, ubi descendens infra terminum Betulæ, ad *Kalvehovedet*; in insula *Seiland* ad *Hönsebyfjeld*; in *Porsangria* ad *Silfavarre* convallis *Börselv*; in *Tanaffjord* ad jugum supra *Lille-Lerpollen*, ad jugum inter *Store-Lerpollen & Nyborg Varangriæ* passim; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Allenelv* ad jugum supra *Spjerkojokka* & supra templum *Masi*.

105. CASSIOPE TETRAGONA, *Don.*

Hab. quoque in *Sör-Reisen* ad *Middagsfjeld* parcius supra terminum Salicum majorum; in *Maalselven* ad alpem *Mauken* jam prope terminum Betulæ apparens, ad *Kalvehovedet* loco c. 1300 ped. supra ripas fluminis elevato copiose, ad *Langfjeldene* prope fl. *Beinelv* ad terminum Betulæ apparens, ad jugum juxta *Divielv* supra *Sörlid*, ad *Istinderne* prope terminum Betulæ jam apparens, dein copiosa ad basin cacuminis ipsius; in *Skjervö* ad jugum inter *Rotsundelv* & *Sörkjosen*; præterea ad limitem *Finmarkiæ continentalis* interioris prope *Spjerkojokka*.

106. ARCTOSTAPHYLOS OFFICINALIS, *W. & Gr.*

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Solö* & *Muldjord*, ad *Arstadaasen*; in *Porsangria* ad introitum sinuli *Kulvig*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Attenelv* ad *Spjerkojokka* in regione betulina superiore, ad tractum templi *Masi*, juxta fl. *Karasjok* ad *Beskinjarga*, ad radicem alpibus *Dafteroavve*, juxta partem superiorem fluminis *Tanaelv* ad *Storfossen*.

107. CALLUNA VULGARIS, *Salisb.*

Hab. quoque in *Bejeren* præcipue in regione elevatione ad juga supra *Muldjord* & *Solö*, supra *Heminghyt*; in *Ofoten* ad paludosa intra *Evenæs*, supra *Lerosen*; in *Vesteraalia* ad insulam *Hadselö*; in *Kvæfjord* passim; in insula *Senjen* ad partem superiorem convallis *Laxelven* & ad *Græsmyrskoven* copiose, ad *Kvanaas*, ad tractum prædii *Gibbstad*, juxta *Hegvand* & *Lysbottenvand* vulgaris & luxurians; in *Lenvig* inter *Renvand* & *Renelvmø*; in *Skjervö* ad jugum supra *Sörkjosen*, ad *Sokkelvig*, in insulis *Skjervö* & *Hukö*; in insula *Seiland* ad *Komagnæs*; ad tractum oppidi *Hammerfest*, ad littus occidentale sinus *Riperfjord*, ad *Riperfjorddal*; in *Porsangria* inter *Stabursnæs* & *Valdak*, per convallem *Börselev* & copiose in singularibus excavationibus pelviformibus territorii calcarei infra alpem *Silfavarre*; in *Varangria meridionali* juxta fl. *Pasvigelv* ad cataractam inter *Klostervand* & *Goalsjavre* parcius, ad *Gaddeluobal* (quoque flore albo), nec non latere *Rossico* ad insulam *Store-Menikasö*, ad tractum alpibus *Galgoaive*, inter *Vagetimjavre* & *Gaddeluobal*.

108. RHODODENDRON LAPPONICUM, *Wg.*

Hab. quoque in *Sör-Reisen* ad *Middagsfjeld* supra

terminum Betulæ altius; in *Maalselven* ad *Kalvehovedet* c. 1300 ped. supra ripas fluminis, in *Dividal* supra *Sörlid*; in *Allen* ad jugum juxta *Melladal* circa 800 ped. supra mare apprensens & paullo altius adscendens, qui locus polo proximus, ubi a me visum.

109. LEDUM PALUSTRE, L.

Hab. quoque in *Varangria meridionali* juxta fl. *Pasvigelv* prope *Elvenæs*, ibi ad jugum supra terminum Betulæ copiose adscendens, *Diapensia lapponicæ* socium, dein prope *Klostervand* ad *Svanvig*, juxta lacum *Goalsejavre* ubique copiosissime, porro procedens commune ad paludosa juxta lacus & flumen usque intra *Bagjajavre*, tractum intimum lacui *Enare* proximum a me visitatum, nec non eodem modo frequens & copiosum latere *Rossico*, ibi in alpem *Galgoaive* supra terminum Betulæ adscendens, porro frequens ad partem inferiorem fluminum *Neidenelv* & *Munkelv*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Allenelv* ad tractum templi *Masi*, ad jugum prope *Lappojavre* parcius, inter *Lappojavre* & *Gætkasjduodar* in regione betulina superiore, *Rubi Chamæmori* socium, frequens sed macrum, parcius flores edens, anno 1864 quidem non fructificans, dein ad *Sjuosjavre*, juxta fl. *Karasjok* ad *Beskinjarga* copiose, ad *Nittomokke* supra terminum Pini adscendens, ad lingvam pagi *Karasjok* copiosum, ibi ad alpem *Dasteroavve* in regionem betulinam superiorem adscendens.

110. PYROLA SECUNDA, L.

Hab. quoque in *Bejeren* prope *Solövand*, ad *Arstadaasen*, ad *Troelid*; in *Ofoten* supra *Lidland*, intra *Evenæs*; in *Salangdal* prope *Lund*; in *Sör-Reisen* ad *Finsæt*; in insula *Senjen* ad *Kvanaas*, ad tractum prædii *Gibbstad*; in *Maalselven* ad *Nordmoen*; in *Skjervö* ad convallem *Reisen-dal* prope *Vinnelys*, ad *Bergskoven*, in insulis *Skjervö* & *Hukö*; in insula *Seiland*, ibi in alpem *Hönsebyfjeld* altius quam 1400 ped. supra mare adscendens; in parochia *Hammerfest* ad *Riperfjorddal* c. $\frac{1}{2}$ milliar. a marti remota; in *Porsangria* ad introitum sinuli *Kulvig*, ad *Börselv*; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*; in *Varangria meridionali* juxta fl. *Pasrigelv* ad *Elvenæs*, ad cataractam inter *Klostervand* & *Goalsejavre*, inter *Goalsejavre* & *Bossojavre* copiose, ad *Gaddeluobal*, juxta flumen ipsum intra *Bagjajavre*, nec non latere *Rossico* inter *Gaddeluobal* & *Vage-*

timjavre, prope alpem *Galgoaive*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Attenelv* ad tractum templi *Masi*, juxta fl. *Karasjok* intra inosculationem fluminis *Jesjok*, ad *Nitomokke*, ad radicem alpis *Dasteroavve*.

111. PYROLA UNIFLORA, L.

Hab. quoque in *Salangen* inter *Snaglid* & *Præstebakken*; in insula *Senjen* ad *Tranöbotten*; in *Maalselven* ad radicem alpis *Blaabjerg* convallis *Bardu*; in *Skjervö* ad *Reisendal* prope *Vinnelys*; in *Varangria meridionali* juxta lacum *Klostervand* ad sinulum intra *Brændhoug* positum, ad cataractam inter *Klostervand* & *Goalsejavre*, ad *Gaddehuobal*, inter *Vagetimjavre* & *Baggajavre*, juxta flumen ipsum intra *Baggajavre*, nec non latere *Rossico* inter *Gaddehuobal* & *Vagetimjavre*, prope *Galgoaive*.

111b. PYROLA MEDIA, Sw.

Hab., hujusce agri rarissima, quoque in *Skjervö* ad *Reisendal* in jugo prope *Seima* convallis interioris.

111c. PYROLA CHLORANTHA, Sw.

Hab. nov. civ. Flor. arct. Scand. bene evoluta sed parcissime visa in *Bejeren* ad jugum supra *Muldjord*, ibi latit. bor. attingens c. 66° 59'. Flora arctica Norvegiæ sic omnes species Europæas hujusce generis numerat, *Pyrola umbellata* excepta.

112. PYROLA ROTUNDIFOLIA, L.

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Solö* & *Muldjord*, supra *Troelid*; in *Ofoten* ad tractum prædii *Evenæs*, ad *Ungsmalö*; in *Vesteraalia* ad *Hadselö*; in *Kvæfjord* ad clivos supra *Vig* & *Vogteren* altius; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmen*, in alpem *Middagsfjeld* supra terminum *Betulæ* altius adscendens; in insula *Senjen* ad *Tranöbotten*, ad ostium fluminis *Laxelv*, ad *Gibbostad*; in *Maalselven* ad *Akka*, ad *Skjeggenæs*, ad *Beinelv*, ibi in alpes *Langfjeldene* ad terminum *Betulæ* adscendens; in *Skjervö* ad insulam *Hukö* passim, ad insulam *Skjervö*; in *Alten* quoque ad alpem *Gamasvarre* intra *Tverelvdal* positum prope terminum *Betulæ*; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*; in *Varangria meridionali* juxta *Pasvigelv* ad *Elvenæs*, ad cataractam inter *Klostervand* & *Goalsejavre*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Attenelv* ad *Spjerhojokka*, ad tractum templi *Masi*, ad *Duogasmoske*, juxta fl. *Karasjok* ad *Nitomokkejogasj*, ad *Vajamokkenjarga*, ad *Holganjarga*.

GENTIANÆ.

112b. GENTIANA NIVALIS, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad alpes prope *Arstraddal*, ad prata prædii *Troelid* & ad jugum adjacens; in *Ofoten* ad *Lidland*, ad *Ungsmalö*; in *Kvæfjord* ad tractum prædiorum *Vig* & *Vogteren*, ad *Kvæfjordeidet* prope *Rödmuldheien*; in *Throndenæs* prope *Lysvand* intra *Skaanland*; in *Salangen* ad effluvium lacus *Övre-Vand*, ad *Sletten* copiose; in *Sör-Reisen* ad *Bakkejord*, ad *Finsæt*, ad *Bærkollen*, prope *Tömmervigvand*; in *Maalselven* prope *Maalsnæs*, ad *Nordmoen*, ad *Skjeggænæs* in pratis, inter *Fagerliddal* & *Fin-sund* & alibi; in insula *Tromsö* & continente adjacente; in *Skjervö* ad *Sokkelvig*, in insulis *Skjervö* & *Hukö*; ad *Komagfjord*, ad *Lille-Lærrisfjord*; in parochia *Hammerfest* ad partem superiorem convallis *Riperfjorddal*; in insula *Maasö*, ubi latit. bor. 71° attingens; in *Porsangria* ad *Börselv*, inter *Stabursnæs* & *Valdak*; in *Varangria boreali* ad *Paddeby*; in *Varangria meridionali* ad *Svanvig*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Karasjok* ad *Beskinjarga*.

113. GENTIANA CAMPESTRIS, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Solö* & *Muldjord* (quoque flore albo) per convallem procedens usque ad *Heminglyt*, ibi frequenter copiose ad latera jugi paullo adscendens; in *Bejerenfjord* ad *Rostnæsodden*; in *Gildeskaal* ad *Dal*; ad *Bodö*; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*; in *Kvæfjord* ad *Vig* & *Vogteren*; in *Throndenæs* ad prædia *Skaanland* et inter hæc & *Lysvand*; in *Sör-Reisen* ad *Sörströmmen*, ad *Nordströmmen*, ad *Dybvaag*, prope *Tömmervigvand*; in insula *Senjen* ad partem interiorem convallis *Laxelv* supra *Troldbuvand* copiose, ad *Langhoug* tractus *Græsmyrskoven*; in *Skjervö* ad *Rotsundelv* (quoque flore albo) copiose & altius in clivos adscendens, ad *Sokkelvig*, in insulis *Skjervö* (quoque flore albo) & *Hukö*, ibi latit. bor. 70° ægre transgrediens.

114. GENTIANA AMARELLA, L.

Hab. quoque in *Ofoten* ad *Ungsmalö*; in *Throndenæs* ad prædia *Skaanland*.

115. GENTIANA INVOLUCRATA, Rottb.

Hab. quoque in *Bejeren* ad littora prope *Solö*; in *Ofo-ten* ad *Evenæs* ingrediens a littore in isthmum c. ¼ milliar.

ad *Ungsmälö*; in *Throndenæs* ad prædia *Skaanland* copiosissime; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen* copiose, in monte *Bærkollen* 3—400 ped. supra mare adscendens, ad *Finsæt* a littore hodierno remotius; in insula *Senjen* ad ostium fluminis *Laxelv*, ad *Kvanaas*, ad *Gibbostad*; in alpem *Flöifjeld* prope *Tromsö* adscendens ad vel paullo supra terminum Betulæ; in insulis *Skjervö* & *Hukö*; in insula *Seiland* ad *Komagnæs*; in parochia *Hammerfest* ad littus occidentale sinus *Riperfjord*, unde ingrediens per convallem *Riperfjorddal*, sc. adhuc occurrens ad arenosa supra prædium supreme habitantis c. 2 miliar. a mari remotum; in *Porsangria* inter *Stabursnæs* & *Valdak*, ad introitum sinuli *Kulvig*, ad *Repvaag*; in *Finmarkia orientali* ad *Kjöllefjord*.

116. GENTIANA SERRATA, *Gunn.*

Hab. quoque in *Kvænangen* inter *Lilleströmmen* & *Navet*; in parochia *Hammerfest* ad littus occidentale sinus *Riperfjord*; in *Porsangria* ad ostium fluminis *Börseelv*.

POLEMONIACEÆ.

117. POLEMONIUM CÆRULEUM, *L.*

Hab. quoque in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lidlandskaret*; in *Vesteraalia* ad insulam *Hadselö* passim; in *Kvæfjord* ad tractum prædiorum *Vig* & *Vogteren*; in *Throndenæs* ad colles prope *Skaanland*; in *Salangen* ad jugum prope *Nedrevand*; in *Sör-Reisen* ad *Bærkollen* copiose, *Viola tricoloris*, *Vicia Cracca* & cet. socium, altitudine 7—800 ped. supra mare; ad *Havneholmen* prædii pastoris *Tranöensis* copiose; in insula *Senjen* prope *Gibbostad*; in alpem *Flöifjeld* prope *Tromsö* ad vel paullo supra terminum Betulæ adscendens; in *Skjervö* ad insulam *Hukö*; in parochia *Hammerfest* ad littus occidentale sinus *Riperfjord*, ibi latit. bor. 70° 26—30 attingens; in *Porsangria* inter ostium fluminis *Börseelv* & *Hestenæsset* (forsitan non omnino certum, autumnus serotino mancum lectum).

* POLEMONIUM CÆRULEUM * CAMPANULATUM, *Th. Fr.*

Hab. in betuletis præcipue inundatis riparum fluminum *Finmarkie continentalis* interioris, ubi centrum dispersionis per hunc agrum manifeste est, sc. juxta fl. *Attenelv* loco c. 1 miliar. infra templum *Masi* posito, ad tractum hujusce templi, ad *Duogasmoske*, his locis frequentissime copiose,

prope *Lappojavre* ex. gr. in insula, ibi in regione betulina superiore, dein ad *Sjuosjavre*, juxta fl. *Karasjok* ad lingvam pagi *Karasjok*, ad *Beskinjarga* & interius usque ad inosculationem rivi *Bavtejok*.

117b. POLEMONIUM PULCHELLUM, *Bunge*.

Hab. nov. civ. Flor. Scandinaviæ optime evoluta ad loca graminosa littoralia solo calcareo gaudentia ad *Bugönæs Varangriæ meridionalis*, ubi copiose occurrens latit. bor. 69° 57—58 attingit. Inter tres formas *Polemonii*, quibus Flora arctica Norvegiæ ornata est, *P. cæruleum* ut forma aprica littorali-occidentalis, *P. campanulatum* ut umbrosa continentali-suborientalis, *P. pulchellum* ut aprica eximie orientalis considerandum est, cum ad dispersionem per tractum hunc solum nec alibi respiciamus.

117c. DIAPENSIA LAPPONICA, *L.*

Hab. quoque ex. gr. in *Bejeren* ad *Arstadaasen*, ibi ad terminum Betulæ jam apparens, ad jugum supra *Heminglyt*; in *Ofoten* ad *Laxetind*; in *Sör-Reisen* ad *Middagsfjeld* supra terminum Salicum majorum, ad alpes prope *Östgaard* convallis *Gumpendal*; in *Maalselven* ad *Falkebjæret* convallis *Tagelvdal*, ad *Mauken* ad terminum Betulæ jam apparens, ad *Kalvehovedet* c. 1300 ped. supra ripas fluminis, ad *Langfjeldene* juxta *Beinelv*, ad alpes supra *Sörlid* convallis *Dividal*, ad jugum inter *Tagvand* & *Sagvand* infra terminum Pini apparens & cet., per Finmarkiam proprie dictam littoralem & sublittoralem frequens; in *Varangria meridionali* ad juga prope *Elvenæs*, nec non latere *Rossico* ad alpem *Galgoaive*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Karasjok* ad cacumen alpis *Dafteroavve* parcior & maerior.

BORAGINEÆ.

118. MYOSOTIS ARVENSIS, *Hoffmd.*

Hab. quoque ad agros in *Bejeren* ad *Arstad*, ad *Solö* copiose, inde per convallem usque ad *Troelid*; ad *Bodö*; in *Throndenæs* ad prædia *Skaanland* copiose; ad prædium pastoris *Tranöensis*; nec non in *Allen* ad *Mandsverk* convallis *Tverelvdal*, ubi certe adventitia. Ut videtur, species in hoc agro tam quoad corollam quam habitum ad *M. alpe-strem*, per magnam partem territorii frequentem, magis vergit quam in terris australioribus.

119. MYOSOTISCÆSPITOSA, *Schultz.*

„*Myosotis* (?) sp.“ Ind. suppl. Norv. arct. p. 28 hæc est, quam Th. Fries loco indicato florentem reperit, ibi latit. bor. 69° 36—40. Circa *Nordcap* non longius arctoam versus a me observata est quam ad fines *Nordlandiæ* prope *Nærö*.

120. ECHINOSPERMUM DEFLEXUM, *Lehm.*

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Arstadaasen*; in *Ofoten* prope *Evenæs* ad viciniam proximam littoris; in *Salangen* ad clivos prope effluvium lacus *Övre-Vand* copiosius quam alibi provinciæ visum; in *Sör-Reisen* supra *Finsæt*; in *Maalselven* ad radicem alpis *Mauken* supra *Nordmo*; in *Varangria boreali* ad radicem jugi *Flintenæs* prope *Jakobselv*, ibi latit. bor. attingens 70° 8—9, sic longius arctoam versus quam id e *Finmarkia* occidentali prius indicavi.

120b. LITHOSPERMUM OFFICINALE, *L.*

Hab. nov. & inopinata civis Flor. arct. in *Bejeren* ad clivos supra *Solö* & *Muldjord* & ad *Arstadaasen*, ubi copiosius. Planta omnino spontanea, optime evoluta, robusta, florens & fructifera ibi latit. bor. attingit c. 66° 59.

121. STENHAMMARIA MARITIMA, *Reich.*

Hab. quoque in *Ofoten* ad *Evenæs*, ad *Ungsmälö*; in *Throndenæs* ad prædia *Skaanland*; in *Sör-Reisen* ad ripas lacus subsalsi *Reisenvand*, ubi sociæ ejus *Haloscias scotica*, *Juncus botnicus* & cæt.; in insula *Senjen* ad *Gjøvig*, ad *Kvanaas*; in insula prædii pastoris *Trandøensis*; prope *Tromsødal*; ad *Lille-Lerpollen* sinus *Tanaafjord* & cæt.

122. ASPERUGO PROCUMBENS, *L.*

Hab. quoque in *Ofoten* ad tractum prædii *Lidlandskaret*.

LABIATÆ.

124. SCUTELLARIA GALERICULATA, *L.*

Hab. quoque in *Ofoten* inter *Lerosen* & *Lidland*, prope *Sommervig* ad littora ipsa maris; nec non in *Maalselven* ad prædia *Rosvold*.

125. GALEOPSIS TETRAHIT, *L.*

Hab. quoque ex. gr. in *Bejeren* ad *Solö*; in *Ofoten* inter *Lerosen* & *Lidland* passim etiam in pratis, in alpem *Laxetind* 4—500 ped. supra mare adscendens; in *Kvæffjord* frequenter; in *Throndenæs* ad prædium pastoris quoque in

littore maris; in *Salangen* ad clivos prope effluvium lacus *Övre-Vand* extra culta; in *Sör-Reisen* supra *Finsæt* extra culta, etiam ad lapidosa fere inaccessibilia prope *Dybvaag*; in insula *Senjen* interiore prope *Troldbuvand*, ad *Elvebakken*; in *Maalselven*, ubi frequentissima in agris, supra *Nordmoen* ad radicem alpium *Mauken* a cultis remotius; in *Skjervö* ad *Rotsundelv*, per convallem *Reisendal* ad *Vinnelys*, ad *Sappen*, dein ad *Sokkelvig* in littore maris, item in insula *Hukö* (latit. bor. 70° 1); in parochia *Hammerfest* ad domicilia supreme habitantis convallis *Riperfjorddal*; in *Varangria boreali* ad ripas maxime lapidosas fluminis *Jakobselv* ab omni cultura remotas & fere inaccessibiles sub præruptis rupium sitas. Ubi agri adsunt, fere ubique, ut videtur, reperienda est.

126. GALEOPSIS VERSICOLOR, Curt.

Hab., per Nordlandiam meridionalem præcedente passim copiosior sed septentrionem versus rarens nec ullibi provinciae extra culta visa, quoque in *Bejeren* ad *Solö*, inde per totam convallem procedens; ad *Bodö*; in *Ofoten* ad *Lidland* & *Lidlandskaret*; in *Kvæfjord* ad tractum prædiorum *Vig* & *Vogteren*; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*; in insula *Senjen* ad *Solberg*, ad *Laxelv* copiose, ad *Grönlid*, ad *Kvan-aas*, ad *Elvebakken*; in *Lenvig* juxta *Roksfjord*, ad *Finfjordeidet*; in *Maalselven* per convallem passim (anno quidem 1865), ad *Nordmoen* copiosius; in *Alten* (anno 1864) ad *Mandsverk* convallis *Tverelvdal* visa, iöi certe adventitia cum seminibus exteris seminata.

127. PRUNELLA VULGARIS, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Arstad* & *Solö* inde per convallem usque ad *Troelid* ingrediens, adhuc ad radices jugi prope *Heminghyt* copiose; ad *Rostnæsodden* sinus *Bejerenfjord*; in *Gildeskaal* ad *Indyr*; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen* frequenter, unde in radicem alpium *Laxetind* 4—500 ped. supra mare adscendens, & per convallem intra *Lerosen* a cultis remotius ingrediens & in clivos septentrioni expositos 900—1000 ped. supra mare adscendens; in *Kvæfjord* ad tractum prædiorum *Vig* & *Vogteren*, ad *Kvæfjordeidet* prope *Rödmuldheien* & alibi ad clivos graminosos frequenter; in *Thronenæs* ad totum tractum inter *Seljestad* & prædium *pastoris*, ad prædia *Skäänland* copiose; nec non in *Salangen* ad *Sjöveien*.

127b. STACHYS SYLVATICA, L.

Hab., antehac e *Sörfolden* a *Wahlenberg* indicata, quoque in *Bejeren* socia *Aconiti* frequenter nec parce sc. supra *Solö & Muldjord*, ad radicem alpium *Seglfjeld*, ad *Arstadaasen*, ad radicem jugi prope *Heminghyt*, ad *Troelid*; in *Gildeskaal* per tractum inter *Skovvold & prædium pastoris* passim; in *Ofoten* inter *Lerosen & Lidlandskaret* in alnetis pygmæis clivorum siccorum frequentius, intra *Evenæs* passim copiose sub præruptis rupium, ibi *Rubi idæi*, *Gei rivalis*, *Spirææ Ulmaræ* socia; in *Throndenæs* inter *Lille-Skaanland & Lysvand*; in *Salangen* prope effluvium lacus *Övre-Vand* (c. 68° 50'), nec non in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen* in montem *Bærkollen* c. 600 ped. supra mare adscendens, ibi latit. bor. attingens 69° 9—10.

127c. AJUGA PYRAMIDALIS, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Troelid*; in *Ofoten*, unde jam a *Sommerfelt* allata, ad *Lidland & Lidlandskaret*, ad tractum prædii *Evenæs*, a *Zetterstedt* memorata frequentior; in *Vesteraalia* ad *Hadselö* passim nec parce; in *Kvæffjord* ad tractum prædiorum *Vig & Vogteren*, ad *Kvæffjordeidet* loco elevatiore prope *Rödmuldheien*; in *Throndenæs* ad tractum prædii *Harstad* passim, ad colles inter prædia *Skaanland* copiose; in insula *Senjen* prope *Lysbottenvand* loco c. 200 ped. supra lacum elevato, ibi latit. bor. attingens 69° 22—23.

+ MENTHA ARVENSIS, L.

Planta, quam in confiniis Nordlandiæ ad *Nærö* spontaneam legi & quam *Sommerfelt* adventitiam in hortis *Saltedalæ* observavit, in agro arctico forsitan investiganda est.

PERSONATÆ.

127d. LINARIA VULGARIS, Mill.

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ Norv. in *Nordlandia* ad *Grötö*, unde optimus *Haukland* specimina luculenta misit. Ibi latit. bor. attingit 67° 42—46.

128. LIMOSELLA AQUATICA, L.

Hab., antehac e *Nordlandia* non indicata, ad littora maris extra *Solö* convallis *Bejeren*.

129. VERONICA OFFICINALIS, L.

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Solö & Muldjord*, ad radicem jugi prope *Heminghyt*, ad *Troelid*; in *Gildeskaal* supra *Indyr*; in *Ofoten* ad *Lidland*, in alpem *Laxetind* 5—

600 ped. supra mare adscendens & ad latus convallis adjacentis septentrioni expositum 8—900 ped. supra mare; in *Vesteraalia* ad insulam *Hadselö*, ibi prope *Melbo* c. 700 ped. & ad *Husebykollen* 900—950 ped. supra mare adscendens; in *Kvæffjord* supra *Vig* & *Vogteren* & ad radicem montium isthmi *Kvæffjordeidet*; in insula *Rollen* prope *Ibbestad*; in *Sör-Reisen* prope *Tömmervigvand*; in insula *Senjen* ad partem interiorem convallis *Laxelv*, prope *Gibbostad* copiose, juxta *Hegvand* & *Lysbottenvand*; in *Maalselven* ad *Moen*, ad radicem alpium *Mauken* supra *Nordmoen*, supra *Nergaard*, supra *Ulleberg* convallis lateralis *Dividal*, ad *Kirkemo* convallis *Bardu*, nec non ad ostium littorale convallis principalis in radice alpium *Vasbrönden*; in *Balsfjord* ad *Myre* prope *Sagvand*; in *Skjervö* ad clivos supra *Rotsundelv*, in insula *Hukö* (70° 1); nec non in *Alten* in clivos supra littus boreale sinus *Rafsboten* altius quam 500 ped. supra mare adscendens.

130. VERONICA LONGIFOLIA, L. *Herbarium Borlæum* 130. Hab. quoque in *Porsangria* inter *Valdak* & *Stabursnæs*, ad ripam borealem fluminis *Staburselv*; in *Tanaffjord* ad *Store-Lerpollen*; in *Varangria boreali* supra *Nyborg* in jugum c. ½ milliar. a littore maris ingrediens, ibi c. 600 ped. adscendens; in *Varangria meridionali* juxta fl. *Pasvig-elv* usque ad tractum prædii *Svanvig* prope *Klostervand* ingrediens, sed intra hoc nullibi visa; præterea in *Finmarkia* continentali interiore frequenter copiose ad ripas fluminum, sc. juxta *Altenelv* ad *Spjerkojokka*, ad locum c. 1 milliar. extra templum *Masi*, ad tractum hujusce, ad *Duogasjmoske*, in jugo ipso prope lacum *Lappjavre*, ad *Sjuosjavre*, juxta fl. *Karasjok* ad *Mannevarrenjarga* & cæt., juxta partem interiorem fluminis *Tanaelv* ad *Holmen*, ad *Bavda*, juxta partem interiorem fluminis *Anarjok* latere *Fennico* ad *Jaskisjavre*.

130 b. VERONICA CHAMÆDRYS, L. *Herbarium Borlæum* 130 b. Hab. quoque in *Gildeskaal* ad *Indyr*, ad prædium *pastoris*; in *Vesteraalia* ad *Hadselö* supra prædium *Melbo* paullo adscendens, quæ loca sola sunt, ubi a me hactenus visa est.

131. VERONICA SCUTELLATA, L. *Herbarium Borlæum* 131. Hab. quoque in *Maalselven*, unde a *Lund* jam indicata, in parte interiore convallis ad *Nordmorn*, dein paullo intra *Overgaard*; in *Finmarkia* continentali interiore juxta fl.

Karasjok ad *Vollusnjarga* copiosius, ad *Oadsessajenjarga*, nec non juxta partem interiorem fluminis *Tanaelv* latere *Fennico* ad *Virgevayge*. In *Maalselven* forma quum *glabra* (*Nordmoen*), tum *villosa* adest, in *Finmarkia orientali villosa* sola hactenus observata.

131b. VERONICA SERPYLLIFOLIA, L.

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Solö* & *Muldfjord*, supra *Heminghyt*; in *Ofoten* in clivos convallis supra *Lerosen* 8—900 ped. supra mare adscendens; in isthmo *Kvæfjordeidet*; in *Salangen* prope lacum *Övre-Vand*, per convallem *Salangdal* usque ad prædium *Kollen* ingrediens; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*, ibi in montem *Bærkollen* 8—900 ped. supra mare adscendens; in insula *Senjen* ad *Bakkehaug* & ad radicem montis *Renlidkollen* ingrediens, ad tractum prædii *Klöven*, prope *Gibbstad*; in insula prædii pastoris *Tranö*; in *Lenvig* in partem elevatiorem isthmi inter *Finsjordvand* & *Maalselven* positi adscendens; in *Maalselven* ex. gr. ad *Lerbekmo*, ad *Fleske noen*; in insula *Tromsö* frequenter; in insula *Hukö* passim (70°—70° 1); nec non ad tractum pagi *Talvig*.

132. MELAMPYRUM PRATENSE, L.

Hab. quoque ex. gr. in *Bejeren* ad *Solö*; in *Ofoten* supra *Lerosen*, ad *Evenæs*; in isthmo *Kvæfjordeidet*; in *Sör-Reisen* prope *Tömmervigvand*; in *Salangen* ad *Lund*; in insula *Senjen* ad *Kvanaas*, ad *Gibbstad*; in insula prædii pastoris *Tranö*; in *Lenvig* inter *Renelvmø* & *Renvand*; in *Maalselven* ad *Nordmoen*, juxta *Beinelv*, ad *Stormoen* & cæt. frequenter; in insula *Tromsö* & continente adjacente frequenter; in *Skjervö* per convallem *Reisendal* ad *Vinnelys*, ad *Seima*, in insula *Hukö*; in *Alten* frequenter, per totam convallem *Tverelvdal* copiosum, ibi in alpem *Nalganas* ad terminum *Betulæ* adscendens, dein ad *Gammasvarre* prope terminum *Betulæ* procedens; in parochia *Hammerfest* ad *Riperfjorddal*; in *Porsangria* ad *Börselv*; in *Tanafford* ad *Store-Lerpollen*; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*; in *Varangria meridionali* juxta *Pasvigelv* ad *Elvenæs*, ad *Borisgleb*, unde copiose procedens ad effluvium lacus *Klostervand*, ad cataractam inter *Klostervand* & *Goalsejavre*, inter *Goalsejavre* & *Bossojavre*, prope *Gadde-luobal*, nec non latere *Rossico* ad *Store-Menikasö*, in alpem *Galgoaive* supra terminum *Betulæ* adscendens, dein juxta

partem inferiorem fluminis *Neidenelv* frequens; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Altenelv* ad *Spjerkojokka*, ad locum c. 1 milliar. extra templum *Masi* & ad tractum templi frequenter, in jugo interiore ipso ad betuletum prope *Gætkasduodar*, ad *Sjuosjavre*, juxta fl. *Karasjok* ex. gr. ad *Assebakte* copiose, juxta partem inferiorem fluminis *Tanaelv* ad *Storfossen*.

133. MELAMPYRUM SYLVATICUM, L.

Hab. quoque ex. gr. in *Bejeren* ad *Solö*; in *Ofoten* ad *Lidland*; in isthmo *Kvæfjordeidet*; in *Salangdal* ad *Lund*; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*; in insula *Senjen* ad *Tranöbotten*, ad *Kvanaas*, ad *Gibbstad*; in *Lenvig* inter *Renvand* & *Renelvo*; per *Maalselven* frequenter, in alpem *Mauken* supra terminum *Betulæ* paullo adscendens, ad *Skjeggenæs* copiose, in alpem *Langfjeldene* prope *Beinelv* ad terminum *Betulæ* adscendens; in insula *Tromsö* & continente adjacente; in *Skjervö* per convallem *Reisendal* ad *Vinnelys* &c.; in convallibus *Altensibus* frequenter; in *Tanafjord* ad *Lille-Lerpollen*; in *Varangria meridionali* ad *Elvenæs*, unde ad effluvium lacus *Klostervand* procedens; præterea prope limitem *Finmarkiæ continentalis* interioris ad *Spjerkojokka*. Species *Melampyri* tantummodo annotavi, ubi eas florentes & sine ulla hæsitazione distingvendas offendi; loca secundum specimina fructifera referre nolui, ne omnino certa cum minus certis miscerem.

135. PEDICULARIS SCEPTRUM, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Arstadaasen* supra terminum *Betulæ*, ad convallem lateralem *Arstaddal*, ad partem inferiorem convallis principalis in ripis fluminis inter *Heminghyt* & *Troelid* (infra terminum culturæ *Hordei*); in insula *Senjen* ad ripas fluminis *Laxelv* infra *Jonsgaard*, intra *Grönlid* (utroque loco infra terminum culturæ *Hordei*); in *Lenvig* ad *Finfjordeidet*; in *Maalselven*, unde prius non indicata, prope *Skjeggenæs* (infra terminum culturæ *Hordei*); in parochia *Hammerfest* ad *Riperfjorddal*; in jugo vasto inter hanc convallem & *Russemark Porsangriæ* paullo supra terminum *Betulæ*, præcipue frequenter locum ultimum propius; in *Porsangria* ad ripam borealem fluminis *Staburselv*, ad *Börselv* prope *Hestenæset* & in parte exteriori convallis; in *Tanafjord* ad *Store-Lerpollen*; in *Varangria meridionali* prope *Övre-Klostervand* ad paludes vastas ex adverso insulæ *Menikasö*, ad catarac-

tam inter *Klostervand & Goalsejavre*, inter *Vagetimjavre & Bagjajavre*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Altneelv* ad *Duogasjmoske*, ad jugum ipsum inter *Lappojavre & Gætkaşjduodar*, inter hunc locum & *Sjuosjavre*, prope hunc lacum, nec non juxta partem interiorem fluminis *Tanaelv* ad *Holmen*.

136. PEDICULARIS PALUSTRIS, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Grönvatne* convallis interioris elevatius supra mare nec alibi hujusce tractus visa; in *Gildeskaal* ad *Indyr*; in *Ofoten* inter *Lidland & Lerosen*, unde per convallem intra hoc ad altitudinem c. 100 ped. supra mare (quoque flore albo), intra *Evenæs* circum lacum *Kirkevand* (quoque flore albo); in *Vesteraalia* ad insulam *Iladselö* prope *Melbo*; in *Sör-Reisen* prope *Reisenvand*, ad *Nordströmmen*; ad prædium pastoris *Tranöensis*; in insula *Senjen* inter prædia *Kvanaas*, unde per *Græsmyrskoven* intra *Kvanlidmo* ad altitudinem c. 300 ped. supra mare ingrediens, ad tractum prædii *Gibbostad* frequenter copiose (quoque flore albo); in *Lenvig* prope *Finsjordvand* copiose; in *Maalselven*, unde prius non indicata, prope lacum interiorem *Tagvand*, circumcirca a jugo montano inclusum, nec alibi hujusce tractus hactenus visa; dein in *Varangria meridionali* juxta *Pasvigelv* ad sinulum lacus *Klostervand* intra prædium *Brandhoug* situm, ad cataractam inter *Klostervand & Goalsejavre*, inter *Goalsejavre & Bossojavre*, ad *Gaddeluobal*, inter *Vagetimjavre & Bagjajavre*, ad flumen ipsum intra *Bagjajavre*, nec non latere *Rossico* ad *Store-Menikasö*, infra radicem alp̄is *Galgoaive*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore maxime inopinata prope lacum supra mare altius elevatum *Sjuosjavre*, dein quoque juxta fl. *Karashjok* ad *Vajemokkenjarga*, locum illo multo humiliorem, tamen altitudine plus 400 ped. supra mare.

137. PEDICULARIS HIRSUTA, L.

Hab. quoque in *Sör-Reisen* ad cacumen alp̄is *Middagsfjeld* supra terminum *Salicum* majorum; in *Maalselven* ad alp̄es *Istinderne*, ad *Mauken*, ad *Langfjeldene* prope *Bein-
elv*, omnibus locis supra terminum *Betulæ* nascens.

137b. PEDICULARIS FLAMMEA, L.

Hab. planta rarior Norvegiæ in *Maalselven* juxta *Bein-
elv* ad latera alp̄ium *Langfjeldene*, ibi c. 400 ped. supra terminum *Betulæ* apparens & c. 900 ped. supra eundem desi-

stens. Hoc loco latit. bor. attingit 68° 53—56. Sic Flora Maalselvensis, antea unica specie *Pedicularis* notata, nunc quinque numerta.

137c. SCROPHULARIA NODOSA, L.

Hab., antehac ad unicum locum *Nordlandiæ Sörfoldensis* a *Wahlenberg* lecta, quoque in *Ofoten* ad radicem rupium calcarearum intra *Evenæs* positarum, ibi optime evoluta & copiosa, a *Stachyde sylvatica*, *Spiræa Ulmaria*, *Ribesi rubro*, *Tritico canino* comitata (latit. bor. c. 68° 28—29); præterea in isthmo *Kvæfjordeidet* tractus littoralis exterioris ad locum supra mare elevatiorem a *Rödmuldheien* non remotum (68° 45—47); nec non in *Salangen* ad clivos prope effluvium lacus *Övre-Vand*, ibi quoque *Stachydis sylvaticæ* socia, latit. bor. attingens c. 68° 50.

LENTIBULARIÆ

138b. UTRICULARIA MINOR, L.

Hab. quoque in *Ofoten* in lacunis paludosis prope *Kirkevand*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore in lacu supra mare elevatiore *Lappojavre*. Utroque loco tantummodo sterilis lecta est.

139b. PINGVICULA VILLOSA, L.

Hab. quoque in *Maalselven*, unde prius non notata, ad radicem alpium *Ruten* prope terminum Pini, dein juxta ripam australem fluminis adjacentis *Beinelv* longius infra terminum Pini; in *Alten*, unde prius indicata, ex. gr. ad alpem *Pescades* supra terminum Betulæ; nec non in *Varangria meridionali* prope *Klostervand* ad paludes vastas ex adverso insulæ *Menikasö* passim, ad cataractam inter *Klostervand* & *Goalsejavre*.

PRIMULACEÆ.

140. GLAUX MARITIMA, L.

Hab. quoque in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*; in *Kvæfjord* intra prædia *Vig* & *Vogteren*; in *Throne-næs* ad prædium pastoris; in insulis prædii pastoris *Tran-öensis*; in insulâ *Senjen* ad *Stagenæs*, ad *Kvanaus*, ad tractum prædii *Gibbostad*; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*; nec non in *Balsfjord* ad *Storstennes*.

141. NAUMBURGIA THYRSIFLORA, Reich.

Hab. in *Sör-Reisen* ad isthmum inter *Dybrvaag* & *Tömmerviivand* copiose, ibi latit. bor. 69° 11—12 attingens.

142. PRIMULA STRICTA, *Hornm.*

* *Obesior*, a forma primaria differens robustiore statura, scapo crassiore, bracteis pedunculos florigeros breviores æquantibus, præcipue tamen inflorescentia 5—10-flora, dein quoque virescentia saturatiore, foliis longius pedicellatis, juvenilibus erectioribus. Accedit ad *P. scolicam*, a qua distinguitur foliis adultis demum omnino nudis, laciniis corollæ apicem versus minus dilatatis.

Hab. ut forma *obesior* in *Maalselven*, unde species antehac non notata, juxta fl. *Divielv* ad *Divimo*, ad *Svestad*, ad *Sörtid*, nec non in *Alten* ad *Bossekop*, ut prius indicavi; porro forma *primaria* in *Porsangria* ad *Russemark*, ad introitum sinuli *Kulvig*, ibi latit. bor. attingens 70° 28—29; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad ripas fluminis *Karasjok* paullo intra ostium affluentis *Jesjok*, inde ad ostium rivi *Bavtejok* procedens.

143. PRIMULA SCOTICA, *Hook.*

Hab. quoque in *Bejeren* ad littora paullo extra *Solö*; in *Gildeskaal* ad *Dal*; in *Ofoten* ad *Unysmalö*; in *Throndenæs* ad prædium *pastoris* & ad tractum prædii *Seljestad*; in *Salangdal* ad alpes prope *Lund*, supra terminum *Betulæ* copiose nascens, qua in regione non alibi provinciæ visa, nec ibi ad fundum convallis observata. *Wahlenbergii* „*P. farinosa* β . *stricta*“ habitans „per totam Nordlandiam“ verisimiliter pro majore parte hæc est, quæ præcedente multo frequentior per hanc terram videtur.

PLUMBAGINEÆ.

145. ARMERIA MARITIMA, *Wild.*

Hab., antehac tantummodo e duobus locis agri indicata, quoque in *Vesteraalia* ad insulam *Hadselö* v. rectius ad insulam minimam prædio *Melbo* illius adjacentem.

146. ARMERIA SIBIRICA, *Turez.*

Hab. quoque in *Porsangria* ad cacumen alpium *Silfarre* convallis *Börselv*, unde eam ad jugum ex adverso illi prope alteram ripam fluminis positum prius indicavi.

PLANTAGINEÆ.

147. PLANTAGO MAJOR, *L.*

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Solö* & *Muldjord*, inde per convallē ingrediens ad *Hemingshyt* & *Troelid*, ubi etiam

ad loca elevatiora; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*; in *Vesteraalia* ad insulam *Hadselö*; in *Kvæfjord* ad tractum prædiorum *Vig* & *Vogteren*; in *Throndenæs* ad *Lille-Skaanland*, unde juxta viam ingrediens ad *Nipen*; in *Salangen* usque ad *Præstebakken* c. 1 milliar. a litore ingrediens; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*, ibi in montem *Bærkollen* c. 600 ped. supra mare adscendens, ad *Bakkejord*, ad *Finsæt*, unde per convallem ingrediens ad *Sörfosbogen*; in insula *Senjen* ad *Gibbstad* jam a *Zetterstedt* notata; in *Lenvig* ad *Finfjordvand*; in parte interiore convallis *Maalselven* ad *Mosseltmo* prope *Sagbekken*, ad prædia *Sverresvold* & præcipue ad *Kongslid* copiose, dein viam inter utrumque sequens, quoad copiam sensim deficiens remotius a prædiis & ad partem mediam viæ omnino evanescens, quem tractum in nostro seculo primum colonisatum esse admonendum est; nec non in insulis *Skjervö* & *Hukö*, quo ultimo loco sat copiose & ad latera jugi calles pecudis elevatius sequens, ibi latit. bor. 70° ægre transgrediens.

CHENOPODEÆ.

150. SALICORNIA HERBACEA, L.

Hab. in *Throndenæs* ad tractum prædii *Harstadvavn*, unde prius a me indicata, pluribus locis nec parce ex. gr. ad *Seljestad*; nec non in insula minima *Havneholmen* prædio pastoris *Tranöensis* adjacente parce visa, ibi latit. bor. attingens c. 69° 10.

150b. CHENOPODIUM ALBUM, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Heminglyt*; in *Ofoten* ad *Lidland*; in *Kvæfjord* ad prædia *Vig* & *Vogteren*; in *Maalselven* ad *Skjeggænes*; in insula *Tromsö* passim adventitium, nunc apparet, nunc evanescens, nec non in insula *Skjervö* (anno 1865 quidem).

150c. ATRIPLEX LITTORALIS, L.

Hab. nov. civ. Flor. arct. Scand. in confiniis *Nordlandiæ* ad *Nærö*, ubi fructificans lecta, nec non in *Throndenæs* ad prædium pastoris, ubi tamen specimina juvenilia reportata determinationem forsitan minus certam reddunt. Ultimo loco latit. bor. attingit 68° 49'—50.

150d. ATRIPLEX HASTATA, L. formæ!

Hab. quoque in *Ofoten* ad *Evenæs*, ad *Unysmalö*; in *Kvæfjord* ad insulam *Kvæö*; in *Throndenæs* ad prædium

pustoris; in *Sör-Reisen* ad *Gottesjord*, ad *Tömmervig*, in insula *Senjen* ad *Gibbostad*; in *Alten* prope *Bossekop*; ad *Komagfjord*; nec non ad *Kjöllefjord* Finmarkiæ orientalis.

150e. ATRIPLEX PATULA, L. *Varietas*.

Hab. quoque in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*, ad *Ungsmalsö*, ad *Evenæs*; in *Sör-Reisen* ad *Gottesjord*; in insula *Senjen* ad *Gibbostad*; in insula *Tromsö* & continente adjacente; in *Kvænangen* ad *Navet*; in insula *Hukö*; ad tractum prædii *Talvig*; in insula *Seiland* ad *Komagnæs*; in parochia *Hammerfest* ad *Riperfjord*; in *Porsangria* ad *Russemark*, ad *Veinæs*, ad *Hestenæsset* prope ostium fluminis *Børselv*; in *Laxefjord* ad *Lebesby*; nec non in *Varangria meridionali* ad littora interiora quidem sinus *Kjöfjord*.

† SCHOBERIA MARITIMA, Mey.

Planta, quam in confiniis *Nordlandiæ* ad *Nærö* legi, in agro arctico quoque quærenda est.

ELÆAGNEÆ.

150f. HIPPOPHAE RHAMNOIDES, L.

Hab., antehac in *Saltdalen* lecta, quoque in *Stegen* ad radicem alpium *Præstkontinden* secundum specimen ab *Haukland* missum, ibi latit. bor. attingens c. 67° 56.

THYMELEÆ.

150g. DAPHNE MEZEREUM, L.

Hab., antehac e *Saltdalen* indicata, quoque in *Bejren* ad latera jugi supra *Solö* & *Muldjord*, ad radicem alpium *Seglfjeld*, ad *Arstadaasen*, ad latera jugi prope *Heminghyt* parcius; nec non in *Gildeskaal* supra *Indyr*, ad radices jugi & colles prope prædium *pastoris* copiose, ibi latit. bor. attingens 67° 3—4.

MYRICEÆ.

150h. MYRICA GALE, L.

Hab., antehac in *Saltdalen* parcius a *Sommerfelt* visa, quoque in *Gildeskaal* ad tractum prædii *pastoris* uno loco copiosius; in *Stegen* & in *Lödingen* secundum specimina ab *Haukland* missa; nec non in insula *Rollen* prope *Ibbestad*, unde plures specimina miserunt, ibi latit. bor. attingens c. 68° 47.

URTICEÆ.

151. URTICA DIOICA, L.

Hab quoque ex. gr. in *Bejeren* ad *Solö*, ad *Heminghyt* quum ad ædes tum in betuletis laterum jugi; in *Ofoten* ad *Lidland*, intra *Evenæs* in filicetis ut f. *silvestris* in *Vester-aalia* ad *Hadselö*; in *Salangen* ad *Sjöveien*, supra *Lund* (ut f. *silvestris*); in insula prædii pastoris *Tranö*; in *Sör-Reisen* in montem *Bærkollen* 7—800 ped. supra mare adscendens, ad angustias rivulorum supra *Finsæt* ut f. *silvestris* luxurians fere altitudine hominis; in insula *Senjen* ad *Kvanaas*, ad *Gibbstad*; in *Maalselven* ad radicem alpium *Mauken* a cultis remotius, ad radices alpium *Istinderne* supra *Brandmo* altius quam 500 ped. supra ripas fluminis adscendens, per convallem lateralem *Bardu* ad radicem alpium *Blaaljerg* ut f. *silvestris*, nec non ad prædium pæne intimum *Strömsmo*; in *Skjervö* ad lapidosa clivorum supra *Rotsundelv*, prope *Vinnelys* convallis *Reisendal* ut f. *silvestris*, in insulis *Skjervö* & *Hukö* ad ædes; in parochia *Hammerfest* ad *Riperfjorddal*; in *Porsangria* ad *Börselv*, ad *Repvaag*; ad *Kjöllefjord*; in *Varangriu boreali* ad *Jakobselv*; in *Varangria meridionali* quoque prope *Klostervand* ad ædes prædii *Risto*, nec non latere *Rossico* ad pagum Lapponum permigrantium prope *Bajjajavre*, lacum proximum infra *Enare*.

ULMACEÆ.

151 b. ULMUS MONTANA, Sm.

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in *Bejeren* ad radicem jugi *Arstadoasen*, paullo elevate supra mare nascens, ibi latit. bor. attingens c. 66° 59. Non omnino parce occurrit. Adsunt specimina juvenilia & adulta ut arbores sat humiles, trunco ad ambitum altitudine pectorali 60 centim. menso, omnes faciei sanæ & robustæ, foliis luculentis, optime evolutis, saturatius viridibus quam in ulla alia arbore Floræ arcticæ nostræ. Die 15to Augusti æstatis miseræ anni 1867 fructus maturos p. p. jam delapsos obtulere.

CUPULIFERÆ.

151 c. CORYLUS AVELLANA, L.

Hab. in *Stegen* ad radicem alpium *Præstkontinden*, unde *Haukland* specimina ramis & foliis bene evolutis misit, referens in litt., frutices non paucos ibi occurrere sed terræ pro-

cumbentes nec nisi a saxis suffultos altitudinem bi-quadripedalem acquirere. Ex eodem loco, ubi latit. bor. c. 67° 56 attingit, jam a *Gunnero* in Flor. Norv. verbis „uno frutice sterili“ memoratur. Cum planta hæc post seculum totum elapsum loco suo perdurat, nec minus prospera, potius, ut videtur, ulterius propagata, etsi non fructificans, ei jus civitatis Floræ arcticæ vix majore jure denegari potest (ut vult *Wahlenberg*), quam multis vegetabilibus aliis, cryptogamis & phanerogamis, tantum sterilibus & evolutionis miseræ lectis, quæ tamen in omnibus Floris recipiuntur.

SALICINEÆ.

152. SALIX PENTANDRA, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Solövand* (arborea); in *Oftoen* ad *Lidland*, ad tractum prædii *Evenæs* copiose; in isthmo *Kvæfjordeidet*; in *Throndenæs* ad *Lille-Skaanland* copiose (fruticosa); in *Salangen* prope *Elvevold* copiose ut arbores spectabiles trunco crassiore (ad ambitum altitudine pectorali usque ad 1, 48 met. menso); in *Sör-Reisen* in isthmo inter *Dybvaag* & *Tömmervig* copiose nunc arborea nunc frutescens saliceta mera constituens, prope *Reisenwand*, in montem *Bar-kollen* ut frutex 900—1000 ped. supra mare adscendens; in insula *Senjen* ad *Laxelv* prope *Grönlid*, ad tractum prædii *Gibbostad* (fruticosa); in *Maalselven* ad *Moën* arborea, ad *Kirkenæs* (trunco arboreo procerissimo), ad *Skjeggenæs* (fruticosa); in *Balsjord* ad *Storstennæs* copiose prope littora ipsa maris; in *Porsangria* prope ostium fluminis *Börselv* non a littore remote nec parce (fruticosa), ibi latit. bor. 70° 18—20 attingens; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Karasjok* ut arbor humilis ad latera jugi supra *Nitomokkejoasj*

152b. SALIX MYRTILLOIDES, L.

Hab. species Norvegiæ rarior, ut videtur, quoque in *Maalselven* ad paludem inter prædium *Nordmoen* & radicem alpium *Mauken* positam, parcissime tantum visa; in *Varangria meridionali* ad tractum inter *Elvenæs* & *Jarffjord*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad *Sjuosjavre* prope hospitium publicum copiose eximie evoluta, ibi in regione betulina elevatiore versans, dein ad rivum affluentem in jugo adhuc elevatiore frequenter.

152c. SALIX POLARIS, *Wg.*

Hab. qvoqve in *Ofoten* ad *Laxetind*; ad alpes insulæ *Rollen* secundum specimen ad Pastore *Ellefsen* missum; in *Sör-Reisen* ad *Middagsfjeld*; in *Maalselven*, unde a *Lund* primum indicata, postea, ut videtur, tacite revocata, ad alpes *Langfjeldene* prope *Beinelv*; in *Skjervö* ad cacumen jugi inter *Rotsundelv* & *Sörkjosen*, in insula *Hukö*.

153. POPULUS TREMULA, *L.*

Hab. qvoqve ex. gr. in *Bejeren* ad *Heminghyt*, ad *Solö*; in *Gildeskaal* ad tractum inter prædium pastoris & *Svovold*; in *Ofoten* ad *Lidland*, ad *Evenæs*; in *Vesteraalia* ad *Hadselö*, hoc tractu littorali exteriori etiam ut arbor, immo trunco crassiore ex. gr. ad prædium pastoris; in *Kvæsfjord* ad tractum prædiorum *Vig* & *Vogteren*; in *Throndenæs* ad prædium pastoris, ad tractum prædii *Harstadhavn* populeta constituens, ad prædia *Skaanland*; in *Salangen* juxta *Övre-Vand*; in *Sör-Reisen* ad *Sörfosbogen*; in insula *Senjen* prope *Gibbstad* quasi arborea sed terræ omnino prostrata; in *Maalselven* ad *Nordmoen* ut arbor altior & procerior quam vulgo in hoc agro, adhuc ad *Strömsmo* prædium pæne intimum convallis *Bardu*; in *Skjervö* per convallem *Reisendal* ad *Vinnelys*, ad *Hurrika* & cet., tantummodo fruticosa ad *Sokkelvig* & ad insulam *Sjervö* littoralis exterioris; in insula *Seiland* ad radicem alpium *Hönsebyfjeld* fruticosa pedalis; in *Porsangria* ad latus boreale fluminis *Staburselv* in vicinia littoris adhuc arborea crassitudine brachiali trunci, ad partem interiorem convallis *Börselv* a mari remotam arborea trunco usque ad 1, 2 met. in ambitu (altitudine supra radicem pectorali), sic ibi ut arbor latit. bor. 70° 18—20 attingens; in *Tanaffjord* ad *Lille-Lerpollen* fruticosa pedalis; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv* fruticosa pedalis, dein sub hac forma, referente cl. *Nordvi*, per jugum intra *Klubvig* plus quam 2 milliar. a littore ingrediens; in *Varangria meridionali* juxta fl. *Pasvigelv* ad *Elvenæs*, ad *Klostervand*, inter *Goal-sejavre* & *Bossojavre*, ibi ut arbor sat spectabilis populeta constituens, nec non latere *Rossico* ad tractum alpium *Galgoave*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Attenelv* ad *Spjerkojokka* fruticosa pedalis, juxta fl. *Karasjok* & partem interiorem fluminis *Tanaelv* ut arbor mediocris v. humilior frequenter.

CONIFERÆ.

154. PINUS SYLVESTRIS, L.

Hab. quoque in littorali exteriori ad *Hadselö Vester-aaliæ*, ubi arbor unica adesse refertur; in *Sör-Reisen* ad partem interiorem convallis *Gumpendal* circum lacum specimina nonnulla parvula adhuc restant, & ædes in tractu pro majore parte a trabibus loco natis constructæ sunt; in insula *Senjen* ad partem interiorem convallis *Laxelvdal* nunc omnino devastata, ad ædes contignata, dum sceleta sola ad paludosa restantia a me visa sunt, ad monticulos prope *Gib-bostad* ut arbores humiles deformes trunco conice evoluto, sed juxta *Lysbottenvand* insulæ interioris adhuc silva minor, integrior, trabifera, proh dolor ratione oeconomica mox securi evanitera; in *Salangen* silvas latiores constituens, per convallem *Salangdal* usque ad *Forset* ingrediens, intra hoc prædium omnino evanescens. Inter Pinos, quæ ad convallem *Børselv Porsangriæ* (latit. bor. 70° 18–20) polo forsitan proximæ nascuntur, truncum a vento dejectum cacumine putrefacto destitutum observavi longum ultra 13 met., ad ambitum (altitudine pedali supra radicem) 2, 36 met. mensum.

MONOCOTYLEDONES.

POTAMOGETONEÆ.

155. POTAMOGETON NATANS, L.

Hab. quoque in *Kvæfjord* prope *Strömsbotten*; in *Throndenæs* inter *Skäänland* & *Nipen*; in *Lervig* elevatius ad jugum inter *Langnæs* & littora maris.

157. POTAMOGETON PERFOLIATUS, L.

Hab. quoque in *Throndenæs* in lacu prope *Nipen*; in *Varangria meridionali* in lacu *Goalsejavre*, ubi specimina usque 3,04 met. longitudine mensa; præterea in *Finmarkia continentali* interiore in lacu *Lappojavre* regionis betulinae superioris, sed ibi sterilis solus visus.

158. POTAMOGETON PECTINATUS (?), L.

Hæc species (aut *P. marinus*) occurrit quoque in *Ofo-ten* intra *Evenæs*; nec non in lacu supremo fluminis *Pas-rigelv*, *Bajjavre* nominato (sterilis).

158b. POTAMOGETON MARINUS, L.

Hab. quoque in *Ofoten* intra *Evenæs*; in *Throndenæs* prope *Nipen*; in *Porsangria* ad *Børselv* loco c. $\frac{1}{4}$ milliar. a littore remoto et altero c. 1 milliar. a littore remoto, ibi latit. bor. attingens $70^{\circ} 18-20$.

159. POTAMOGETON RUFESCENS, Schrad.

Hab. quoque, ut secundum specimina juvenilia videtur, in lacu *Sjuosjavre Finmarkiæ continentalis* interioris, nec non in *Lappojavre* (adhuc incertior).

161. POTAMOGETON PUSILLUS, L.

Hab. quoque in *Throndenæs* in lacu prope *Nipen*, sed sterilis, dum in *Allen* & in flumine *Anarjok* eum fructificantem legi.

162. POTAMOGETON GRAMINEUS, L.

Hab. quoque in *Varangria meridionali* in *Bagjajavre*; nec non in *Finmarkia continentali* interiore in flumine *Altenelv* prope *Masi (heterophyllus)*, in flumine *Jesjok*, in lacu *Sjuosjavre*.

162b. POTAMOGETON NITENS, Web.

Hab. nov. civ. Flor. arct. Norvegiæ in *Throndenæs* in lacu intra prædium *Skaanland*, ibi latit. bor. attingens c. $68^{\circ} 35$.

163. ZOSTERA MARINA, L.

Hab. ut varietas *angustifolia* quoque in *Sör-Reisen* prope *Gottesjord*, in lacu subsalso *Reisenvand*; nec non prope ostium fluminis *Laxelv* insulæ *Senjen*.

163b. ZANNICHELLIA PALUSTRIS, L.

Hab. nov. civ. Flor. arct. Norvegiæ anno 1864 in *Varangria meridionali* prope *Elvenæs* quum in ostio fluminis *Pasvigelv*, tum in sinu extrajacente sub duabus formis, altera fructibus omnino lævibus, mox postea quoque ab amico *Th. Fries* lecta & publicata, altera fructibus dorso alatis tuberculose subrenulatis, ibi latit. bor. attingens $69^{\circ} 39-40$.

JUNCAGINEÆ.

164. TRIGLOCHIN PALUSTRE, L.

Hab. quoque ex. gr. in *Bejeren* prope *Solö*, ad *Hemingshyt*; ad *Bodö*; in isthmo *Kvæfjordeidet*; in *Sör-Reisen* ad *Nordstrømmen*; in insula *Senjen* ad *Gibbstad*; in *Skjervö* ad insulam *Hukö*; ad *Komagfjord*, ad *Lille-Lærrisfjord*; in parochia *Hammerfest* ad littus occidentale sinus *Riperfjord*; in *Porsangria* ad tractum lacuum *Laxevandene*, ad *Børs-*

elv passim, ad *Russemark*; in *Tanaffjord* ad *Lille-Lerpollen*; in jugum inter *Seida* & *Nyborg* supra terminum *Betulae* adscendens; in *Varangria meridionali* ad *Elvenæs*, sed interius prope fl. *Pasvigelv* tantummodo latere *Rossico* ad *Menikasö* notata; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Altenelv* ad tractum templi *Masi*, nec non prope lacum *Sjuosjåvre* ad rivum ei juxta hospitium affluentem.

165. TRIGLOCHIN MARITIMUM, L.

Hab., sat frequens ad littora maris, quoque ad ripam interiore[m] lacus subsalsi *Reisenvand* in *Sör-Reisen*; nec non in insula *Senjen* juxta fl. *Laxelv* ad paludem infra *Jonsgaard* c. $\frac{1}{8}$ milliar. a littore maris hodierno remotam.

MELANTHACEÆ.

165b. VERATRUM ALBUM, L. β LOBELIANUM.
Bernh.

Hab. quoque in *Tanen* ad *Lille-Lerpollen* in virgultis *Betulae nanæ* loco altius quam 500 ped. supra mare elevato, ad *Store-Lerpollen* quoque loco elevatiore, ad jugum vastum inter hunc tractum & *Nyborg Varangriæ* positum juxta rivulos altitudine 7—800 ped. supra mare; nec non in *Kjöllefjord* ad ripas stagni c. 650 ped. supra mare elevati, ibi latit. bor. attingens c. 70° 57.

LILIACEÆ.

166. ALLIUM SIBIRICUM, L.

Hab. quoque in insula *Senjen*, unde e *Gibbstad* a *Zetterstedt* indicatum, ad ostium fluminis *Laxelv* (latit. bor. c. 69° 14); in *Skjervö* ad *Rotsundelv*, ibi in radicem jugi elevatius adscendens, ad insulam *Skjervö*; in convallem sinui *Lille-Lærrisfjord* adjacentem c. $\frac{1}{4}$ milliar. a littore ingrediens; in *Allen* quoque ad *Eiby*, prædium c. 1 milliar. ab ostio fluminis remotum; nec non in *Porsangria* ad *Börselv* loco infra *Silfavarre* posito, c. 1 milliar. a mari remoto.

167. ALLIUM OLERACEUM, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Arstadaasen*; in *Gildeskaal* ad *Indyr*; in *Ofoten* intra *Evenæs*; in *Vesteraalia* ad *Melbo* insulæ *Hadselö*; in *Kvæfjord* ad prædia *Vig* & *Vogteren* copiosius & passim in tractu adjacente; in *Throndenæs* per tractum prædii *Harstadhavn*, unde prius a me notatum, frequentius; in *Sör-Reisen* prope *Tömmervigvand* parvissime visum (latit. bor. 69° 11—12).

167b. GAGEA LUTEA, *Ker.*
 Hab. quoque in *Gildeskaal* ad *Indyr* infra basin rupium, ubi per hiemem nix a ventis accumulatur & vere tarde solvitur, æstate persegni 1867 ultimis diebus Junii flores primos aperiens; nec non ad loca elevatiora isthmi *Kvæfjordeidet* a *Rödmuldheien* non remota, nascens in mediis virgultis *Rubi idæi* per declivia graminosa dispersis, sociâ Filicum majorum, *Epilobii montani*, *Chærophylli sylvestris*, *Rumicis acetosæ*, quæ omnes dense intertextæ virgulta *Rubi* explent. A *Corydali fabacea* & *Paride quadrifolia* comitata ante foliationem perfectam herbarum majorum floret, postea ab iis occultatur & tegitur. Æstate segniore 1866 flores primos die 6to Junii aperuit. Hoc loco latit. bor. 68, 48—49 attingit.

SMILACEÆ.

168. PARIS QVADRIFOLIA, *L.*

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Solö* & *Muldjord*, ad *Arstadaasen*, ad latera jugi prope *Heminghyt*; in *Gildeskaal* ad *Dal* & passim per tractum adjacentem; in *Ofoten* ad tractum prædii *Evenæs* passim, in alpem *Laxtind* c. 900 ped. supra mare adscendens; in isthmo *Kvæfjordeidet*; in *Salangen* juxta *Övre- & Nedre-Vand*, per convallem usque ad *Lund* & prædium interius *Moholtet* ingrediens; in insula *Senjen* ad *Rentidkollen* partis interioris; in *Sör-Reisen* ad *Bærkollen*; supra *Finsæt*; in *Maalselven* supra *Moën*, supra *Grönlid*, ad radicem alp̄is *Mauken* supra *Nordmoen*, supra *Nergaard*, in *Kalvehovedet* altius quam 900—1000 ped. supra ripas fluminis adscendens ad prædium interius *Rostamo*, per convallem lateralem *Bardu* ingrediens usque ad prædium pæne intimum *Strömsmo*, ad radicem alp̄is *Blaabjerg* copiosissime, prope *Brandmo* altius quam 500 ped. supra ripas fluminis adscendens; in *Alten* per convallem *Tverelvdal* ingrediens usque ad *Mandsverk*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Altenelv* ad *Spjerkajokka*, ad tractum templi *Masi* prope rivum a lacu montano affluentem.

169. POLYGONATUM VERTICILLATUM, *All.*

Hab. quoque in *Bejeren*, macrius nec tam socialiter copiosum ut in tractibus aliis magis borealibus, supra *Muldjord* & *Solö*, ad *Arstadaasen*, supra *Heminghyt*, ad *Troelid*; in *Gildeskaal* supra *Indyr* & *Dal* passim per tractum; in

Ofoten inter *Lidland* & *Lerosen*, in alpem *Laxetind* c. 1400 ped. supra mare adscendens, in alnetis clivorum inter *Lidland* & *Lidlandskaret* giganteum, c. $\frac{1}{4}$ milliar. intra *Eve-nas* infra radicem rupium socialiter copiosum; in *Kvæfjord* ad tractum prædiorum *Vig* & *Vogteren*, in isthmo *Kvæfjord-eidet*; in *Throndenæs* ad prædium pastoris, inter *Skaanland* & *Lysvand*; in *Salangen* prope effluvium lacus *Övre-Vand*, supra *Krogen* (non „Kløven“ ut erronee in *Ind. suppl.* dictum), supra prædium interius *Lund*; in *Sör-Reisen* prope *Tömmervigvand*, ad *Dybvaaag*, ad *Nordstrømmen*, ibi in montem *Barkollen* c. 800 ped. supra mare adscendens, juxta rivulos supra *Finsæt* socialiter copiosum & giganteum; in insula *Senjen* proportionaliter parcius ad *Langhoug* districtus *Græsmysrkoven*, prope *Kvånaas*, juxta lacus *Lysbottenvand* & *Hegvand*; in *Maalselven* frequenter socialiter copiosum agri instar plagas totas radicis jugorum præcipue in convalle interiore mere vestiens ad montem *Akka*, supra *Olsborg* & *Moen* frequenter, ad convallem adjacentem *Tagelvdal*, supra *Grönlid*, supra *Nordmoen*, in alpem *Kalvehovedet* 900—1000 ped. supra ripas fluminis adscendens, supra *Nergaard*, supra *Överby*, supra *Kongslid* luxurians copiosissimum; ibi in radice alpis *Rostafjeld* terminum Betularum fruticose evolutarum omnino attingens, in convalle *Bardu* in radicem alpium *Istinderne* c. 500 ped. supra ripas fluminis adscendens, ad radicem alpis *Blaabjerg* copiosissimum.

169b. MAIANTHEMUM BIFOLIUM, DC.

Hab. quoque in *Bejeren* passim copiose in betuletis prope *Solö* & *Muldjord* florens, in pinetis intra *Hemingshyt* tantum sterile (anno 1867) visum, in betuletis infra *Troelid*, *Polypodiorum* & *Melampyrorum* socium, frequenter florens. Hæc planta, quam *Wahlenberg* tantummodo unico loco *Saldalia* observavit & *Lund* e *Maalselven* & *Alten* sine ullo loco speciali indicat, a *Blytt* „valde vulgaris usque ad Finmarkiam orientalem“ refertur, qua de re dubito.

ORCHIDÆ.

169c. ORCHIS LATIFOLIA, L.

Hab. in insula *Senjen* ad paludes inter *Övre-* & *Nedre-Kvånaas*, socia *Pedicularis palustris* & *Eriophori latifolii*, nec non ad tractum prædii *Gibbstad Hanas* versus copiosius.

169d. ORCHIS CRUENTA, Müll.

Hab. in *Kvæfjord* ad paludosa sublittoralia prope *Vig* & *Vogteren*.

170. GYMNADENIA CONOPSEA, Br.

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Solö* & *Muldjord*; in *Skjervö* ad insulam *Hukö*; in *Porsangria* ad introitum sinuli *Kulvig*, ad *Børselv* quum prope ostium fluminis tum c. 1 milliar. a littore, ibi latit. bor. 70° 18—20 attingens; in *Varangria meridionali* ad paludes vastissimas inter *Klostervand* & *Vætsjer*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad tractum templi *Masi* prope lacum montanum supra-jacentem, ad rivum lacui *Sjuosjavre* prope hospitium affluentem.

171. PERISTYLIS ALBIDUS, Lindl.

Hab. quoque in *Bejeren* in *Meraftenklumpen* altius supra terminum *Betulæ* adscendeus; in *Ofoten* ad *Ungsmalö* prope æqvor maris; in *Sör-Reisen* ad *Middagsfjeld* altius supra terminum *Betulæ*; in *Maalselven* ad *Kalvehovedet* c. 1300 ped. supra ripas fluminis; in insula *Seiland* ad *Komag-næs*; in insula *Sörö* ad tractum prædii *Bredvig*; in *Porsangria* ad introitum sinuli *Kulvig*, ad *Russemark*.

172. PERISTYLIS VIRIDIS, Lindl.

Hab. quoque ex. gr. in *Bejeren* supra *Solö* & *Muldjord*, ad *Meraftenklumpen*, ad jugum prope *Heminghyt*, ad *Troelid* prope *Tullaæn* & alibi; in *Kvæfjord* ad tractum prædiorum *Vig* & *Vogteren* infra terminum culturæ Cerealium, ad prædium pastoris *Tranö* prope æqvor maris; in *Thronenæs* ad prædia *Skaanland*; in *Salangen* supra *Moholtet*; in *Sör-Reisen* ad *Bærkollen*, supra *Finsæt*; in *Maalselven* ad *Akka*, ad *Skjeggenæs*, ad *Kalvehovedet*, juxta *Beinelv* infra terminum *Pini* nec non alibi frequentius; in *Skjervö* ad jugum inter *Rotsundelv* & *Sörkjosen*, ad *Bergskoven* convallis *Reisendal* infra terminum *Pini*, ad *Sokkelvig* prope æqvor maris, ad insulas *Skjervö* & *Hukö*; in *Varangria meridionali* ad tractum prædii *Elvenæs*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad *Spjerkojokka*, in betuleto jugi ad *Gætkasjduodar*.

173. PLATANThERA BIFOLIA, Rich.

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Solö* & *Muldjord*; in *Ofoten* intra *Evenæs*, ibi socia *Vaccinii Myrtilli* & *Caricis digitatæ*; in *Lödingen* secundum specimen a *Haukland* mis-

sum; in insula *Rollen*, unde *Ellefsen* specimen misit; in insula *Senjen* prope *Gibbstad*.

174. EPIPACTIS LATIFOLIA, *Br.*

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Sölö & Muldjord*, ad *Arstadaasen*, ad *Troelid* convallis interioris; in *Gildeskaal* ad *Oldervig*; in *Stegen* ad radicem alpium *Præstkontinden* secundum specimina ab *Haukland* missa; in *Ofoten* ad *Evenæs* quum prope littora maris tum ad rupes ab iis remotiores; in *Kvæsfjord* ad *Vig & Vogteren*; in *Skjervö* ad insulam *Hukö* (70° 1); in *Porsangria* ad introitum sinuli *Kulvig*, ad *Börselev*, locum ejus polo proximum, quum in interiore ex adverso alpium *Silfavarre* tum inter pagum & *Hestenæsset* prope littora copiose, ibi p. p. socia *Caricis rupestris*, *C. pedatæ*, *Saxifragæ aizoidis*, *Dryadis octopetalæ* nec non herbarum aliarum alpinarum.

174b. OPHRYS MYODES, *L.*

Hab. nov. civis et maxime inopinata Floræ arcticæ nec non rarior Floræ Norvegicæ in *Gildeskaal* prope *Oldervig* ad clivos apricos calcareos graminosos *Populis* sparsis macris consitos, ibi latitudinem borealem attingens c. 67°. Flores primos æstate persegni 1867 ultimis diebus Junii aperuit.

175. CHAMÆORCHIS ALPINA, *Rich.*

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Meraftenklumpen* supra terminum *Betulæ*; in *Sör-Reisen* ad alpem *Middagsfjeld* quoque supra terminum *Betulæ*; in *Porsangria* ad introitum sinuli *Kulvig* prope æquor maris, ad cacumen alpium *Silfavarre* convallis *Börselev*.

175b. LISTERA CORDATA, *Br.*

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Sölö & Muldjord* infra terminum *Pini*; in insula *Senjen* ad colles piniferos prope *Gibbstad*; in *Maalselven*, unde a *Lund* jam indicata, juxta fl. *Beinelv*; in *Varangria meridionali*, unde antehac non notata, juxta *Klostervand* prope *Svanvig*, ibi socia *Ranunculi Lapponici* & *Nardosmæ frigida*.

175c. LISTERA OVATA, *Br.*

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Sölö & Muldjord*, ad *Arstadaasen*; in *Gildeskaal* supra *Indyr*, prope *Dal* nec non alibi frequentius; in *Ofoten* ad tractum prædii *Evenæs*; in *Sör-Reisen* prope *Reisenvand* non parce, ibi latit. bor. 69° 7—9.

176. CORALLORHIZA INNATA, *Br.*

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Arstadaasen*, ad *Meraf-tenklumpen*, utroque loco in regione betulina superiore; in *Sör-Reisen* ad *Middagsfjeld*; in *Maalselven* ad radicem alpis *Kalvehovedet*; in *Alten*, unde indicata, per partem inferiorem convallis principalis & per convallem *Tverelvdal* passim usque ad *Mandsverk*.

176b. CYPRIPEDIUM CALCEOLUS, *L.*

Hab., antehac unico loco *Saltdalie* lectum, quoque in *Gildeskaal* ad prædium pastoris in radice graminosa betulifera jugi, ubi fine Junii adhuc non florens nec foliis evolutis gaudens sed floribus præcocibus in turione turgescente dignoscendis. Tractus angustior, in quo habitat, sic inter *Orchideas* præter alias *Listera ovata*, *Epipactide latifolia*, *Ophryde myode*, *Cypripedio*, societate in agro arctico sat mirabili, insignitur.

177. GOODYERA REPENS, *Br.*

Hab. quoque in *Ofoten* ad *Ungsmalö* prope *Lidland*; in *Skjervö* ad jugum prope *Seima* convallis *Reisendal* interioris; in *Alten* per convallem *Tverelvdal* frequenter; in *Porsangria* ad jugum prope *Bækkegoppe*; in *Varangria meridionali* inter *Elvenæs* & *Svartnes*, juxta fl. *Pasvigelv* ad cataractam inter *Klosterrand* & *Goalsejavre*, inter *Goalsejavre* & *Bossojavre*, nec non in confiniis *Rossicis* ad *Borrigleb*, ad radicem alpis *Galgoaive*, præterea juxta partem inferiorem fluminis *Neidenelv*.

TYPHACEÆ.

178. SPARGANIUM HYPERBOREUM, *Læstæd.*

Hab. quoque in *Alten* ad *Pescades*; in *Tanaafjord* ad *Store-Lerpollen*. Specimina sterilia Sparganii non certe determinanda per magnam partem agri passim frequentia observavi.

JUNCACEÆ.

179. LUZULA PILOSA, *Wild.*

Hab. quoque ex. gr. in *Bejeren* supra *Solö*, prope *Solvand*, supra *Heminghyt*; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*; in *Vesteraalia* ad insulam *Hadselö*; in *Salangdal* supra *Lund*; in insula *Senjen* ad *Laxelv*; in *Maalselven* quoque ad partem superiorem convallis *Dividal*; in *Skjervö* ad

insulas *Hukö* & *Skjervö*; in *Tana fjord* ad *Store-Lerpollen*; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*; in *Varangria meridionali*, unde hactenus non memorata, prope cataractam inter *Klostervand* & *Goalsjavre*, inter *Goalsejavre* & *Bossojavre*, nec non latere *Rossico* ad *Galgoaive*; præterea ad limitem *Finmarkiæ continentalis* interioris ad *Spjerkajokka*.

180. *LUZULA PARVIFLORA*, Desv.

Hab. quoque in *Maalselven*, unde a *Lund* citata, ad radicem alpium *Istinderne* supra *Stormoen*, ad *Aglapen* supra terminum *Betulæ*; in *Skjervö* ad jugum prope *Seima* convallis *Reisendal* interioris; in parochia *Hammerfest* ad *Riperfjorddal*; in *Varangria meridionali* ad tractum prædii *Elvenæs*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Altenelv* ad *Spjerkajokka*, ad tractum templi *Masi*, ad *Duogasjmoske*, porro ad *Sjuosjavre*, juxta fl. *Karasjok* ad *Beskinjarga*, ad alpem *Dufteroavve*.

181. *JUNCUS BALTICUS*, Wild.

Hab. quoque in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*, ad *Ungsmalö*; in *Vesteraalia* ad insulam *Hadselö*; in *Kvæfjord* ad tractum prædiorum *Vig* & *Vogteren*; in *Thronenæs* ad tractum prædii *Harstadhavn*, ad *Skaanland*; in *Sör-Reisen* prope *Reisenvand*; in insula *Senjen* juxta partem inferiorem fluminis *Laxelv*, prope *Gibbostad*.

182. *JUNCUS ARCTICUS*, Wild.

Hab. quoque in *Bejeren* ad ripas fluminis intra *Heminghyt*, ibi infra terminum culturæ *Cerealium*; nec non in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Altenelv* loco c. 1 milliar. extra templum *Masi*.

183. *JUNCUS ALPINUS*, Vill.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Solö*; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lidlandskaret*; in *Kvæfjord* ad *Vig* & *Vogteren*; in *Sör-Reisen* ad *Nordstrømmen*, in insula *Senjen* ad *Laxelv*, ad *Kvanaas*, prope *Gibbostad*; in *Skjervö* ad insulam *Hukö*.

184. *JUNCUS BUFONIUS*, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Solö*, ad *Heminghyt*; ad *Bodö*; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*; in *Sa-langdal* intra *Krogen*; in *Sör-Reisen* ad *Finsæt*; in insula *Senjen* ad *Græsmyrskoven*, ad *Kvanaas*, ad *Gibbostad*; in *Skjervö* ad insulas *Skjervö* & *Hukö*; in parochia *Hammerfest* ad littus occidentale sinus *Riperfjord*.

CYPERACEÆ.

184b. CAREX DIOICA, L. — ISOGYNA, Fr.

Hab. copiose in insula *Senjen* ad tractum prædii *Gibbostad* sc. ad paludes latiores prope *Hanæs*. Ibi latit. bor. attingens 69° 22—23 forma insignis videtur. Forma huc forsitan pertinens sed multo robustior in insula *Hukö* lecta est.

185b. CAREX NARDINA, Fr.

Hab. planta rarissima, antehac e duobus locis Norvegiæ indicata, quoque in *Sör-Reisen*, copiose nascens prope terminum Salicum majorum, ibi ad latit. bor. c. 69° 4.

186. CAREX CAPITATA, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Meraftenklumpen* supra terminum Betulæ; in *Ofoten* ad paludes paullo supra mare elevatas passim frequentius quam alibi agri a me visa sc. juxta *Laxelv* prope *Lerosen*, ad *Ungsmalö*, ad tractum prædii *Evenæs* jan a *Zetterstedt* citata pluribus locis præcipue circum lacum *Kirkevand* copiose; nec non in *Porsangria* ad paludem sublittoralem in promontorio *Hestenæset* extra ostium fluminis *Börselev* posito, ibi latit. bor. attingens 70° 18—20.

187. CAREX PAUCIFLORA, Light.

Hab. quoque in *Bejeren* ad rivulum infra *Arstadaasen* copiose, ad jugum supra *Heminghyt*; in *Ofoten* ad paludes supra *Lerosen* prope *Laxelv*; in *Throndenæs* intra *Skaanland* prope *Lyssvand*; in insula *Senjen* ad *Laxelv* inter *Troldbuvand* & *Renlidkollen*, ad tractum prædii *Gibbostad* frequentius; in *Maalselven* ad radicem alpis *Mauken* supra *Nordmoen*, juxta fl. *Beinelv*; in *Varangria meridionali* ad tractum prædii *Elvenæs*, juxta *Pasvigelv* ad cataractam inter *Klostervand* & *Goalsejavre*, ad *Bagjajavre*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Karasjok* ad radicem alpis *Dafteroavve*.

187b. CAREX MICROGLOCHIN, Wg.

Hab., præcedente in hoc agro certe multo rarior, etsi eximius *Wahlenberg* hanc solam, non *paucifloram*, Floræ arcticæ Norvegiæ tribuit, quoque in *Bejeren* ad *Solö* infra terminum culturæ Cerealium, ad *Meraftenklumpen* supra terminum Betulæ.

188. CAREX NORVEGICA, Wild.

Hab. quoque in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*, ad effluvium lacus *Tømmer-*

vigvand; in insula *Senjen* ad ostium fluminis *Laxelv*, ad *Kvanaas*, ad tractum prædii *Gibbstad*; in *Skjervö* ad insulam *Hukö*; in insula *Seiland* ad *Kvistnæsffjord*; in parochia *Hammerfest* ad littus occidentale sinus *Riperffjord*; in *Porsangria* ad *Valdak*; in *Tanaffjord* ad *Lille-Lerpollen*.

188b. CAREX HELEONASTES, Ehr.

Hab. nov. civ. Flor. arct. Norv. in *Finmarkia continentali* interiore ad paludem longissime protractam jugi inter *Masi* & *Lappojavre* positi copiosius. Ibi, *Saxifragæ Hirculi* socia, latit. bor. attingit c. 69° 30.

189. CAREX STELLULATA, Schreb.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Arstadaasen*, ad radicem alpium *Meraftenklumpen*, inde per convallem intra *Hemingshyt* ingrediens, in jugi latera prope hoc adscendens; ad *Rostnæsodden* sinus *Bejerenffjord*; in *Ofoten* ad paludosa supra *Lerosen* copiose; ad littus orientale sinus *Kræffjord*; in *Sör-Reisen* ad *Tömmervigvand*; in insula *Senjen* juxta fl. *Laxelv* intra *Grönlid* ingrediens, ad tractum prædii *Gibbstad* frequenter, ad *Lysbottenvand* insulæ interioris ingrediens; in *Skjervö* ad insulas *Skjervö* & *Hukö* passim, ibi latit. bor. 70° ægre transgrediens. Nec longius arctoam versus nec in *Finmarkia* orientali a me hactenus visa, neque, quantum mihi innotuit, a scrutatoribus ipsis horum tractuum exactioribus *Wahlenberg*, *Lund*, *Th. Fries* inde citata est. A *Blytt*, qui verisimiliter rebus herbarii v. relationibus paullo commutatis & confusis usus est, hæc species, ut aliæ, ut „vulgaris per totam Norvegiam usque ad *Finmarkiam* orientalem“ refertur.

190. CAREX LOLIACEA, L.

Hab. quoque in *Sör-Reisen* supra *Östgaard* convallis *Gumpendal*, supra *Sörfosbogen* convallis *Svartaasdal*; in insula *Senjen* juxta fl. *Laxelv* intra *Grönlid*; in *Maalselven* ad *Nordmoen*, ad *Skjeggenæs* copiose, supra *Nergaard*, per convallem *Bardu* ad *Brandmo*, ad *Stormoen*; in *Varangria meridionali* ad tractum prædii *Evenæs*, ad cataractam inter *Goalsejavre* & *Bossojavre*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad tractum templi *Masi*, ad *Sjuosjavre*, juxta fl. *Karasjok* ad *Nitomokkejogasj*. Ad loca nominata *Varangriæ* & *Finmarkiæ* præcipue ad paludosa visa est, nec ut alibi agri clivos graminosos betuliferos præferens.

191. CAREX HELVOLA, *Blytt.*
 Hab. quoque in *Skjervö* ad insulam *Hukö*; in *Porsangria* ad latera jugi intra *Repvaag*.

191b. CAREX MICROSTACHYA (?) *Ehr.*
 Occurrit, socia præcedentis, forma huic speciei omnino congruens sed in eo anomala, ut omnes flores, ut videtur, masculi soli sint, in insula *Hukö*.

192. CAREX INCURVA, *Light.*
 Hab. quoque in *Bejeren* prope *Solö*; in *Gildeskaal* ad *Dal*; in *Ofoten* inter *Lidlandskaret* & *Lerosen* passim; in *Kvæffjord* ad tractum prædiorum *Vig* & *Vogteren* loco 1—200 ped. supra mare elevato; in *Sör-Reisen* in montem *Bærkollen* 3—400 ped. supra mare adscendens; in insula prædii pastoris *Tranöensis*; in insula *Senjen* ad ostium fluminis *Laxelv*, ad tractum prædii *Gibbostad*; in *Skjervö* ad insulam *Hukö*.

193. CAREX CHORDORHIZA, *Ehr.*
 Hab. quoque in *Bejeren* ad *Solö*, ad jugum supra *Heminghyt*; ad *Bodö*; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*, ad *Ungswälö*; in *Vesteraalia* ad insulam *Hadselö*; in *Throndenæs* ad prædium pastoris; in *Salangdal* prope prædium interius *Moholtet*; in *Sör-Reisen* ad *Sörfosbogen* convallis *Svartaasdal* (non „Skoelv“, ut in mappa ethnographica *Früsi* designatur); in insula prædii pastoris *Tranö*; in insula *Senjen* ad partem superiorem convallis *Laxelv*, ad *Græsmyrskoven*, ad tractum prædii *Gibbostad*; in *Lenvig* inter *Finfjord* and & *Renvand*; in parochia *Hammerfest* ad littus occidentale sinus *Riperfjord*; in *Porsangria* inter *Stabursnæs* & *Valdak*, intra *Repvaag* (latit. bor. 70° 45—46); in *Varangria meridionali*, unde antehac non notata, ad tractum prædii *Elvenæs*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Altenelv* ad *Spjerkojokka*, ad jugum inter *Masi* & *Lappojavre*, inter *Gætkasjuodar* & lacum *Sjuosjavre*, prope hunc.

194. CAREX TERETIUSCULA, *Good.*
 Hab. quoque in *Ofoten* ad tractum prædii *Evenæs*; in insula prædii pastoris *Tranö*; in *Maalselven*, unde antehac non citata, ad *Nordmoen*; præterea sat inopinate in *Finmarkia continentali* interiore ad jugum inter *Masi* & *Lappojavre*.

194b. CAREX PARADOXA, *Wild.*

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in *Ofoten* ad tractum prædii *Evenæs* pluribus locis copiosa & optime evoluta. Ad ripas lacus *Kirkevand* cæspites ejus dense juxtapositi plagas latas tegunt.

195. CAREX BUXBAUMII, *Wg.*

Hab. quoque in *Bejeren* ad jugum prope *Heminghyt*; in *Ofoten* in alpem *Laxetind* supra terminum Betulæ adscendens in *Throndenæs* ad *Lysvand* intra *Skaanland*; in insula *Senjen* prope ostium fluminis *Laxelv*, ad tractum prædii *Gibbstad*, prope *Lysbottenvand* & *Hegvand*; in *Maalselven*, unde prius non indicata, ad *Nordmoen*; in *Skjervö* ad *Bergskoven* convallis *Reisendal*, ad insulam *Hukö*; in convalle Altensi *Tverelvdalen*, inde in alpes *Gamasvarre* usque ad terminum Betulæ adscendens; in insula *Seiland* ad *Komagnæs*; in parochia *Hammerfest* ad littus occidentale sinus *Ripersfjord*; nec non in *Lapponia Rossica* Varangriæ meridionali adjacente ad *Borisgleb*; præterea in *Finnarkia continentali* interiore juxta *Atteneelv* ad *Spjerkojokka*, ad tractum templi *Masi*, ad jugum inter *Lappojavre* & *Gatkasjduodar*, inter hoc & lacum *Sjuosjavre*, prope huncce.

196. CAREX MISANDRA, *Br.*

Hab. quoque in *Salangdal* ad alpes supra *Lund*; in *Sör-Reisen* ad *Middagsfjeld*; in *Maalselven* ad *Istindeerne*, ad *Langfjeldene* prope *Beineelv*, omnibus locis hisce supra terminum Betulæ.

196b. CAREX RARIFLORA, *Sm.*

Hab., frequentior ad paludosa supra mare minus elevata a littore non nimis remota, quoque in *Ofoten*, ubi ceterum rarior videtur, ad *Ungsmalö*; in *Sör-Reisen* in alpem *Middagsfjeld* supra terminum Betulæ adscendens; in insula *Senjen* ad paludosa districtus *Græsmyrskoven* c. $\frac{3}{4}$ milliar. a littore remota, ad convallem *Laxelv* prope *Troldbuvand*, ad alpes prope *Lysbottenvand* a mari remotiores in vicinia termini Betulæ; in *Maalselven* ad radicem alpibus *Mauken* supra *Nordmoen* plur. milliar. a mari remotam; in convallibus *Altensibus* c. 1 milliar. ab ostio; nec non in *Varangria meridionali* prope *Elvenæs* supra terminum Betulæ.

197. CAREX USTULATA, *Wg.*

Hab. quoque in *Bejeren* ad latera jugi prope *Muldfjord* copiose, ibi infra terminum Pini; in *Sör-Reisen* ad *Middags-*

fjeld; in *Maalselven* ad *Istinderne*, utroque ultimo supra terminum *Betulæ*.

167b. CAREX LIVIDA, *Wg.*

Hab. rarior Norvegiæ, antehac ex *Alten*, ubi eam inter *Lampe & Eiby* legi, indicata, quoque in *Finmarkia continentali* interiore passim frequentius & copiosius ad jugum vastum inter *Gætkasjduodar* & lacum *Sjuosjavre*, nec non juxta hunc ex. gr. infra hospitium („*Fjeldstuen*“). Hisce locis in regione betulina superiore v. suprema versatur, dum in *Alten* infra terminum culturæ Cerealium nascitur.

197c. CAREX LAXA, *Wg.*

Hab. nov. *) civ. Floræ Norvegiæ in *Finmarkia continentali* interiore prope *Sjuosjavre* proxime infra hospitium, ibi non parce in regione betulina superiore nascens.

198. CAREX PALLESCENS, *L.*

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Solö*, ad *Arstadaasen*, ingrediens usque ad *Heminghyt & Troelid*, ubi copiose ad jugum juxtapositum; in *Bejerenfjord* ad *Rostnæsodden*; in *Ofoten* ad *Lidlandskaret*, ad *Lidland*, in alpem *Laxetind* 4–500 ped. supra mare & ad latera convallis supra *Lerosen* 600 ped. adscendens; in *Kvæfjord* ad *Vig & Vogteren* copiosius; in *Throndenæs* ad *prædium pastoris*; in *Salangen* prope effluvium lacus *Övre-Vand*; in *Sör-Reisen* prope *Tömmervigvand*, ad *Dybvaag* ad *Nordströmmen*, ibi in *Bærkollen* c. 600 ped. supra mare adscendens; in insula *Senjen* ad *Solberg*, juxta *Laxelv* intra *Grönlid*, ad tractum prædii *Gibbstad*, prope *Hegvand & Lysbottenvand*; in *Lenvig* prope lacum *Finfjordvand*, inter hunc & *Renvand*; in *Skjervö* ad *Rotsundelv* copiosius in radicem jugi paullo adscendens, ad *Sokkelvig*, ad insulam *Hukö* non parce, ibi latit. bor. 70° ægre transgrediens. Longius septentrionem versus v. in convallibus interioribus *Nordlandiæ borealis & Finmarkiæ* v. in tota *Finmarkia orientali* eam hactenus nullibi offendi. In *Tanen* *Finmarkiæ orientalis* a *Lund* lecta dicitur, sed in hoc error quidam forsitan adest, nam ipse in scriptis suis eam tantum ad *Kaafjord* progredientem reiterate refert. A *Blytt* hæc ut plures aliæ, quæ vix ad de-

*) Non immemor sum, beatum Hornemann eam e Norvegia indicasse, sed indicationes ejus quoad hunc agrum ignorandæ sunt, quippe nimis frequenter ab errore topographico in *Wahlenbergio* transcribendo manifeste dependent.

cimam partem Finmarkiæ si ullibi hujus terræ occurrunt, „ut valde vulgaris usque ad Finmarkiam orientalem“ designatur.

199. CAREX FILIFORMIS, L.

Hab. quoque in *Bejeren* prope *Grönvatne* prædii *Lund*; ad *Bodö*; in *Ofoten* ad convallem supra *Lerosen*; in *Kæfjord* intra *Vig & Vogteren*, in *Sör-Reisen* ad jugum supra *Bærkollen*, in insula *Senjen* ad *Tranöbotten*, prope partem interiorem fluminis *Laxelv*; in *Porsangria* ad *Börselv*, ibi latit. bor. 70° 18–20 attingens; in *Varangria meridionali* juxta fl. *Pasvigelv* ad cataractam inter *Goalsejavre & Bossojavre*, nec non latere *Rossico* ad *Store-Menikasö*; præterea in *Finmarken continentali* interiore juxta *Altenelv* ad tractum templi *Masi*, ad ripas stagni in jugo ipso inter *Masi & Lappojavre*, ad *Sjuosjarre*.

200. CAREX PEDATA, Wg.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Meraftenklumpen* supra terminum *Betulæ*; in *Sör-Reisen* ad *Middagsfjeld* altius supra terminum *Betulæ*; nec non in *Porsangria* ad *Sljavarre* convallis *Börselv &* ad rupes sublittorales extra ostium fluminis prope *Hestenæsset*.

201. CAREX FLAVA, L.

Hab. quoque ad *Bodö*; in *Ofoten* ad paludes supra *Lerosen* copiose, ibi ad convallem adjacentem c. 600 ped. supra mare adscendens, prope *Kirkevand* intra *Evenæs*; in isthmo *Kvæfjordeidet*; in *Sör-Reisen* ad *Hestö*, ad *Nordströmmen*, ad *Sörfosbogen* convallis *Svartaasdal*; in insula *Senjen* ad *Laxelv*, ad tractum prædii *Gibbostad* frequenter, ad *Lysbottenvand*; in *Lenviq* inter *Finsjordvand & Renvand*; in *Maalselven* ad *Nordmoen*, ad *Ulleberg* convallis interioris *Dividal*; in *Balsfjord* ad *Storstennæs*; in *Skjervö* ad *Rotsundelv*, ad *Bergskoven* convallis interioris *Reisendal*, ad *Sokkelvig*, ad insulas *Skjervö & Hukö*; in insula *Seiland* ad *Komag-næs*; ad tractum oppidi *Hammerfest*; nec non in *Lapponia Rossica* *Varangriæ meridionali* adjacente ad *Borisgleb*.

201b. CAREX ØDERI, Ehr.

Hab., vulgo ad littora maris, quoque in *Bejeren* prope *Solö*; in *Ofoten* inter *Lidland & Lerosen*; in *Throndenæs* ad ripas lacus *Lysvand* a littore maris remotioris; in *Sör-Reisen* prope *Tömmervigvand*, ad *Dybvaag*, ad *Nordströmmen*; in insula *Senjen* ad *Kvanaas*, ad tractum prædii *Gibbostad*; in *Alten* inter *Bossekop & Strömsnæsset*.

202b. CAREX PILULIFERA, L.

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in *Gildeskaal* ad radicem jugi supra *Indyr*; nec non in *Kvæfjord* ad clivos supra *Vig* & *Vogteren*, ibi latit. bor. attingens c. 68° 45', utroque loco sat copiosa.

202c. CAREX DIGITATA, L.

Hab., antehac unico loco *Saltdalia* a *Wahlenberg* visa, quoque in *Bejeren* supra *Solö* & *Muldjord*, ad *Arstadaasen*, ad radicem alpis *Seglfjeld*, inde per convallem ingrediens ad jugum prope *Heminglyt*, ad *Troelid* prope *Tullaen*; in *Gildeskaal* supra *Indyr*; in *Ofoten* intra *Evenæs* ad rupes calcareas sat copiosa, sed æstate quidem 1865 floribus ante maturationem fructus marcescentibus & delabentibus, ibi latit. bor. attingens 68° 28'—29'.

202d. CAREX ORNITHOPODA, Willd.

Hab., a *Sommerfelt* ad *Bodö* lecta, quoque in *Gildeskaal* ad tractum prædiorum *Indyr* & *Dal* quum ad radicem jugi tum ad rupes sublitorales frequentius copiose. A *Wahlenberg*, *Lund*, *Th. Fries* intra limites agri arctici Norvegiæ nullibi indicata, a *Blytt* ut „sat vulgaris usque ad Finmarkiam orientalem“ vix rite designatur.

203b. CAREX MARITIMA, Müll.

Hab. quoque in *Sör-Reisen* ad ripas lacus subsalsi *Reisenvand*; nec non in *Allen*, unde prius indicata, ad ostium fluminis *Allenelv*, loca sola, ubi hactenus a me visa est.

205. HELEOCHARIS UNIGLUMIS, Link.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Solö*; in *Ofoten* ad *Lerosen*; in *Throndenæs* ad tractum prædii *Harstadhavn*; in *Sör-Reisen* ad effluvium lacus *Tömmervigvand*, ad ripas lacus *Reisenvand*, inde secus flumen affluens usque ad *Finsæt* ingrediens; in insula prædii pastoris *Tranö*; in insula *Senjen* ad ostium fluminis *Laxelv*, ad *Kvanaas*, ad tractum prædii *Gibbstad*; in *Skjervö* ad *Rotsundelv*.

206. SCIRPUS PAUCIFLORUS, Light.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Solö*, in *Ofoten* ad *Lidland*, ad *Lerosen*, inter *Lidland* & *Lidlandskaret* quoque ad paludes a littore ipso paullo remotas; in *Throndenæs* ad prædium pastoris; in *Sör-Reisen* prope *Reisenvand*; in insula *Senjen* ad *Kvanaas*, ad tractum prædii *Gibbstad*; in *Skjervö* ad *Rotsundelv*.

207. TRICHOPHORUM ALPINUM, Pers.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Solö*, ad jugum supra *Troeid*; ad *Bodö*; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*, inde in convallem adjacentem c. 600 ped. supra mare adscendens; in *Sör-Reisen* ad *Sörfosbogen*; ad latus boreale promontorii *Hestö*; in insula *Senjen* ad ostium fluminis *Laxelv*, ad tractum prædii *Gibbostad*, ad *Lysbottenvand*; ad *Hegvand*; in *Maalselven* ad *Skjeggæes*, juxta *Beinelv*, ad prædium *Aasen*; in insula *Seiland* ad *Komagnæs*, ibi latit. bor. attingens 70° 31—32; in *Varangria meridionali*, unde prius non indicatum, ad cataractam inter *Goalsjåvre* & *Bossjåvre*.

207b. TRICHOPHORUM (Scirpus) EMERGENS,

n. sp.

Hab. planta, quæ nova species aut *Trichophori* aut *Scirpi* videtur, in *Porsangria* ad littora maris arenosa inundata prope ostium fluminis *Börselev* (70° 18—20) copiose. Autumno serotino 1864 lecta, postea frustra ab adjutoribus perquisita, nucibus maturis solis ornata fuit, sed omnibus glumis destituta, quæ de re genus, ad quod pertinet, dubium est. Habitum fere *Scirpi pauciflori* præ se fert, tantum culmi graciliores sunt. Vaginæ basilares culmi ut in *Trichophoro cæspitosa*, a quo rhizomate repente, stolonifero, fasciculos pauciculmeos immo culmos solitarios huc illuc emittente, recedit. Sub accessu maris inundatur, sub recessu emergit.

208. ERIOPHORUM LATIFOLIUM, Hoppe.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Solö*, inde passim per convallem usque intra *Heminghyt* ingrediens, in cujus vicinia in jugum ad ripas stagni *Grönvatne* adscendens, ibi *Pedicularis palustris* socia; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen* ad paludes usque ad 100 ped. supra mare elevatas frequentius, inde prope *Laxelv* c. 200 ped. adscendens, ad tractum prædii *Evenæs* ex. gr. ad *Kirkevand* passim; in *Kvæffjord* supra *Vig* & *Vogteren* loco 1—200 ped. supra mare elevato; in *Throndenæs* inter *Skaanland* & *Lysvand*; in *Sör-Reisen* prope *Reisenvand*, prope *Tømmervigvand*, ibi ad paludes *Eriophoro* angustifolio copiosius; in insula *Senjen*, ubi, ut frequenter in hoc agro, quoque a *Pediculari palustri* comitatur, ad partem inferiorem & præcipue ad ostium fluminis *Laxelv*, dein inter prædia *Kvanaas*, ad tractum prædii *Gibbostad* frequenter copiose; in *Maalselven* prope lacum *Tayvand* parcius; nec non in *Varangria meridionali* ad pa-

ludes vastas inter *Klostervand* & montes *Vætsjer* parcissime visum. Additis locis jam prius a me indicatis, species evadit qvoad distributionem occidentalem frequentior, ut videtur, per tractum littoralem Nordlandiæ meridionalis & mediæ, in illa qvoque in convalles continentales ingrediens, dein arctoam versus tantum sporadica in tractu littorali solo usque ad Talvig procedens, ibi 70mum gradum latit. bor. ægre transgrediens. Præterea in Finmarkia orientali ultima denuo parce emergit, verisimiliter cursus distributionis omnino diversi continentali-orientalis statio maxime extrema. Itaqve limitatio distributionis, quam *Lund* in Bot. Notis, 1846 dedit, observationibus hodiernis æque congruens est, ut dubia *Blyttii* (Norg. Fl. 1860), cæterum qvoad abundantiam specierum agro arctico tribuendam nil minus ac parci & tenacis, de proventu specei in hoc territorio parum fundata.

211. ERIOPHORUM RUSSEOLUM, *Fr.*

Hab. planta rara Norvegiæ qvoque in *Finmarkia continentali* interiore ad jugum inter *Lappojavre* & *Gæthasjvodar*, inter hoc & *Sjuosjavre* ex. gr. prope *Loantsegielas*, prope partem superiorem rivi lacui *Sjuosjavre* ad hospitium affluentem frequentius nec parce, præterea juxta fl. *Karasjok* inter pagum & radicem alpibus *Dafteroavve*. Centrum dispersionis speciei intra agrum Norvegicum in *Finmarkia continentali interiore*, ut videtur, qværendum est. Proventus in convallibus Altensibus ut statio extrema secus cursum fluminum in peripheriam littoralem protrusa considerandus est.

212. ERIOPHORUM CALLITHRIX, *Cham.*

Hab. qvoque in *Maalselven* ad radicem alpium *Istinderne* passim ex. gr. supra *Brandmo* locis 3—400 ped. supra mare elevatis.

213. BLYSMUS RUFESCENS, *Link.*

Hab. qvoque in *Gildeskaal* ad *Dal*; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*; in *Throndenæs* ad tractum prædii *Harstadhavn*; in *Sör-Reisen* ad effluvium lacus *Tömmervigvand* copiose, ad *Nordströmmen*, ad ripas lacus subsalini *Reisenvand*; in insula prædii pastoris *Tranöensis*; nec non in insula *Senjen* ad *Kvanaas*, ad tractum prædii *Gibbstad*.

213 b. KOBRESIA SCIRPINA, *Wild.*

Hab. rara hujusce agri qvoque in *Bejeren* ad *Meraftenklumpen*, loco supra terminum *Betulæ* elevato parcius visa.

GRAMINEÆ.

214. ALOPECURUS PRATENSIS, L.

Hab. quoque in insula prædii pastoris *Tranö*, ibi forsitan adventitius.

215. ALOPECURUS NIGRICANS, *Hornem.*

Hab. quoque in *Lödingen* secundum specimen ab *Haukland* missum; in insula *Senjen* ad *Gibbstad*; in insula *Tromsö* ad littus occidentale.

216. ALOPECURUS GENICULATUS, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Solö*, ad *Heminghyt*; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*; in *Kvæfjord* ad *Vig* & *Vogteren*, ad *Kvæö*; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*; in insula *Senjen* ad *Laxelv*, ad *Kvanaas*, ad *Gibbstad*; in *Alten* ad alpem *Gamasvarre* prope terminum *Betulæ*; in *Porsangria* prope lacus *Laxevandene*, ad *Veinæs*; in *Varangria meridionali* ad *Gaddeluobal*, nec non latere *Rosico* inter *Gaddeluobal* & *Vagetimjavre*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad *Spjerkojokka* paullo infra terminum *Betulæ*, ad jugum inter *Masi* & *Lappojavre* in regione *betulina* superiore; juxta fl. *Karasjok* ex. gr. ad *Mannevarrenjarga*.

217. PHLEUM PRATENSE, L.

Hab. quoque in *Kvæfjord* ad prædia *Vig* & *Vogteren* copiose.

218. PHALARIS ARUNDINACEA, L.

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Solö* & *Muldjord*, ad *Arstadaasen*, ibi socialiter copiose agri instar ad clivos siccus nascens, vulgo sterilis; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*; secus littus orientale sinus *Kvæfjord* copiosius sæpe in latera jugi elevatius adscendens; in *Throndenæs* prope *Sama*, ad prædia *Skaanland*; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*, ibi in montem *Bærkollen* 5—600 ped. supra mare adscendens, prope *Reisenvand*, prope *Tömmervigvand*; in insula *Senjen* ad *Laxelv*, ad tractum prædii *Gibbstad*; in *Skjervö* ad insulam *Hukö*, ibi in radicem jugi adscendens; in *Tanafjord* ad *Store-Lerpollen*, ibi d. 30mo Augusti 1865 primos flores aperiens; in *Varangria meridionali* ad fundum sinus *Langsfjord*.

218b. PHRAGMITES COMMUNIS, Fr.

Hab. in agro citranordcapensi, unde e *Vesteraalia* a *Gunnero* jam citata, sed postea, quantum scio, non obser-

vata, quoque in *Bejeren* ad *Solö* humilis & sterilis ad paludosa subexsiccata parcius; in flumine *Pasvigelv Varangriæ* quoque in lacubus ejus interioribus *Bossojavre* & *Baggojavre*, nec non latere *Rossico* prope *Store-Menikasö*.

221. VAHLODEA ATROPURPUREA, Fr.

Hab. quoque in *Alten* ad *Gamasvarre*, ad lacum *Jotkajavre* copiose; in parochia *Hammerfest* ad partem supremam convallis *Riperfjorddal*, ad jugum vastum inter hanc & *Russemark* Porsangriæ passim paullo supra terminum *Betulae* præcipue ad tractum loco ultimo propiorem; in *Porsangria* ad jugum intra *Repvaag*; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv* juxta rivum *Vandelv*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad jugum vastissimum inter convallem *Altensem Tverelvdalen* & *Bavdojavre* tractus *Karasjokensis*, ad jugum inter *Spjerkojokka* & *Masi*, inter *Masi* & *Lappojavre*, quoque in insula hujusce lacus, ad jugum inter *Gætkasjduodar* & lacum *Sjuosjavre*, in betuletis ad hunc copiose, juxta fl. *Jesjök* ad *Oudaldas*, ad partem interiorem fluminis *Taxaelv* prope *Holmen*.

222. AVENA PUBESCENS, L.

Hab. quoque in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lidlandskaret*, ad *Ungsmalö*; in *Vesteraalia* ad *Hadselö* (tantum turiones & folia juvenilia tempore vernö visa, vix tamen dubia); in *Kvæfjord* ad *Vig* & *Vogteren* copiose; in *Throndenæs* ad tractum prædii pastoris passim, ad prædia *Skaanland*; in insula *Senjen* prope ostium fluminis *Laxelv*, prope *Gibbostad* raro (ad rupes calcareas sublittorales parcas).

223. TRISETUM SUBSPICATUM, Fr.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Meraftenklumpen*; in *Ofoten* ad *Laxetind*; in *Salangdal* ad alpes supra *Lund*; in *Sör-Reisen* ad *Middagsfjeld*; in *Maalselven* ad *Mauken*, ad *Istinderne*; in *Skjervö* ad jugum inter *Rotsundelv* & *Sörkjosen*, supra *Vinnelys* convallis *Reisen*, ad *Hukö*; in insula *Seiland* ad *Hönsebyfjeld*; in parochia *Hammerfest* ad partem exteriorem convallis *Riperfjorddal*, ad jugum vastum inter hanc & *Russemark* Porsangriæ passim; in *Porsangria* ad jugum intra *Repvaag*, ad *Siltavarre* convallis *Børselv*; præterea ad litem *Finmarkiæ continentalis* interioris prope *Spjerkojokka*.

224. MELICA NUTANS, L.

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Solö* & *Mulldjord*, ad

radicem alpis *Seglfjeld*, ad *Arstadaasen*, prope *Heminghyt*; in *Gildeskaal* inter *Skovvold* & *prædium pastoris* frequenter; in *Ofoten* ad *Evenæs*, ad *Lidland*, in alpem *Laxetind* supra terminum *Betulæ* adscendens; in *Kvæfjord* ad tractum prædiorum *Vig* & *Vogteren*, ad *Kvæfjordeidet*; in *Salangen* ad jugum prope *Övre- & Nedre-Vand*; in *Sör-Reisen* ad *Finsæt*; in insula *Senjen* interiore ad *Rentidkollen*, prope *Lysbottenvand* & *Hegvand*; in *Balsfjorden* ad *Storstennæs*; in *Skjervö* ad *Rotsundelv*, ad insulas *Skjervö* & *Hukö*; in parochia *Hammerfest* ad *Riperfjorddal*, ibi latit. bor. attingens c. 70° 28'; in *Tanaffjord* ad *Lille-Lerpollen*; in *Varangria meridionali*, unde locus specialis non prius notatus; quoque ad montes piniferos *Vatsjer*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta *Altenev* ad *Spjerkojokka* copiose, ad tractum templi *Masi*.

225. MOLINIA CÆRULEA, *Mönch*.

Hab. quoque in *Ofoten* intra *Evenæs*, prope *Lidland*, ad convallem supra *Lerosen* c. 600 ped. supra mare adscendens; in *Throndenæs* ad *prædium pastoris*, prope *Lysvand* intra *Skaanland*; in insula *Senjen* ad tractum prædiorum *Kvanaas* copiose, ad tractum prædii *Gibbostad* communis, prope *Lysbottenvand* & *Hegvand* frequens, ibi ad radicem jugi in regionem *betulinam* superiorem adscendens; in *Lenvig* ad *Finsjordvand*; in *Varangria meridionali* juxta fl *Pasvigelv* quoque ad cataractam inter *Bossojavre* & *Goalsejavre*, nec non latere *Rossico* ad *Store-Menikasö*.

225b. CATABROSA ALGIDA, *Fr.*

Hab. rarior, ut credo, *Norvegiæ arcticæ* in *Sör-Reisen* ad alpem *Middagsfjeld* supra terminum *Salicum* majorum; prope *Tromsö*, ubi secundum *Blytt* antehac lecta, ad alpes circum *Tromsödal* suo loco copiosius.

225c. CATABROSA AQUATICA, *P. B.*

Hab., ad tractus *citranordcapenses* a me visitatos rarius visa sed suis locis vulgo copiosa, quoque in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*, ad *Finsæt*; in insula prædii pastoris *Tranö*; in insula *Tromsö* in fossis oppidi; nec non prope pagum *Talvig*, ibi latit. bor. 70° paullo transgrediens.

225d. CATABROSA LATIFOLIA, *Fr.*

Hab. quoque ad *Jakobselv* *Varangriæ borealis* secus rivum *Vandelv* & alibi copiosius.

227. DACTYLIS GLOMERATA, L.

Hab. quoque in *Ofoten* ad clivos supra *Lidland & Lidlandskaret* copiosa & luxurians; in *Vesteraalia* ad *Hadselö*, ibi prope *Melbo* altius quam 500 ped. supra mare adscendens; in *Kvæfjord* ad tractum prædiorum *Vig & Vogteren*; in *Throndenæs* ad prædium *pastoris*. In *Finmarkia* stricte dicta nullibi spontanea a me hactenus visa est. In *Varangria* meridionali eam ad prata prædii *Svanvig* seminatum bene vigentem vidi. De proventu spontaneo ejus in *Finmarkia* orientali omnino dubito, sed adventitia v. seminata ubicunque occurrere potest.

227b. TRITICUM REPENS, L.

Hab. quoque in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*, ad *Sörströmmen*; in insula *Senjen* ad *Gibbostad*.

228. TRITICUM VIOLACEUM, Hornem.

Hab. quoque in *Bejeren* ad latera jugi prope *Solö*; in *Alten* ad *Elvebakken*, ad *Storelvdal*, ad *Eibydal*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad *Spjerkojokka*.

229. TRITICUM CANINUM, L.

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Solö & Muldjord*, ad *Arstadaasen*, supra *Heminghyt*, ad *Troelid*; in *Ofoten* ad alneta clivorum supra *Lidlandskaret & Lidland*, inter hoc & *Lerosen*, intra *Evenæs* passim; in *Salangen* prope effluviolum lacus *Övre-Vand*; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*, inde in montem *Bærkollen* adscendens, ad *Finsæt*, ad *Dybrvaag*; in insula *Senjen* ad ostium fluminis *Laxelv*, ad *Renlidkollen*, ad *Kvanaas*; in *Maalselven* inter *Storbakken & Sollid*; in *Balsfjord* prope *Sagvandet*; in insula *Tromsö*; in *Skjervö* ad insulas *Hukö & Skjervö*; in *Alten* per convalles passim, ad tractum pagi *Talvig*; ad *Komagfjord*; in *Porsangria* ad *Börselv*, ad tractum lacuum *Laxevandene*; in *Varangria meridionali* ad tractum prædii *Elvenæs*, ad *Bugöfjord*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad *Spjerkojokka*, ad tractum templi *Masi*, ad *Duogasmoske*, ad jugum in insula lacus *Lappojavre*, juxta fl. *Karasjok* longius intra *Beskinjarga*, inter pagum & ostium, juxta fl. *Anarjok* interius ad *Vassivuovde*, juxta fl. *Tanaelv* ad *Holmen*.

230. ELYMUS ARENARIUS, L.

In tractu continentali interiore *Finmarkiæ* a littore maris remotissimo, unde eum prius notavi, loca specialia sunt: *Javrasmuotkenjarga*, *Vuollevnoppenjarga*, *Muotkenjarga*.

231. NARDUS STRICTA, L.

Hab. quoque in *Bejeren*, ubi ad fundum convallis non visa, ad jugum supra *Heminghyt & Troelid*; in *Ofoten* ad paludosa supra *Lerosen*, in alpem *Laxetind* c. 1800 ped. supra mare adscendens; in *Vesteraalia* ad insulam *Hadselö*; in isthmo *Kvæfjordeidet* prope *Rödmuldheien* supra terminum *Betulæ* adscendens; item in *Sör-Reisen* ad alpes prope *Östgaard* convallis *Gumpendal*, prope *Tömmervigvand*; in insula *Senjen* ad partem interiorem fluminis *Laxelv* copiose, ad tractum prædii *Gibbostad & prope Hegvand & Lysbottenvand* passim copiosissime; in *Maalselven* juxta fl. *Beinelv*; in *Skjervö* prope *Rotsundelv*, ibi ad terminum *Betulæ* apparens & in vicinia prædii *Sörkjosen* supra illum adscendens, ad insulas *Skjervö & Hukö*, loco ultimo in cacumen jugi adscendens; in *Alten* ad *Gamasvarre* paullo infra terminum *Betulæ*; in insula *Seiland* infra alpem *Hönsebyfjeld* copiose; in parochia *Hammerfest* ad partem interiorem convallis *Riperfjorddal*; in *Porsangria* infra alpem *Silfavarre* in excavationibus singularibus territorii calcarei copiose; ad *Kjöllefjord*, ibi latit. boreali c. 70° 57 c. 600 ped. supra mare adscendens; in *Tanafjord* ad *Lille-Lerpollen*; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad jugum inter *Masi & Lappojavre*, juxta rivum lacui *Sjuosjavre* prope hospitium affluentem.

ACOTYLEDONES.

POLYPODIACEÆ.

232. POLYPODIUM RHÆTICUM, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Meraftenklumpen*; in *Ofoten* ad *Laxetind*; in isthmo *Kvæfjordeidet* prope *Rödmuldheien* copiose; in *Salangdal* supra *Lund*; in *Sör-Reisen* supra *Finsæt*, in alpem *Middagsfjeld* usque ad terminum *Salicum* majorum adscendens, ad alpes prope *Östgaard* convallis *Gumpendal*; in *Maalselven* in alpem *Mauken* 2400—2500 ped. supra ripas fluminis adscendens, juxta fl. *Beinelv* infra terminum *Pini*; ad insulam *Tromsö* copiosius; in

Skjervö ad jugum inter *Rotsundelv* & *Sörkjosen*, ad insulam *Hukö*; in insula *Seiland* ad *Komagæs*; in parochia *Hammerfest* ad *Riperfjorddal*; in *Porsangria* ad jugum intra *Repvaag*; ad *Kjöllefjord*; ad tractus interiores jugi vasti inter *Store-Lerpollen* & *Nyborg* Varangriæ; in *Varangria boreali* ad jugum prope *Jakobselv*; præterea fere ad limitem *Finmarkiæ continentalis* interioris ad cacumen *Luoftsjam* inter *Alten* & *Masi*, ibi sola species filicum sed copiosa.

232 b. POLYPODIUM ROBERTIANUM, Hoffm.

Hab. nov. civ. Floræ arcticæ in *Bejeren* ad radicem jugi prope *Solö* & *Muldjord* copiose, ad radicem alpis *Seglfjeld*; in *Gildeskaal* ad tractum prædii *Indyr*, ibi latit. bor. 67° 1—3 attingens.

233. POLYPODIUM VULGARE, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Arstadaasen*; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lidlandskaret*; in *Vesteraalia* ad insulam *Hadselö*; in *Kvæfjord* ad prædia *Vig* & *Vogteren*; in insula *Rollen* prope *Ibbestad*; in insula *Senjen* ad tractum prædii *Gibbostad*; in *Maalselven*, unde antehac non notatum, ad *Ulleberg* convallis *Dividal*, ibi c. 400 ped. supra ripas fluminis adscendens; in *Skjervö* inter *Hurrika* & *Seima* convallis *Reisendal*, ad *Rotsundelv*, ad *Sokkelvig*, ad insulas *Skjervö*; in *Varangria meridionali* ad tractum prædii *Elvenæs*.

233 b. WOODSIA ILVENSIS, Br.

Hab. quoque in *Ofoten* inter *Lidland* & *Sommervig*; in *Porsangria* ad monticulum prope ostium fluminis *Staburselv*; ad *Børselv* (ibi quoque forma in W. hyperboream nimis vergens) latit. bor. 70° 18—20 attingens; in *Tanafjord* ad *Lerpollen* latit. bor. 70° 29—30, ad latera alp's *Alygvarre*; in *Varangria boreali* ad *Flintenæsen* prope *Jakobselv*.

233 c. WOODSIA HYPERBOREA, Br.

Hab. quoque in *Gildeskaal* ad *Indyr*; in *Throndenæs* ad *Seljestad*; in *Sör-Reisen* ad *Finsat*; in *Malangen* ad *Mortenshals*; in *Maalselven* ad *Rognmo*; in *Alten* ad partem exteriorem convallis principalis, ad *Amtmandsnæsset*, ad *Strömsnæsset* prope *Kaaffjord*; in *Porsangria* prope ostium fluminis *Staburselv*, ibi latit. bor. attingens 70° 10—12; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad *Spjerkojohka*, juxta fl. *Karasjok* ad *Dafteroavve*.

233 d. WOODSIA GLABELLA, Br.

Hab. quoque in *Maalselven* ad *Rostafjeld*, juxta fl. *Divielv* ad ostium affluentis *Dödeselv* copiosius; in *Allen* ad radicem alpis *Sakkabani*, unde eam jam anno 1852 reportavi, ad *Eibydal* (f. dubia), ad alpes inter *Kauffjord* & *Talvig*, ad tractum hujusce pagi; in *Porsangria* ad radicem alpium a lacubus *Laxevandene* remotiorum (f. eximie typica); præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad tractum templi *Masi* (f. dubia ad præcedentem vergens.)

234. CYSTOPTERIS FRAGILIS, Bernh.

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Solö* & *Muldjord*, in alpem *Meraftenklumpen* supra terminum *Betulæ* adscendens, supra *Heminghyt*; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*, ad *Ungsmalö*, ad tractum prædii *Evenæs*, in alpem *Laxetind* supra terminum *Betulæ* adscendens; in *Vesteraalia* ad *Hadselö*; in *Kvæffjord* ad *Vig* & *Vogteren*; in *Salangen* ad jugum humile prope *Övre- & Nedre-Vand*, supra *Lund* convallis *Salangdal*; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*, ad *Finsæt*; in insula *Senjen* ad *Gibbostad*; in *Maalselven* ex. gr. ad radicem alpis *Mauken*; in *Skjervö* ad cacumen jugi inter *Rotsundelv* & *Sörkjosen*, ibi supra terminum *Betulæ*, ad *Kjeldereren* & ad *Vinnelys* convallis *Reisendal*, ad *Sokkelvig*, ad insulas *Skjervö* & *Hukö*; in insula *Seiland* ad *Kvistnæsfjord*; in *Porsangria* intra *Repvaag*; in *Varangria boreali*, unde, ut ex omni *Finmarkia orientali*, locus specialis non prius notatus, ad *Jakobselv*; in *Varangria meridionali* secus fl. *Pasvigelv* ad *Elvenæs*, ad cataractam inter *Klostervand* & *Goalsejavre*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Allenelv* ad *Spjerhojokka*, ad tractum templi *Masi*, juxta fl. *Karasjok* ad alpem *Dafteroavve* prope terminum *Pini*.

235. CYSTOPTERIS MONTANA, Bernh.

Hab. in *Bejeren* supra *Muldjord* & *Solö*; in *Ofoten* ad rupes intra *Evenæs* passim copiose; in *Salangen* ad jugum prope *Övre- & Nedre-Vand*, supra prædium *Lund* convallis *Salangdal*; in *Sör-Reisen* ad *Nordströmmen*, ad *Finsæt*, in alpem *Middagsfjeld* supra terminum *Salicum* majorum adscendens; in *Maalselven* ad radicem alpis *Vasbrönden*, ad *Akka*, ad *Kalvehovedet*, juxta fl. *Beinelv*, ad *Ulleberg* convallis interioris *Dividal* copiosius, in convalli *Bardu* supra *Brandmoen* & *Stormoen* copiose, inde ingrediens usque ad

prædium pæne intimum *Strömsmo*; in *Skjervö* ad *Bergskoven* convallis *Reisendal*; ad partem inferiorem convallium *Altensium* passim; ad *Komagfjord*, ad convallem sinui *Lille-Lærrisfjord* adjacentem, ibi citra promontorium *Nordcap* latit. bor. attingens $70^{\circ} 18-20$ (in *Porsangria* ad *Børselv* trans *Nordcap* latitudine eadem); in *Tanafjord* ad *Lille-Lerpollen*, ibi *Finmarkiæ* orientalis latit. bor. attingens $70^{\circ} 29-30$; in *Varangria* boreali ad *Jakobselv*; præterea prope limitem *Finmarkiæ* continentalis interioris ad *Spjerkojokka*.

236. ASPIDIUM LONCHITES, Sw.

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Solö* & *Muldjord*, ad radicem alpium *Seglfjeld*, ad *Arstadaasen*, ibi terminum *Betulæ* attingens, in alpem *Meraftenklumpen* supra terminum *Betulæ* adscendens, ad latera jugi prope *Heminghyt*; in *Gildeskaal* supra *Indyr*, intra *Skovvold*; in *Ofoten* ad tractum prædii *Evenæs* passim, inter *Lidland* & *Lidlandskaret*, in alpem *Laxetind* 900—1000 ped. supra mare adscendens; in *Kvæfjord* ad tractum prædiorum *Vig* & *Vogteren* passim; in *Salangdal* supra *Lund*; in *Sör-Reisen* supra *Östgaard* convallis *Gumpendal*, ad *Finsat*, in alpem *Middagsfjeld* supra terminum *Betulæ* altius adscendens; in insula *Senjen* interiore ad *Renlidkollen*, prope *Lysbottenvand*; in *Maalselven* ad *Maalsnæs*, ad *Vasbrönden*, ad *Maukdal* copiose, ad radicem alpium *Mauken* supra *Nordmo*, in *Kalvehovedet* c. 1100 ped. supra ripas fluminis adscendens, juxta fl. *Beinelv*, ad radicem alpium *Blaabjerg* convallis *Bardu*; in *Skjervö* ad *Bergskoven* convallis *Reisendal*, ad insulam *Hukö*; in insula *Seiland* in alpem *Hönsebyfjeld* c. 800 ped. supra mare adscendens; in parochia *Hammerfest* ad *Riperfjorddal*; in *Porsangria* ad introitum sinuli *Kulvig*, ad jugum intra *Olderfjord*, intra *Repvaag*; ad *Kjöllefjord* (c. $70^{\circ} 57$); præterea prope limitem *Finmarkiæ* continentalis interioris ad *Spjerkojokka*.

237. PTERIS AQUILINA, L.

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Muldjord* & *Solö*, ad *Arstadaasen*; in *Gildeskaal* supra *Indyr* copiose.

238. STRUTHIOPTERIS GERMANICA, Wild.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Arstadaasen*, supra *Solö* & *Muldjord*, inde usque ad *Heminghyt*, ibi quum ad fundum convallis tum ad latera jugi copiose socialiter nascens; in *Gildeskaal* supra *Indyr*, supra *Dal*; in *Ofoten* ad *Lidland*; in

Kvæfjord ad tractum prædiorum *Vig & Vogteren* macrior, ad *Kvæfjordeidet* parcius; in *Throndenæs* inter *Skaanland & Lysvand*; in *Sör-Reisen* supra *Östgaard* convallis *Gumpendal* copiosius, ad *Finsæt* copiose, ad *Nordstrømmen*, ad *Dybvaaq* parce; in insula *Senjen* interiore ad partem superiorem convallis *Laxelv*, ad *Langhoug* districtus *Græsmyrskoven* non copiose, inter *Tömmerevbakken & Kvanlid* copiosius, ad tractum prædii *Gibbstad* parce & misere evoluta; in *Maalselven* ad partem exterioriorem prope *Renfjeld* elementa filicetorum eximie luxuriantium parciora quam ad tractus interiores, tamen egrediens usque ad radicem alpis *Vasbrönden* mari proximæ, per convallem *Bardu* usque ad *Strömsmo* ingrediens; in *Balsfjord* intra *Storstennæs*; in *Skjervö* ad *Rotsundelv*, ad *Sokkelvig* parce, ad partem mediam convallis *Reisendal* prope *Vinnelys* copiosius, inde ingrediens usque ad *Hurrika & Seima*; præterea ad limitem *Finmarkiæ continentalis* interioris ad *Spjerkojokka*.

238b. CRYPTOGRAMMA CRISPUM, *Bernh.*

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Meraftenklumpen*; in *Ofo-ten* ad *Laxetind*; in *Throndenæs* ad alpes intra *Sandtorv*; in *Sör-Reisen* ad alpes prope *Gumpendal*; ad alpes circum *Tromsödal*; in *Skjervö* ad insulam *Hukö*; in *Alten* ad alpes intra *Talvig*; ad alpes intra sinum *Lille-Lærrisfjord*; in insula *Seiland* ad *Hönsebyfjeld*; in *Porsangria* ad jugum intra *Repvaag*; nec non etiam ad tractus interiores jugi inter *Lerpollen & Nyborg* Varangriæ. Cum cl. amicus *Th. Fries* hanc speciem ut passim occurrentem ad juga alpina totius *Finmarkiæ* (Bot. Not. 1858) designat, notare liceat, eum hoc non scire potuisse, quippe vastissimi tractus jugi alpini tunc a nullo botanico permigrati fuere, qui plantam in interiore indicavit. Revera per majorem partem jugi non vestigium plantæ adhuc quantum constat, observatum est. Etiam *Blytt*, qui sæpius species in *Finmarkia* orientali ultima denuo emergentes v. ibi lectas esse creditas ut per totam *Norvegiam* vulgares sine ullo respectu geographiæ botanicæ exactioris declarat, tamen de hac specie caute & observationibus congruenter loquitur.

238c. BLECHNUM SPICANT, *Retz.*

Hab. quoque in *Gildeskaal* ad radicem jugi prope *Skovvold*.

238d. ASPLENIUM RUTA MURARIA, L.

Hab. rarior planta hujus agri in *Gildeskaal* in fissuris rupium sublittoralium prope *Indyr* & *Dal* frequentius parcius; in *Ofoten* prope *Evenæs* ad rupes præruptas parcissime visa; in *Alten* ad *Storvignæsset* a *Wahlenberg* indicata ab *Th. Fries* & me denuo reperta, quoque ad loca supra mare elevatiora occurrens.

238e. ASPLENIUM TRICHOMANES, L.

Hab., antehac in *Saltdalen* lectum, quoque in *Bejeren* ad *Arstadaasen* parcius.

OPHIOGLOSSEÆ.

239. BOTRYCHIUM LUNARIA, L.

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Troelid*; in *Ofoten* ad *Evenæs*, ad *Ungsmalö*, in alpem *Laxetind* supra terminum *Betulæ* altius adscendens; in *Kvæfjord* ad *Vig* & *Vogteren*; in *Salangen* prope effluvium lacus *Övre-Vand*; in *Sör-Reisen* ad *Nordstrømmen*, ad *Bærkollen*; in insula prædii pastoris *Tranö*; in *Porsangria* ad introitum sinuli *Kulvig*; ad *Lille-Lerpollen* sinus *Tanaffjord*; præterea prope limitem *Finmarkiæ continentalis* interioris ad *Spjerkokjokka* supra mare elevatius.

LYCOPODIACEÆ.

240. LYCOPodium ANNOTINUM, L.

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Solö* & *Muldjord*, supra *Hemingshyt*, ad alpes prope *Arstaddal* supra terminum *Betulæ* adscendens; in *Gildeskaal* supra *Indyr*, supra *Skovvold*; in *Ofoten* ad *Laxetind*; in *Vesteraalia* ad insulam *Hadselö*; in *Sör-Reisen* ad alpes supra *Östgaard* convallis *Gumpendal*, ad *Finsæt*; in insula *Senjen* ad tractum prædii *Gibbstad*; in *Lenvig* inter *Finfjordvand* & *Renvand*; in *Maalselven* ad *Nordmoen*, in alpem *Aglapen* supra terminum *Betulæ* adscendens, ad *Skjæggænes*, ad radices alpium *Istinderne* & cet.; in *Skjervö* ad insulas *Skjervö* & *Hukö*; in *Alten* in alpem *Nalganas* ad terminum *Betulæ* adscendens; in insula *Seiland* ad *Hönsebyffjeld*; in parochia *Hammerfest* ad *Riperfjorddal*; in *Porsangria* ad *Staburselv*, ad *Børselv*; in *Tanaffjord* ad *Store-Lerpollen*; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*; in *Varangria meridionali*, unde prius non citatum, ad tractum prædii *Elvenæs*, ad cataractam inter *Klostervand*

& *Goalsejavre*, inter *Goalsejavre* & *Bossojavre*, juxta flumen ipsum intra lacum *Baggjavre*, nec non latere *Rossico* ad *Store-Menikasö*, prope *Galgoaive*, ad *Savasuolo*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Attenelv* ad *Duogasmoske*, ad jugum in insula lacus *Lappjavre*, inter *Lappjavre* & *Gatkasjdouar*, ad colles prope hospitium lacus *Sjuosjavre*, juxta partem interiorem fluminis *Tanaelv* ad *Storfossen*.

241. LYCOPODIUM CLAVATUM, L.

Hab., semper ut v. *monostachya*, ubi fructiferum visum, quoque in *Bejeren* ad *Meraftenk'umpen*, ad jugum prope *Heminglyt*; in *Ofoten* ad alpem *Laxetind*; in *Vesteraalia* ad insulam *Hadselö*; in *Skjervö* ad *Hurrika* partis interioris convallis *Reisendal*; in *Alten* ad *Gamasvarre* frequentius prope terminum *Betulæ*; in *Porsangria* ad *Börselv*, ibi polo proximum lat. bor. 70° 18—20 attingens; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*, ibi supra terminum *Betulæ* nascens ad montes prope *Vandelv*; in *Laponia Rossica* *Varangriæ* confini ad insulam *Store-Menikasö* prope *Galgoaive*; præterea in *Finmarkia continentali* juxta fl. *Attenelv* ad tractum templi *Masi*, ad jugum inter *Lappjavre* & *Gatkasjdouar*, ad colles prope hospitium lacus *Sjuosjavre*, juxta fl. *Karassjok* ad alpem *Dafteroavve* prope terminum *Pini* copiose.

MARSILEACEÆ.

242b. ISOËTES ECHINOSPORA, Dur.

Hab. nov. civ. Flor. arct. *Norvegiæ* in *Skjervö* ad *Bergskoven* convallis *Reisendal*; in *Varangria meridionali* in flumine *Pasvigelv*, in cujus parte extrema mox postea quoque a *Th. Fries* lecta & publicata, pluribus locis præcipue copiose in lacu *Övre-Klostervand* inter *Menikasö* & *Risto*. Folia sola ad ripas lacus intimi *Baggjavre* impulsa legi. I. lacustrem, quam ex iisdem aquis prius indicavi, non anno 1864 denuo reperi, tamen de determinatione priore nulla causa dubitandi est.

EQVISETACEÆ.

243. EQVISETUM VARIEGATUM, All.

Hab. quoque in *Sör-Reisen* ad *Finsæt*; in *Porsangria* prope *Staburselv*; in *Finmarkia continentali* interiore ad *Duogasmoske*.

243b. EQVISETUM SCIRPOIDES, *Mich.*

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Meraftenklumpen* supra terminum *Betulæ*, ad *Heminghyt*, ibi infra terminum culturæ *Cerealium*; in *Ofoten* ad tractum prædii *Evenæs* prope æqvorum maris; in *Salangdal* supra *Moholtet*; in *Sör-Reisen* in alpem *Middagsfjeld* supra terminum *Salicum* majorum altius adscendens; in *Maalselven* ad *Kalvehovedet*, ad *Langfjeldene* prope *Beinelv*, ad *Istinderne*; in *Skjervö* ad *Bergskoven* convallis *Reisendal*, ad *Hukö*; in *Porsangri* prope *Bævkegoppe*, ad introitum sinuli *Kulvig*, ad *Börselv* copiose; in *Varangria meridionali* prope fl. *Pasvigelv* intra lacum *Baggjavre*. Formam intermediam inter hanc speciem & præcedentem & difficulter definite determinandam pluribus locis offendi, quam ad interim indicare nolui, ne incerta cum certis miscerem.

244. EQVISETUM PRATENSE, *Ehr.*

Hæc species secundum observationes meas vulgaris per majorem partem infraalpinam agri arctici nostri occurrit, quæ de causa non in hoc opusculo recipienda esset, nisi in Flora ultimo edita Blyttii tam omnino prætervisa fuisset, ut ad loca numerosa prius indicata sequentia adjungere debeam: in *Bejeren* ad *Troelid*, prope *Grönvatne* & alibi; in *Ofoten* ad *Lidland*, in alpem *Laxetind* altius supra terminum *Betulæ* adscendens; in *Salangdal* supra *Lund*; in *Sör-Reisen* ad *Nordstrømmen*, ad *Finsæt*, in alpem *Middagsfjeld* supra terminum *Betulæ* adscendens; in insula *Senjen* ad *Renlidkollen*, ad *Kvanaas*, prope *Hegvand* & *Lysbottenvand*; in *Lenvig* inter *Finfjordvand* & *Renvand*; in *Maalselven* per convallem longissimam *Bardu* usque ad prædium pæne intimum *Strömsmo* ingrediens, in alpem *Mauken* 2400—2500 ped. supra ripas fluminis adscendens; in *Skjervö* ad *Rot-sundelv*, ad insulas *Skjervö* & *Hukö*; in parochia *Hammerfest* ad littus occidentale sinus *Riperfjord*, ad *Riperfjorddal*; in *Porsangria* intra *Repvaag*; in *Tanafjord* ad *Store-Lerpollen*; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*; in *Varangria meridionali* juxta fl. *Pasvigelv* ad tractum prædii *Elvenæs*, ad *Gadde-luobal*, ad cataractam inter *Vagetimjavre* & *Baggjavre*, ad flumen ipsum intra hunc, nec non latere *Rossico* ad *Store-Menikäsö*, inter *Gadde-luobal* & *Vagetimjavre*, ad *Galgoaive*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Allenelv* ad *Spjerkokjokka*, ibi in regione *betulina* superiore quoque versans, ad tractum templi *Masi*, ad *Duogasjmoske*, ad jugum in

insula lacus *Lappojavre*, inter *Lappojavre* & *Gætkasjuodar*, prope lacum *Sjuosjavre*, juxta fl. *Karasjok* ad *Beskinjarga*, ad lingvam pagi *Karasjok*, juxta partem interiorem fluminis *Tanaelv* ad *Holmen*, ad *Storfossen*.

245. EQVISETUM HYEMALE, L.

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Muldjord* & *Solö*, ad *Arsadaasen*, prope *Grönvatne* prædii *Næs*; in *Maalselven* ad *Skjeggenæs*, ad *Bjerkeng*, juxta fl. *Beinelv*, ad *Rostanæs* convallis interioris; in *Skjervö* inter *Hurrika* & *Seima* convallis *Reisendal* passim copiosius; nec non in *Varangria boreali* ad *Jakobsetv*.

CELLULARES.

CHARACEÆ *).

1. CHARA HISPIDA, L. (*aspera*, Wild.)

Hab. nov. civ. Flor. arct. Norvegiæ in *Bejeren* (f. incrustata, minor, brachyphylla) in stagno *Grönvatne* ad jugum prope *Heminghyt* in regione betulina elevatiore posito, ibi tam copiose, ut stagnum e distantia quadam visum ab ea & aliis aquaticis colorem eximie virescentem accipiat, cui nomen ejus (*Grönvatne* ɔ: lacus v. stagnum viride) debeatur; nec non in *Ofoten* (f. *pumila*, *tenella*, *micrantha*) in lacunis prope *Kirkevand* intra *Evenæs*, ibi latit. bor. attingens 68° 27—28.

2. CHARA CONTRARIA, A. Br.

Hab. nov. civ. Flor. arct. Norvegiæ in *Bejeren* in stagno *Solövand*; in *Ofoten* prope *Kirkevand*; nec non in *Throne-næs* in lacu prope *Nipen*, ibi latit. bor. attingens c. 68° 35.

3. CHARA FRAGILIS, Desv.

Hab., antehac e *Saltdalen* indicata, quoque in *Bejeren* prope littora maris in stagno *Solövand* nec non in convalle *Maalselven* interiore (f. *longibracteata*) juxta fl. *Beinelv* in lacunis paludosis, ibi latit. bor. attingens 68° 54—55.

4. NITELLA FURCULATA (Rchb.)

Hab., antehac verisimilititer ut *N. opaca* e Finmarkia

*) Omnes formæ huc pertinentes a cl^o O. Nordstedt benigne determinatæ sunt, qui descriptionem speciei novæ unacum icone misit.

orientali indicata, in *Skjervö* (f. longifolia, elongata) in stagno silvæ *Bergskoven* convallis *Reisendal* interioris; in *Porsangria* in lacu fluminis *Staburselv* (f. longifolia, elongata, sed propter specimina imperfecta *non certe* huic speciei referenda) copiosissime luxurians, prata mera pulcherrima ad fundum lacus constituens, dein in flumine *Börselv* (f. brachyphylla, qvoad speciem tamen *dubia*) inter ostium & *Silfavarre* parce, ibi polo proxima latit. bor. 70° 18–20 attingens; præterea in *Finmarkia* continentali interiore in flumine *Allenelv* (f. nidifica) prope *Masi**, in lacu *Lappojavre* (f. nidifica) regionis betulinae superioris, nec non in parte interiore fluminis *Tanaelv* inter *Seglnæs* & inosculationem affluentis *Kara.jok*.

5. NITELLA NORMANIANA, *Nordst.* n. sp.

„(*Tolypella* caudata, monoica). Minima, viridis; apex proembryonis e 3–4 cellulis compositus; verticilli pauci, *omnes fructiferi*, nidifico congesti, e foliis 8–9, ad geniculum infimum segmentis lateralibus simplicibus obtusis, geniculis constrictis; antheridia *sessilia*; sporophyæ *magnæ* coronula brevi obtusa, nucleo subgloboso castaneo prominule 7–8 gytrato. (*N. Bejerensis*, *Norm.* ad int. in litt.)“ — Hab. ad littora maris fundi intimi sinus *Bejerensfjord* Nordlandiæ loco sub accessu æstus inundato, sub recessu emerso. Aqva ibi a superficie inde ad profunditatem qvandam sæpius omnino dulcis, qvippe sinus longissimus & angustissimus cum mari difficilius communicans copiam aqvæ dulcis a fluminibus majoribus ibi effluentibus accipit.

„Minima (circiter 5–15 m. m. longa), tenuior, flexilis, sicca viridis, non ut *T. flexilis* (*L.*) subfusca; annua; apex proembryonis („*Vorkeimsspitze*“ Pringsh.) tri-quadricellularis; verticilli omnes fructiferi, interstinctis ramulis brevibus verticilliferis, capitula minuta formantes, e foliis circiter octonis, 3–5 articulatis, internodio basali abbreviato, ad geniculum infimum segmentis lateralibus 1–4 simplicibus, triquadri-articulatis, sæpe arcuatoinflexis; segmenta foliorum ex articulis elongatis, sensim decreescentibus, apice obtusa, geniculis constrictis; sporophyæ geminatae aggregatae in axillis verticillorum vel ad foliorum geniculo infimo; antheridia sessilia pauca; spo-

*) Hoc nomen erronee „Mellem-Merei“ in Bot. Notis. 1867 a cl^o Nordstedt dictum.

rophyæ coronula brevis, obtusa nucleo oblongo vel subgloboso, castaneo, octogyrato 0,30—0,34 m. m. longo“.

„Ab omnibus speciebus proximis distinguitur defectu verticillorum sterilium v. foliis simplicibus. Communia cum *T. glomerata* & *T. flexili* habet segmenta foliorum apice obtusa, magnitudinem antheridii & sporophyæ. Ab utraque tamen statura gracillima, colore pure viridi, apice proembryonis 3—4 cellulari recedit“.

LICHENES*).

USNEI.

1. USNEA BARBATA (L.) Fr.

Hab., antehac in *Saltdalen* lecta, quoque in *Ofoten* ad *Lavangeidet* intra *Evenæs*, ibi copiosa ad Betulas & Salices, sed tantummodo sterilis visa, nunc erecta usque ad 0,1 met. alta f. *floridæ* (L.) proxima, nunc pendula 0,2—3 met. longa f. *plicatæ* (L.) proxima sed in f. *dasygogentem* tamen vergens. Hoc tractu latit. bor. attingit c. 68° 30'. Longius arctoam versus pygmæe evoluta & parca ut f. *erectiuscula* (*floridæ* proxima) visa est in *Salangdal* ad *Forsæt*, nec non passim rarius in insula *Tromsö*, ibi 0,04 met. longitudine vix superans, latit. bor. c. 69° 40—42 attingens. Præterea eam quoque in *Gildeskaal* Nordlandiæ meridionalis prope *Skovvold* parcam vidi.

2. ALECTORIA OCHROLEUCA (Ehr. Fr.) — CIN- CINNATA, Fr.

Hab. quoque ad *Havösund* Finmarkiæ occidentalis.

3. ALECTORIA NIGRICANS, Ach.

Hab. quoque in *Sör-Reisen* ad alpes prope *Gumpendal* copiose ut alibi.

*) Secundum promissum notulas supplementarias subsequentes Lichenum arctorum Th. Friesii communicare semiinventus debeo. Defectus otii sufficientis tamen impedit hac occasione totam messem nimis largam speciminum lectorum examinare, qua de causa continuationem serius dare opto. Errores non evitandos ab homine, conditionibus studio exactiori minus faustis laborante, in angulo hoc arctico longius quam 100 milliar. a proximis collectionibus publicis & bibliothecis remote habitante, benigne excusatos oro.

4. SIPHULA CERATITES (*Wg.*)

Hab. quoque in *Bejeren* ad jugum prope *Skovvold*; in insula *Hukö*; in *Alten*, ubi frequens, copiose spermogonifera ad *Kongshavnfeld* & alibi.

RAMALINEI.

5. RAMALINA CALICARIS (*L.*) — FARINACEA (*L.*)

Hab. adhuc ad *arbores* quoque in *Ofoten* intra *Eve-næs*; ad rupes in insula *Hadselö* *Vesteraalia*; ad *Havösund* *Finmarkiæ* occidentalis.

6. RAMALINA POLYMORPHA, *Ach.*

Hab. quoque in *Vesteraalia* ad *Hadselö*, ibi quoque ad cacumen jugi supra *Melbo*; in *Sör-Reisen* ad alpes prope *Östgaard* convallis *Gumpendal* supra terminum *Betulæ* alius occurrens; ad *Havösund* *Finmarkiæ* occidentalis.

7. CETRARIA TRISTIS (*Web.*)

Hab., antehac e præfectura *Saltensi* indicata, quoque in *Vesteraalia* ad insulam *Hadselö*, ibi latit. bor. attingens c. 68° 30.

PELTIGEREI.

8. NEPHROMA TOMENTOSUM (*Hofm.*)

Hab. species magis meridionalis hujusce generis quoque in *Ofoten* ad *Lavangeidet*; in *Vesteraalia* ad *Hadselö*; in *Salangdal* prope *Lund*; in *Maalselven* ad *Finsæt* convallis *Bardu* nec non ad prædium *Moen*, ibi latit. bor. attingens 69° 8—9.

9. PELTIGERA POLYDACTYLA, (*Hofm.*)

Hab., antehac e *Saltdalen* a *Sommerfelt* lecta, quoque in insula *Tromsö* (ad *Jordbærhougen*), ibi latit. bor. attingens c. 69° 39.

10. SOLORINA SACCATA, (*L.*) *SPONGIOSA, (*Sm.*)

Hab. quoque in *Bejeren* ad alpes prope *Gumpendal*; in *Gildeskaal* ad prædium *pastoris*, ad *Indyr*; in *Salangen* ad alpes supra *Holtet*; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*; in *Varangria meridionali* prope *Elvenæs* copiose, ad *Bugönæs*

PARMELIEI.

11. STICTA PULMONARIA, (*L.*)

Hab., antehac e *Nordlandia* meridionali indicata, quoque in *Gildeskaal* ad *Skovvold*; in *Ofoten* ad *Lavangeidet* intra

Evenæs (fructificans); in *Maalselven* passim ex. gr. prope *Moen*, ad partem inferiorem convallis *Bardu*; nec non in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Altenelv* ad tractum templi *Masi*, ibi sterilis latit. bor. attingens 69° 30.

12. STICTA LINITA, *Ach.*

Hab. rarior hujusce agri in confiniis Nordlandiæ ad *Nærø*, nec non, ut videtur (f. minor, paullo dubia) in *Vesteraalia* ad *Hadselö*.

13. STICTA AMPLISSIMA (*Scop.*)

Hab., antehac e Nordlandia meridionali indicata, quoque in isthmo *Lavangeidet* intra *Evenæs* (68° 28–30) ad Salices vetustas copiosa, fructifera, usque ad 0,25 met. lata; nec non in *Ibessad* prope fundum sinus *Graffjord*, ibi rupicola (fructificans) latit. bor. attingens 68° 42–45.

14. PARMELIA SAXATILIS (*L.*) — OMPHALODES (*L.*) f. *panniformis*, *Ach.*

Dum forma primaria maxime vulgaris, etiam supra *Polyporos*, thallum Stictarum & cet. occurrens, hæc forma, antehac tantummodo in *Saltdalen* lecta, hab. quoque in *Vesteraalia* ad *Hadselö* littoralis exterioris, ibi latit. bor. attingens c. 68° 30.

15. PARMELIA PHYSODES (*L.*)

Fructificat quoque in *Bejeren* prope *Heminghyt*; in insula *Tromsö* (69° 40).

15b. PARMELIA HYPEROPTA, *Ach.*

Saxicola habitat in *Sör-Reisen* ad *Bakkejord*; in insula *Tromsö* passim parcius, utroque loco ad rupes calcareas.

16. PARMELIA OLIVACEA (*L.*)* EXASPERATA, *Ach.*

Hab., antehac e *Bossekop* tantummodo indicata, quoque in insula *Tromsö* ad Salices copiosa.

* P. PROLIXA, *Ach.*

Hab. in *Gildeskaal* supra scopulos maritimos ad *Indyr*, inter *Dal* & *Oldervig*; ibi quoque v. *fuliginosa*, *Fr.*, nov. forma hujusce agri.

17. PARMELIA CONSPERSA (*Ehr.*)

Hab. lichen in hoc tractu vix frequens quoque ad *Hadselö* littoralis exterioris.

18. PHYSCIA CILIARIS (*L.*) V. SCOPULORUM (*E. Nyl.*)

Hab. territorii vix vulgaris in *Gildeskaal* ad *prædium*

pastoris; in *Kvæfjord* ad *Vig* & *Voyteren*; in *Throndenæs* ad *Seljestad*, ad *Kilseng*, ultimo loco ad rupes a littore ipso remotiusculas.

19. PHYSCIA OBSCURA (Ehr.) V. ULTOTHRIX (Ach.)

Adhuc in *Maalselven* prope *Moën* habitat ad *Populos*, latit. bor. attingens 69° 8—9.

20. XANTHORIA PARIETINA (L.) AUREOLA (Ach.)

In insula *Hadselö* littoralis exterioris saxicola in f. primariam, hoc in agro non lectam, fere omnino abiens.

21. XANTHORIA LYCHNEA (Ach., Nyl.) — PYGMÆA (Bory.)

Hab. in littorali ad *Hadselö*, in *Throndenæs* ad *Harstadhavn*, in insula *Maasö* (71°) & cet. frequentior, quoque ad cacumina elevata alpium altius supra terminum *Betulae* a littore maris remota v. remotissima se. in *Sör-Reisen* ad alpès prope *Gumpendal*, in *Finmarkia* continentali interiore ad cacumen *Luoftsjam* jugi vastissimi *Altensis* inter *Gamasvarre* & *Spjerkojokka* positi, ibi optime fructificans. Occurrit ad ligna fabrefacta frequenter copiose in insula *Tromsö*, corticola ad *Salices* & *Alnos* rara & maxime pygmæa, in *Atten Finmarkiæ* quoque ad basin truncorum *Pini*, sed omnis corticola tantum sterilis visa, tamen vix dubie ad hanc speciem pertinens, cum specimina hydrato kalico, eximio illo adjumento diagnoseos, quo inter alia *Dr. Nylander* scientiam locupletavit, pulcherrime purpurascunt.

LECANOREI.

22. PANNARIA PLUMBEA (Lightf.)

Hab., antehac e „Nordlandia meridionali & insulis Lofodensibus“ indicata, quoque in *Bejeren* ad *Arstaddal* loco supra mare nonnihil elevato (ad *Salicem*); in *Gildeskaal* ad *Skovvold* (ad *Juniperum*); in *Throndenæs* ad *Harstadskaret*, in insula *Rollen* ad *Ibbestad*, ultimis locis rupicola, pænultimo latit. bor. attingens 68° 47.

23. PANNARIA RUBIGINOSA (Thunb.)

Hab. quoque in *Gildeskaal* ad prædium *pastoris*.

24. PANNARIA LEPIDIOTA (Smf.)

Hab. quoque in *Gildeskaal*; ad *Hadselö* *Vesteraaliæ*; in *Throndenæs* ad *Harstadskaret*; in *Maalselven* interiore ad *Iselvmo*; in insula *Tromsö*; nec non in insula *Maasö* (71°).

25. PANNARIA TRIPTOPHYLLA (Ach.)

Hab., antehac e *Saltdalen* indicata, quoque in *Bejeren* prope *Muldjord* (ad Juniperum) & *Solö*; in *Gildeskaal* prope *Skovvold* (quoque ad Populum); in *Vesteraalia* ad *Hadselö*; in *Maalselven* prope mare ad *Maalsnæs*, in interiore ad *Bjerkeng* (ad Betulam), ad *Sörlid* convallis lateralis intimæ *Dividal* (ad Sorbum), ad partem intimam convallis *Bardu* in radice alpium *Rubben* (ad Betulam); nec non in *Finmarkia orientali* ad *Jakobselv* Varangriæ borealis (ad Betulam), ibi latit. bor. attingens 70° 8–9.

26. PANNARIA HYPNORUM (Vahl)* PALEACEA (Fr.)

Hab. forma rarissima, agri arctici nova, mixta c. f. *campestri* & manifeste in eam abiens, in insula *Hadselö* *Vesteraalia* ad *Melbo*, ad *Stokmarknæs*; in *Maalselven* prope *Maalsnæs*, ibi latit. bor. attingens 69° 22. Nostra forma thallo parum evoluto, minute squamuloso, cinereo, scutellis sat parvulis, demum explanatis.

27. PANNARIA LANUGINOSA (Ach.)

Hab. e *Finmarkia orientali* indicata quoque in *Gildeskaal* ad *Indyr*; in *Vesteraalia* ad *Hadselö*; in *Maalselven* ad *Iselvmo*; in insula *Tromsö* & ad *Flöifeld*.

28. MASSALONGIA CARNOSA (Dicks.)

Hab. quoque in *Vesteraalia* ad *Hadselö*; in isthmo *Kvæfjordeidet* prope *Rödmuldheien*.

29. PLACODIUM FULGENS (Sw.) β ALPINUM, Th. Fr.

Hab., ut planta rarior parciore sine ullo loco speciali nominato a *Wahlenberg* indicatum, quoque in *Ofoten* intra *Evenæs*; in *Salangen* ad alpes supra terminum Betulæ prope *Lund* copiosius; in *Sör-Reisen* ad alpem *Middagsfjeld*; in *Maalselven* ad *Akka* (infra terminum Pini), ad alpem *Rostafjeld*.

30. PLACODIUM MELANASPIS (Ach.)

Hab. e paucis locis indicatum quoque in *Ofoten* prope *Evenæs*; in *Varangria boreali* ad fl. *Jakobselv*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta partem intimam fluminis *Karasjok*.

31. PLACODIUM GELIDUM (L.)

Hab. e locis specialibus paucioribus indicatum quoque ex. gr. in *Gildeskaal* ad tractum prædii *Indyr*; in *Vester-*

aalia ad *Hadselö*; in *Kvæfjord* prope *Vig & Vogteren*; in *Sör-Reisen* ad cacumen summum alpium *Middagsfjeld*, ad alpes prope *Gumpendal*, ad *Bakkejord*; in *Maalselven* inter *Sörlid & Frihedslid*; in insula *Tromsö* passim, omnibus locis quum ad æqvorum maris tum ad cacumina alpium tantum sterile repertum, sed ad prædium pastoris *Oure* Norvegiæ mediæ hoc fructiferum vidi prope æqvorum maris.

32. PLACODIUM SAXICOLUM (*Poll.*)

Hab. quoque in *Throndenæs* ad tractum prædii *Harstadhavn* littoralis; in *Salangdal* interiore ad *Forsæt*; in insula *Tromsö*.

33. PLACODIUM STRAMINEUM (*Wg.*)

Hab. quoque in *Vesteraalia* ad *Melbo* insulæ *Hadselö* quum ad littora maris tum inopinate in regione betulina suprema ad cacumen jugi copiose & optime evolutum; in insula *Tromsö* parcius; ad *Havösund*.

34. PLACODIUM ALBESCENS (*Hoffm.*)

Hab., antehac e *Saltdalen* & continente insulæ *Tromsö* adjacente tantum indicatum, quoque in *Gildeskaal* ad *Indyr*; in *Throndenæs* ad tractum prædii *Harstadhavn*; in *Sör-Reisen* ad *Bakkejord*; in *Maalselven* interiore ad *Sörlid* convallis *Dividal*; in insula *Tromsö* passim copiose; nec non in *Finmarkia orientali* ad *Seidafjeld*, ad *Kjöllefjord* (c. 70° 57').

35. ACAROSPORA GLAUCOCARPA (*Wg.*)

Hab. quoque in *Throndenæs* ad *Harstadhavn*; in insula *Tromsö*.

* A. HEPPII, (*Näg.*)

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in insula *Tromsö* ad saxum pratense. Apothecia parvula omnino ut in specimenibus authenticis Heppii, tantum crebriora sæpe confluentia, manifeste, ut mihi videtur, in formam quendam microcarpam *A. glaucocarpæ* abeuntia. Thallus nunc pulveree ochraceus, nunc in minutas verruculas v. squamulas abiens.

36. ACAROSPORA PELISCYPHA (*Wg.*)

Hab. quoque in *Vesteraalia* ad *Hadselö*; in *Throndenæs* ad tractum prædii *Seljestad* passim copiose; nec non in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*.

37. ACAROSPORA (*Anthracea*) TROMSØENSIS, n. sp.

Crusta ochracea, tenuis, parca, rimulosa, v. obsoleta.

Apothecia adnata v. basi innata, sat parvula, tota nigra, rugulosa. *Margo* apothecii crassus, obtusus, apparenter illimitate in discum parvulum impressiusculum v. planum, sæpe medium umbonatum abiens, continuatione (epithallo) epithecii carbonacei disci vestitus, glomerulos gonidiorum frequentium & gonimidia crebra pallidiora elliptica (c. 0,006 m. longa) fovens. *Hymenium* c. 0,15 m. m. altum, superne fuscescens, paraphysibus capillaribus. *Sporæ* numerosæ fere oblongo-bacillares, 0,003—4 m. m. longæ, c. 0,001 m. m. latæ. *Hypothecium* pallidum strato gonimo impositum. *Gelatina* hymenii jodo p. majore parte luteo-rufescens, inferne unacum hypothecio sæpe cærulescens.

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ ad saxa granitica prope oppidum *Tromsö*. Cui placet ut subgenus *Acarosporæ* v. genus proprium considerari potest.

38. ACAROSPORA MOLYBDINA, (Wg.)

Hab. quoque in *Kvæfjord* ad insulam *Kvæö*; in *Sör-Reisen* ad *Bakkejord*; in insula *Tromsö*; ad *Havösund* Finmarkiæ occidentalis; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*.

39. ACAROSPORA CHLOROPHANA, (Wg.)

Hab. quoque in *Throndenæs* ad *Harstadhavn*; in *Sör-Reisen* ad *Bakkejord*; in *Maalselven* prope *Rostavand*, inter *Sörlid* & *Frihedslid*; ad *Flöifjeld* prope *Tromsö*; in *Skjervö* ad insulam *Hukö*; ad *Havösund* Finmarkiæ occidentalis; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*.

40. HÆMATOMMA COCCINEUM (Dicks.)

Hab. f. *porphyria* ejus, antehac e duobus locis Nordlandiæ meridionalis indicata, quoque in *Gildeskaal* ad *Indyr* loco suo copiose, ad *Skovvold*; in *Vesteraalia* ad insulam *Hadselö* prope *Huseby*; in *Throndenæs* ad tractum prædii *Harstadhavn*; nec non in insula *Tromsö* prope *Sandnæs* parcissime visa, ibi latit. bor. 69° 40—42 attingens.

41. LECANORA TARTAREA (L.) — TELEPHOROIDES, Th. Fr.

Hab. ad rupes in *Salangdal* prope *Krogen*; in *Sör-Reisen* ad *Gumpendal*; in insula *Tromsö*; in *Alten* ad jugum *Borras*; nec non ad *Betulas* luxurians, lichenem fruticulosum fere simulans in *Alten* ad *Storelvdal*. Transitus omnes inter formam primariam & hanc varietatem monstrosam observare licet.

42. LECANORA PALLESCENS (L.)

Hab. f. *corticola*, antehac tantummodo e *Saltdalen* indicata, quoque (sæpius ad Salices) in *Bejeren* prope *Muldjord*, ibi quoque ad Pinum, ad *Heminghyt*; in *Gildeskaal* ad *Skovvold*, ad *prædium pastoris*, ad *Indyr* (ad Juniperum); in tractu littorali exteriore ad *Hadselö* Vesteraaliæ (ad *Betulam*); in *Salangdal* prope *Lund*; in convalle *Maalselven*, præcipue interiore, passim copiose ex. gr. ad *Moen* (ad *Alnum*), ad *Bakkehoug*, ad *Skjeggens*, ibi interdum majores plagas truncorum occupans, ad partem intimam convallis lateralis *Dividal*; in insula *Tromsö* (ad *Betulam* & *Salicem*) rarius & parcius, ad radicem alpium *Flöifjeld* (ad *Alnum*), locis ultimis latit. bor. attingens c. 69° 40.

43. LECANORA OCULATA (Dicks.)

Hab. lichen per plures tractus frequentior, ut videtur, quoque in *Bejeren* ad *Troaa*; in insula *Hadselö* Vesteraaliæ in *Throndenæs* ad *Seljestad*, ad *Harstadskaret*; in *Sör-Reisen* ad alpes prope *Gumpendal*; in *Maalselven* ad *Bjerkeng*, ad *Istinderne*; in insula *Tromsö*, ibi quoque saxicola, & ad *Flöifjeld*; in *Skjervö* ad jugum inter *Rotsundelv* & *Sörkjosen* copiosus & abunde fructificans; in insula *Seiland*; ad jugum prope *Lille-Lerpollen* sinus *Tanen* copiosissimus & optime fructifer.

44. LECANORA SUBFUSCA (Ach.) — HYPNORUM (Wulf.)

Hab. lichen, per plures tractus passim frequentior, rarius copiosus, quoque in *Salangdal* supra *Holtet*; in *Maalselven* ad *Aglapen*; in *Balsfjord* ad *Myre*; prope *Tromsö* ad *Flöifjeld*; in insula *Maasö* (71°); in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*; nec non in *Varangria meridionali* ad *Bugönæs*.

45. LECANORA ARGOPHOLIS (Wg.)

Hab. quoque in *Maalselven* inter *Sörlid* & *Frihedslid* convallis *Dividal*; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv* prope ostium rivi *Vandelv*.

46. LECANORA (Biatora) REAGENS, n. sp.

Lichen musci v. rupicolus *Lecanoræ epanoræ* valde similis. *Apothecia* (non bene evoluta visa, nec sporigera, mox sorediifera) juvenilia faciei lecanorinæ, disco concavissimo, margine obtuso crasso, mox destructo. Differt ab illa granulis thalli magis sparsis, ante eruptionem lepræ pallidius ochroleneis, post eam albescentibus, præcipue tamen eo, ut hydrato kalico saturatius fuscofulvescat, dum *L. epanora* &

subsimilis *Biatora lucida* non tinguntur (*Placodium fulgens-alpinum*, cum cujus thallo juvenilia granula quondam similitudinem habent, violacee purpurascit).

Hab. in *Varangria boreali* ad *Jakobselv* copiosius sed rarius & imperfecte fructificans. Quoque ad alpes Gudbrandsdalæ Norvegiæ meridionalis eam legi.

47. LECANORA POLIOPHÆA (*Wg.*)

Hab. quoque in insula *Tromsö* copiose; ad *Havösund* Finmarkiæ occidentalis.

48. CALOPLACA FERRUGINEA (*Huds.*)

Hab. *f. primaria corticola*, antehac tantummodo e *Saltdalen* indicata, quoque in *Maalselven* prope *Moen*; nec non in insula *Tromsö* passim parcius ad *Salices*.

49. RINODINA MILVINA, (*Wg.*)

Hab. quoque in insula *Tromsö*.

50. RINODINA LEPROSA, *Mass. Körb.* *MALANGICA.

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ ad *Moen* convallis *Maalselven* supra linguam truncorum *Alni*.

Similis *R. leprosa*, qualem cl. *Körber* e *Silesia* communicavit, magis recedens a formis, quas beati *Hepp* & *Masalongo* distribuere. *Crusta* latius expansa, superficie leprosa, nunc obscure viridolivacea, nunc nigra. *Scutella* planiuscula, fusconigra, margine persistente, paulo pallidiore. Differt a speciminibus meridionalibus sporis duplo minoribus (0,009—10 mm. longis), angustioribus nec non paraphysis arctius conglutinatis.

51. ASPICILIA VERRUCOSA, (*Ach.*)

Hab., thallo nunc niveo nunc cinereo v. plumbeo varians, quoque in *Gildeskaal* prope *Indyr* ad æqvorum maris; in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*; in *Throndenæs* ad *Seljestad*; in *Sör-Reisen* ad alpem *Middagsfjeld*; in *Salangdal* ad alpes prope *Holtet*; in insula *Senjen* prope *Gibbostad*; in *Maalselven* ad *Aglapen*, ad *Rostafjeld* convallis interioris; nec non in *Varangria meridionali* ad *Bugönæs*.

52. ASPICILIA CALCAREA, (*L.*) β . CONTORTA,

Ach.

Hab., antehac e *Saltdalen* & *Mortensnæs* indicata, quoque in *Gildeskaal* ad *Indyr*; in *Throndenæs* ad tractum prædii *Harstadhavn*.

53. ASPICILIA PELOBOTRYA, (Wg.)

Hab., antehac e *Rastegaise* & *Saltdalen* indicata, quoque ad rupes micaceo-schistosas in *Gildeskaal* prope *prædium pastoris*; ad *Flöifjeld* prope *Tromsö*. Adest forma huic sat similis, tamen disco & thallo pallidioribus, hydrato kalico persistenter lutescens, quæ *L. subfusca* adnumeranda videtur.

54. ASPICILIA CINEREA, (L.) — ALPINA, (Smf.?)

Forma *v. alpina* *A. cinereo-rufescentis* omnino analoga, ab ea reactione kalica distincta, occurrit ex. gr. ad *Havö-sund* Finmarkiæ occidentalis.

55. ASPICILIA SVAVEOLENS, (Ach.)

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in *Varangria boreali* Finmarkiæ orientalis ad *Jakobselv* prope ostium rivi *Vandelv*.

56. ASPICILIA PREVOSTII, (Fr.)

Hab. nov. civ. Flor. arct. Norvegiæ in *Gildeskaal* copiose ad *Indyr*, ad *prædium pastoris*; nec non in *Throndenæs* minus copiose ad *Harstadhavn*, ibi latit. bor. attingens 68° 48—49.

57. ASPICILIA LACUSTRIS, (With.)

Hab. quoque in *Sör-Reisen* ad *Finsæt*; in *Maalselven* inter *Sörlid* & *Frihedslid* convallis Dividal.

58. GYALECTA FOVEOLARIS, Ach.

Hab. quoque in *Gildeskaal* ad *Indyr* copiose; in *Ofoten* ad *Ungsmalö*; in *Salangdal* ad alpes prope *Lund* supra terminum *Betulæ*; ad *Flöifjeld* prope *Tromsö*.

59. GYALECTA GEOICA, (Wg.)

Hab. quoque in *Throndenæs* ad *Harstadhavn*; in *Ofoten* ad *Ungsmalö*; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv* prope ostium rivi *Vandelv*.

GYALECTA CUPULARIS, (Ehr.)

Hab., antehac tantummodo e *Saltdalen* a *Sommerfelt* indicata, quoque in *Bejeren* prope *Solövand*; in *Gildeskaal* ad tractum prædii *Indyr* copiosius quam alibi visa; in *Ofoten* prope *Evenæs*; in *Throndenæs* ad *Harstadskaret*; in *Salangdal* prope *Kroyen*; in *Maalselven* interiore ad *Iselvmo*; in insula *Tromsö* parce, ad alpem *Flöifjeld*; nec non in *Alten* ad *Kongshavnfjeld*, ibi latit. bor. fere 70° attingens.

60. GYALECTA CORTICOLA, Lönr.

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ Scandinaviæ in insula *Tromsö* ad *Alnum* vetustam partim cortice denudatam & pu-

trescentem, ibi, Hysteriorum socia, latit. bor. attingens 67° 38—39.

61. URCEOLARIA SCRUPOSA, (L.) — GYPSACEA, (Ach.)

Hab. f. rarior hujusce agri in *Bejeren* ad *Indyr*.

CLADONIEI.

62. PILOPHORON ROBUSTUM, *Th. Fr.*

Hab. rarius hujusce agri quoque in *Maalselven* ad radicem alpium *Istinderne* parcius, tamen fructificans.

63. PILOPHORON FIBULA, *Tuck.*

Hab. nov. civ. Flor. arct. Norvegicæ in *Bejeren* ad cataractam rivi *Tullaaen* (c. 66°); in *Maalselven* ad *Traangen* convallis *Dividal*, nec non ad *Bardufossen*, ibi latit. bor. attingens c. 68° 60. Quæ omnia loca sunt angusticæ rupium a flumine rapido v. cataractam efficiente perfluxæ.

64. CLADONIA FIMBRIATA, (*Hoffm.*) f. DENTICULATA, *Flk.*

Hab. quoque in *Vesteraalia* ad *Hadselö*, nec non (minus typica) in insula *Tromsö*, ibi jam a *Vahl* lecta latit. bor. attingens c. 69° 40.

65. CLADONIA PYXIDATA, (L.) * EPIPHYLLA, *Ach.*

Hab. nov. forma hujusce agri (fere = Exs. Hepp L. E. 544, foliis tamen firmioribus) in insula *Tromsö*, ibi latit. bor. attingens c. 69° 40.

*CL. CARIOSIA (*Ach.*) V. PRUNIFORMIS.

Forma a primaria recedens podetiis abbreviatis fere nullis, apotheciis symphycarpeis vulgo cæsiopruinosi hab. in *Kvæfjord* ad *Vig & Vogteren*.

66. CLADONIA FLÖRKEANA, *Fr.*

Hab., antehac in Nordlandia meridionali rarius lecta, quoque in tractu littorali exteriori ad *Hadselö* *Vesteraaliae*, ibi latit. bor. attingens 68° 30. Hydrato kalico non tingitur.

67. CLADONIA DIGITATA (L.)

Optime fructificans hab. quoque in *Salangen* ad *Krogen*; in *Maalselven* passim ex. gr. ad *Tagelvdal*, ad *Moën*, ibi latit. bor. attingens c. 69° 8—9.

68. CLADONIA DELICATA, *Flk.* SUBSQVAMOSA, *Nyl.*

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ Norvegicæ in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*.

69. CLADONIA ECMOCYNA, *Ach.*

Hab. quoque in Norvegia arctica ex. gr. in *Bejeren* ad alpes prope *Arstaddal*.

UMBILICARIEI.

70. GYROPHORA ANTHRACINA (*Wulf.*)

Hab. versimiliter rarior, antehac tantummodo e *Salt-dalen* & *Varangria* meridionali indicata, quoque in *Sör-Reisen* ad alpes prope *Gumpendal*; in *Maalselven* ad *Istinderne*, utroque loco supra terminum *Betulæ* nascens copiose.

71. GYROPHORA SPODOCHROA (*Hoffm.*) — DE-PRESSA, *Schrad.*

Hab., antehac e *Salt-dalen* & *Lofoten* indicata, quoque in *Throndenæs* ad *Harstad*; in *Sör-Reisen* ad *Bakkejord*, ibi latit. bor. attingens c. 69° 8—10.

72. GYROPHORA VELLEA (*L.*) *Ach.*

Hab. quoque in *Salangdal* ad *Forsæt* (diametro usque ad 0,11 met. menso); in *Maalselven* ad radicem alpium *Istinderne*, inde specimen fructiferum diametro tantum c. 0,03 met. menso, sporis 0,006—7 rarius 0,009 m. m. longis; præterea in *Varangria boreali* ad *Jakobselv* luxurians, sterilis ut alibi.

73. GYROPHORA HIRSUTA (*Ach.*) *Fr.*

Hab., antehac e duobus locis indicata, quoque in *Gildedskaal* ad *Skovvold*, ibi specimen fructiferum lectum, 0,01—2 met. diametro, apotheciis planiusculis quidem, tamen gyrosis & tenuiter marginatis, sporis 0,010—18 (vulgo 0,015—16) m. m. longis (sec. *Nyl. L. Sc.* p. 115 0,010—11 m. m.). *For-sitan* speciei dubiæ.

LECIDEINEI.

74. PSORA OSTREATA (*Hoffm.*) β MYRMECINA (*Ach.*)

Hab. forma primaria, cujus specialia loca, quantum scio, non indicata sunt, quoque in convalle *Maalselven* ad *Tagelvdal*; in *Porsangria* prope *Laxevandene*, ibi latit. bor. attingens 69° 50—70°. Varietas occurrit in *Maalselven* ad *Blaabjerg* convallis *Bardu*, ad *Tagelvdal*; nec non in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Karasjok* ex. gr. ad *Haldivuovde*, ad *Skaida*, juxta fl. *Anarjok* ad *Vassivuovde*. In *Maalselven* hæc quoque ad non carbonisatas *Pinos* observata est; itaque vix tantummodo e loco habitandi oritur.

75. PSORA RUBIFORMIS (*Wg.*)

Hab. rarior, ut videtur, quoque in *Maalselven* ad radicem alpium *Istinderne* (recedens & sterilis, forsitan dubia); in *Tanen* ad *Seida*; in *Varangria boreali* prope *Jakobselv* ad radicem alpiis *Flintenæsen*, nec non in *Finmarkia continentali* interiore ad partem interiorem fluminis *Tanaelv*.

76. PSORA LURIDA (*Sw.*)

Hab., antehac e *Saltdalen* indicata, quoque in *Gildeskaal* ad rupes sublittorales prope *Indyr* copiosissime; in *Ofoten* intra *Evenæs*; in *Maalselven* ad *Rostaffjeld* supra terminum *Betulæ*; in insula *Tromsö*; ad *Flöifjeld*; nec non in *Alten* ad *Storvignæs*, ibi latit. bor. 70° appropinquans.

77. PSORA ATRORUFA (*Dicks.*)

Lichen frequens per magnam partem agri ascendit quoque in cacumina alpium altius supra terminum *Betulæ* ex. gr. ad *Laxetind* sinus *Ofoten*, ibi sociæ *Ranunculi glacialis*.

78. PSORA DECIPIENS (*Ehr.*)

Hab. quum ad rupes littorales sc. in *Gildeskaal* ad *Indyr* copiose; in *Throndenæs* ad *Harstadhavn*; tum ad cacumina alpium & littoralium & continentalium sc. in *Bejeren* ad *Meraftenklumpen*; in *Sör-Reisen* ad *Middagsfjeld*; in *Maalselven* ad *Istinderne*, ad *Rostaffjeld* (fructificans in summo cacumine); nec non ad alpem *Flöifjeld* prope *Tromsö*.

79. TONINIA SQUALIDA (*Ach.*)

Hab. quoque in insula *Tromsö*.

80. TONINIA FUSISPORÆ (*Hepp.*)

Hab. nov. civ. Flor. arct. Norveg. in *Bejeren* prope *Solövand*.

81. THALLOIDIMA CANDIDUM (*Web.*)

Hab. quoque in *Bejeren* ad jugum supra *Heminghyt*; in *Salangdal* prope *Krogen*; in *Maalselven* ad *Rostaffjeld*, ad *Blaabjerg* convallis *Bardu*.

82. THALLOIDIMA VESICULARE (*Hoffm.*)

Hab. e specialibus locis paucis prius indicatum quoque in *Gildeskaal* ad tractum prædii *Indyr*, ad *Olderrig*; in *Throndenæs* ad *Harstadhavn*, ad *Lille-Skaanland*; in *Salangdal* ad *Krogen*; in *Maalselven* interiore ad *Rostaffjeld*; in insula *Tromsö*, ad *Flöifjeld*; in *Varangria meridionali* ad *Bugönæs*.

83. THALLOIDIMA RIMULOSUM, *Th. Fr.*

Hab., antehac e *Jarfjordbotten* *Varangriæ meridionalis*

indicatum, quoque in *Gildeskaal* ad rupes calcareas prope *Indyr*; nec non in *Salangen* ad angustias prope lacus *Övre- & Nedrevand*.

84. BÆOMYCES ROSEUS, *Pers.*

Hab., antehac e paucis locis indicatus, quoque in *Bejeren* ad *Meraftenklumpen*; in *Gildeskaal* ad *Skorvold*, ad *Indyr*; in *Sör-Reisen* ad *Middagsfjeld*, ad alpes prope *Gumpendal*; in *Maalselven* ad latera alpium *Istinderne*; ad alpem *Flöifjeld* prope *Tromsö*; in insula *Hukö* (71°) littoralis exterioris; in insula *Seiland* ad radicem alpium *Hönsebyfjeld*, ibi latit. bor. attingens 70° 30—31; in Tanen ad *Algasvarre*, unde jam a *Th. Fries* indicatus; nec non in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Tanaelv* prope *Storfossen* quum latere *Norvegico* tum *Fennico*. Locis ultimis optime fructificans, alibi tantum initiis imperfectis apotheciorum lectus.

85. SPHYRIDIDIUM PLACOPHYLLUM (*Wg.*)

Hab. ex. gr. quoque in *Gildeskaal* inter *Dal* & *Indyr*; in *Maalselven* ad *Rostafjeld*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Karasjøk* ex. gr. ad *Assebakte*, ubi quoque male fructificans.

86. HELOCARPON CRASSIPES, *Th. Fr.*

Hab., antehac e *Finmarkia* orientali indicatum, quoque in *Bejeren* Nordlandiæ ad cataractam rivi *Tullaaen*; nec non juxta fl. *Tanaelv* ad *Seida*.

In speciminibus Nordlandicis apothecia graciliora, crusta pure cinerea nec in rufum paullo vergens ut sæpe in lichene *Finmarkiæ* orientalis.

87. BACIDIA RUBELLA (*Ehr.*)

Hab., antehac ut rarissima e *Saltdalen* indicata, quoque in *Maalselven* ad *Salices* prope *Moen*, ibi latit. bor. attingens 69° 8—9. In his speciminibus, quorum thallus obsoletus, sporæ tantum 0,024—30 m. m. longæ.

88. BACIDIA PHACODES, *Körb.*

Hab. nov. civ. Floræ arcticæ in insula *Tromsö* ad lignum putrescens, ibi latit. bor. attingens 69° 38—43.

Recedit arctica *viridior*: thallo crassiore, granuloso, viridi, quali in *B. rosella*, a qua tamen figurazione apotheciorum præcipue juveniliū, colore disci exteriori & interiore, sporis multo gracilioribus (adhuc gracilioribus in arctica quam in australiore, sc. 0,025—30 m. m. longis, c. 0,001 m. m. latis)

distingvitur. Paraphyses totæ fere omnino hyalinae, apice vix sensibilibiter coloratæ, conglutinatæ. Gelatina hymenii jodo levius cærulescens quam in australiore, demum, ut in hac, violacee fuscescens. Hydrato kalico apothecia non tinguntur, dum ea B. rubellæ præcipue juniora ad marginem ægre sensibilibiter lutescunt.

89. BACIDIA ATROGRISEA (*Deb.*) *Th. Fr. L.*
a. p. 180.

Hab. sp. rarior, ut videtur, hujusce agri quoque in *Throndenæs* ad *Harstadskaret*, ad *Harstadhavn*; in *Maalselven* ad *Maalsnæs*, hisce locis ad terram supra muscos. Apothecia vulgo demum angulosa, margine in eodem specimine nunc nudo nunc cæsi pruinoso (ut in f. irrorata, *Th. Fr.*); crusta semper tenuis nec conglomerato-verrucosa.

90. BACIDIA INUNDATA (*Fr. Stzb.*)

Hab. nov. civis Floræ arcticæ in insula *Rollen* Nordlandiæ ad rupes prope *Havnvig* (si non in *Bejeren*, quod non credo; scheda perdita!), ibi latit. bor. attingens c. 68° 47'.

Crusta cineree viridis. Discus apothecii nunc sordidule carneus, nunc nigricans; margo sæpius disco multo dilutior. Sporæ rectæ, 0,024—33 m. m. longæ, c. 0,002 m. m. latæ.

91. BACIDIA SP.

Hab. nov. civ. Flor. articæ, thallo hypophloeode, alnicola, ob specimina minus evoluta non definite determinanda in *Maalselven* interiore prope *Övergaard*.

92. BACIDIA VIRIDESCENS, *Mass.*

Hab. nov. civ. Flor. articæ Norvegiæ in *Bejeren* prope *Solövand*. Specimen recedit margine apothecii minus elevato, sporis tantum 0,021—30 m. m. longis.

93. BILIMBIA SPHEROIDES (*Dicks.*)

Hab. quoque in *Vesteraalia* ad *Hadselö*; in isthmo *Kvæfjordeidet*; in *Throndenæs* ad *Harstadskaret*; in *Maalselven* ad *Maalsnæs*, ad *Iselmo*, ad *Övergaard* convallis interioris; in *Varangria meridionali* ad *Bugönæs*.

94. BILIMBIA OBSCURATA (*Smf.*)

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Solövand*; in *Kvæfjord* ad *Kvæfjordeidet*; in *Throndenæs* ad *Harstadhavn*, in *Maalselven* ad *Iselmo*; in insula *Tromsö*.

95. BILIMBIA SYNCOMISTA (*Flk.*)

Hab. quoque in *Bejeren* prope *Solövand*, ad alpem

Meraftenklumpen supra terminum *Betulae* (non sporigera visa); in *Gildeskaal* ad *Indyr*; in *Ofoten* ad *Evenæs*, ad *Ungsmalö*; in *Throndenæs* ad *Narstadhavn*; in *Sa-langdal* ad *Krogen*, ad alpes prope *Holtet* supra terminum *Betulae*; in *Sör-Reisen* ad *Middagsfjeld*; in *Maalselven* ad *Sandnæs*, ad alpem *Aglapen*, ad *Rostaffeld*; prope *Tromsö* ad *Flöifjeld*; in insula *Maasö* (71°); in *Varangria meridionali* ad *Bugönæs*. In insula *Tromsö* quoque saxicola ad rupes calceareas dissolutas. Forma *diluta*: apotheciis pallidis, fuscidule testaceis, hymenio toto subhyalino occurrit ad *Bugönæs* *Varangriæ* meridionalis.

BIATORINA DILUTA (*Pers.*)

Hab. rarissima, antehac e *Jarfjordbotten* *Finmarkiæ* orientalis indicata, quoque prope *Tromsø* ad alpem *Flöifjeld*.

96. BIATORINA NIVALIS (*Körb.*)

Hab. rarus, ut videtur, lichen quoque in *Vesteraalia* ad *Hadselö* prope *Stokmarknæs*. Sporæ mei speciminis paullo minores quam a *Th. Fries* L. arct. p. 186 afferuntur, sc. 0,024—28 m. m. longæ, 0,004—5 m. m. latæ. Gelatina jodo cærulescit quum hymenii tum hypothecii (passim levius). Hydrato kalico apothecia tinguntur atro-purpuree, thallus roseo-purpuree.

97. BIATORINA CUMULATA (*Smt.*)

Hab. lichen, ut videtur, per magnam partem agri frequentior, quoque ex. gr. in *Alten* prope *Bossekop*, ad jugum *Borras*; ad *Havösund*; ad *Jakobselv*, ad *Seidaffeld* *Varangriæ* borealis; ad *Lille-Lerpollen* sinus *Tanafjord*.

98. BIATORINA STEREOCAULORUM, *Th. Fr.*

Hab., antehac ex alpibus *Lebesbyensibus* *Finmarkiæ* orientalis indicata, quoque in *Sör-Reisen* *Nordlandiæ* ad alpes prope *Gumpendal*, parcius supra terminum *Betulae* visa.

99. BIATORA DECOLORANS (*Hoffm.*)

Hab. frequentior & passim copiosa quoque in *Maalselven* ad partem exteriorem convallis *Bardu*; in insula *Tromsö* & ad alpem *Flöifjeld*; in *Alten* passim copiose; in *Varangria meridionali* ad *Elvenæs*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Karasjok* ad *Assebakte*, juxta fl. *Tanaelv* ad *Storfossen*.

100. BIATORA COARCTATA (*Ach.*)

Hab., antehac e *Saltdalen* & *Bodø* indicata, quoque longius arctoam versus in *Vesteraalia* ad *Hadselö* (supra

Melbo); in *Throndenæs* ad tractum prædii *Harstadhavn* passim; in *Salangdal* ad *Krogen*; in insula *Tromsö* frequenter, ad alpem *Flöifjeld*, locis ultimis latit. bor. attingens 69° 38—42.

101. BIATORA WALROTHII (*Spreng*)

Hab. nov. civ. Floræ arcticæ prope *Tromsö* ad alpem *Flöifjeld*, in vicinia termini Betulæ parce visa. Recedit margine apothecii thallino farinoso.

102. BIATORA CINNABARINA (*Smf.*)

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Muldjord* non copiose; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv* copiose, ibi quoque ad corticem & lignum Betulæ. In alpibus inter *Vaage* & *Gausdal* Norvegiæ meridionalis frequens est ad Juniperos supra terminum Betulæ, ibi pulcherrima abunde fructificans.

103. BIATORA RUPESTRIS (*Scop*)

Hab., antehac in *Saltdalen* a *Sommerfelt* lecta, quoque in *Gildeskaal* ad *Indyr*, ad *Oldervig*; in *Vesteraalia* ad *Hadselö* (*Melbo*); in *Throndenæs* ad tractum prædii *Harstadhavn*; in insula *Tromsö* passim, ad alpem *Fjöifjeld* in vicinia termini Betulæ. Sporæ sæpius quoque bene evolutæ c. 0,010 m. m. longæ.

* B. INCRUSTANS (*D. C.*)

Hab. nov. forma Floræ arcticæ in *Gildeskaal* ad prædium pastoris, ibi, ut videtur, in primariam *B. rupestris* omnino abiens.

104. BIATORA SIEBENHAARIANA, *Körb.*

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in *Gildeskaal* ad prædium pastoris; in *Salangdal* ad alpes supra *Holtet* (f. dubia, forsitan *B. rupestris*), ibi terminum Betulæ superans; nec non in *Varangria boreali* ad *Jakobselv* (*Flintenæsen*), ibi latit. bor. attingens 70° 8—9.

105. BIATORA VERNALIS (*L.*)

Hab., per majorem partem agri frequentior, ut videtur, quoque in *Bejeren* ad *Troaa*; in *Gildeskaal* ad *Indyr*; in *Vesteraalia* ad *Hadselö* (*Melbo*, *Stokmarknæs*); in *Throndenæs* ad tractum prædii *Seljestad*, ad *Lille-Skaanland*; in *Maalselven* ad *Maalsnæs*, ad *Istinderne*, ad *Rubben* convallis *Bardu* intimæ, ad *Iselemo*; in insula *Tromsö* & ad alpem *Flöifjeld*; in *Alten* ad *Bossekop*; prope oppidum *Hammerfest*; ad *Kjöllefjord* (c. 70° 57'); nec non juxta fl. *Tanaelv* interius prope *Storfossen*.

106. BIATORA SYLVANA, *Körb.*

Hab. nov. civ. Flor. arct. Norvegiæ ad Salices in insula *Tromsö* copiose, ad *Flöifjeld*, ibi latit. bor. attingens 69° 38—43. Omnino qvale ex. Hepp. L. E. 487.

107. BIATORA CUPREA (*Smf.*)

Hab., ad magnam partem alpium frequentior, qvoque ex. gr. in *Bejeren* ad *Meraftenklumpen*, ad *Troaa*; in *Sa-langdal* ad alpes supra *Holtet*; in *Sör-Reisen* ad *Middagsfjeld*, ad alpes prope *Gumpendal*; in *Maalselven* ad *Istinderne*, ad jugum vastum inter *Bangen* convallis *Bardu* & *Kjeleldal* passim copiose; ad alpes circum *Tromsödal* passim copiose; ad alpes prope *Talvig* copiose.

108. BIATORA MISCELLA (*Ach.*) *Fr.*

Hab. qvoque ex. gr. in *Bejeren* supra *Heminglyt*; in *Throndenæs* ad *Seljestad*; in insula *Tromsö*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore secus fl. *Tanaelv* ad alpem *Rastegaise*, ad partem superiorem fluminis *Karasjok*, ad *Bavdojavre*.

109. BIATORA CASTANEA, *Hepp.*

Hab., antehac in Finmarkia orientali a *Th. Fries* lecta, qvoque ad latera jugi *Thomasjordaasen* prope *Tromsö*.

110. BIATORA OBSCURELLA (*Smf.*)

Hab., antehac e *Saltdalen* & *Alten* indicata, qvoque in *Maalselven* ad *Elvskiftningen*.

111. BIATORA TENEBRICOSEA (*Ach.*, *Nyl.*)

Hab. nov. forma Floræ arct. Norvegiæ (fere omnino similis exs. Anzi Ven. 27) in *Maalselven* prope *Bakkehoug* & *Nordmoen* ad truncos *Alni* pubescentis. Sporæ elliptico-oblongæ 0,012—15 m. m. longæ, 0,003—4 m. m. latæ; paraphyses validiores unacum hypothecio saturatius fuscidulo-rufescentes quam in specimine *Anziano* (*B. alnicola*.)

* *B. ERYTHRYPHÆA* (*Flk.*) (?)

Hab. rarior qvoque in insula *Tromsö* ad Salices. Cl. *Th. Fries* eam determinavit. In speciminibus meis sporæ latiores (usque ad 0,006 m. m. latæ) & paraphyses gelatinose conglutinatæ validiores quam in primaria.

112. BIATORA FUSCESCENS (*Smf.*)

Hab. lichen verisimiliter sat frequens qvoque in *Vester-aalia* ad *Hadselö*; in *Maalselven* prope mare ad *Maalsnæs* (qvoque ad *Juniperum*), ad partem intimam convallis *Bardu* (*Rubben*); in insula *Tromsö* frequenter copiose, ad alpem *Flöifjeld* (qvoque ad *Salicem*); in *Alten* ad *Eibyldal* (qvoque

ad *Salicem* & ad *Alnum*); in *Tanaafjord* ad *Store-Lerpollen* (quoque ad *Salicem*); nec non in *Varangria meridionali* juxta fl. *Pasvigelv*.

113. BIATORA TORNØENSIS, *Nyl.*

Hab., antehac e Tanen & Bossekop a *Th. Fries* indicata, quoque in *Bejeren* prope *Solövand* (ad *Juniperum*); in *Maalselven* ad *Moen*; in insula *Tromsö*; ultimis locis ad *Betulam*; nec non in *Varangria boreali* ad *Jakobselv* (ad *Juniperum*).

Sæpe ecrustacea v. in crusta aliorum lichenum nascens, tamen interdum thallo proprio & insigni quoque gaudet. Est hypophloeodes, macula tenuiter papulosa notata, cujus color proprie rufo-fuscus semel visus non fallet, similis apotheciis ejusdem v. thallo *Pyrenopsisidis hæmaleæ*, tantum utroque multo pallidior. In papulis crustæ demum confluentibus gonidia copiosa. Non omnes sporæ limbatae.

114. BIATORA ULIGINOSA (*Schrad.*)

Hab. quoque ex. gr. in *Hadselö* Vesteraaliæ prope *Stokmarknæs*; in *Throndenæs* ad tractum prædii *Harstadvavn*; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore ad *Storfossen* fluminis *Tanaelv*, ad *Bavdojavre*.

115. BIATORA TURFOSA (*Mass.*) * VERRUCULA.

Crusta tenuissima late expansa substratum vernicee obducens, cinerea v. nigricans, v. obsoleta, humectata obscurior, gelatinosa, passim rugulosa. *Apothecia* crebra, sessilia, ab initio convexa & omnino immarginata, 0,3 m. m. v. ultra lata, nigra, e lenticulari-turbinato globosa, demum rugulosa, difformia, sæpe confluentia. *Paraphyses* non distinctæ, in texturam fibrosam v. grumulosam, fuscidulam, fasciatim & ad epithecium fuscum coalitæ. *Sporæ* (rarius occurrentes) elliptico-oblongæ, fuscidulo-hyalinæ, 0,010—18 m. m. longæ, 0,003—5 m. m. latæ. *Hypothecium* saturate fuscum. *Gelatina* hymenialis jodo (interdum violacee) cærulescens.

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ copiose in *Bejeren* ad jugum supra *Heminglyt*, ibi plagas majores locorum turfosorum suo tempore inundatorum vestiens.

116. BIATORELLA RESINÆ, *Fr.*

Hab., antehac tantummodo in *Saltdalen* a *Sommerfelt* lecta, quoque in *Maalselven* interiore prope *Överby*; in insula

Tromsö ad postes pineos sepium; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Karasjok* ad *Haldivuovde* & alibi, tamen omnibus locis parce visa, dum in *Saltdalen* copiosa refertur. In *Maalselven* quoque pycnides adsunt, apotheciis concolores, conico-papillæformes, quarum stylosporæ sporis similes.

117. BIATORELLA CONSPURCANS, *Norm.*

Ut videtur, occurrit præcipue ad latus septentrionem spectans truncorum, dum subsequens ad quodlibet latus.

118. BIATORELLA MICROHÆMA, *Norm.*

Hab. in insula *Tromsö* passim parcius; in convalle *Maalselven* interiore ad *Bjerkeng*, ad *Divimo*, utroque loco parcellissime visa. Semper ad *Salices*.

119. BIATORELLA IMPROVISA, *Nyl.*

Hab. quoque in *Finmarkia continentali* interiore juxta flumina *Karasjok* & *Anarjok*.

120. BIATORELLA ROUSSELII (*Dur. & Mont.*)

Hab. nov. civ. Floræ arcticæ prope *Tromsö* ad alpem *Flöiffjeld*, ibi infra prærupta calcarea, paullo supra terminum *Betulæ*, latit. bor. attingens $69^{\circ} 39' - 40'$. Sporæ 0,007—9 m. m. longæ. Sic Flora arctica Norvegiæ quinque species generis numerat; forsitan sexta sc. *B. germanica* detegenda est.

121. BLASTENIA LEUCORÆA (*Ach.*)

Hab. quoque in *Gildeskaal* ad *Indyr*; in *Throndenæs* ad tractum prædii *Harstadhavn*; in insula *Tromsö*.

122. LOPADIUM PEZIZOIDEUM (*Ach.*)

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Troaa*; in *Vesteraalia* ad *Hädselö*; in *Maalselven* ad *Maalsnæs*, ad *Moen*, ad *Iselymo*, ad *Rubben* convallis *Bardu* intimæ, ad *Istinderne*, ad *Rostaffjeld*; in insula *Tromsö* frequenter; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*; in *Varangria meridionali* ad *Elvenæs*.

123. LOPADIUM FUSCO-LUTEUM (*Dicks.*)

Hab. quoque in *Throndenæs* ad *Harstadhavn*, ad *Lille-Skaanland*, ad partem occidentali-meridionalem insulæ *Tromsö*, his omnibus locis in tractu littorali; præterea a mari remotius in *Maalselven* prope *Moen*, nec non ad radicem alpium *Istinderne* in vicinia termini *Betulæ*. Sporæ 0,042—54 m. m. longæ, 0,024—34 m. m. latæ, in specimenibus locorum magis continentalium tamen non maturæ visæ, ut quoque in *L. pezizoideo* hujus tractus non raro

accidit. Descriptio faciei externæ *Lecideæ* v. *Caloplacæ fuscoluteæ* apud *Sommerfelt & Th. Fries* (Supl. Fl. L. L. arct.) fere credere facit, eos *Lopadium* ante oculos habuisse.

124. ARTHRORHAPHIS FLAVO-VIRESCENS
(*Dicks.*)

Hab. quoque in *Bejeren* ad *Meraftenklumpen* supra terminum *Betulæ*, ad *Solö*; in *Gildeskaal* ad *Indyr*; in *Sör-Reisen* ad *Middagsfjeld*, ad alpes prope *Gumpendal*; in *Maalselven* ad *Rostafjeld*, ad *Istinderne*; in insula *Tromsö*; in tractu continentali interiore juxta fl. *Tanaelv* ad *Storfossen* latere *Fennico*.

125. CATILLARIA (*Buellia*) CHIONEA, n. sp.

Crusta sat tenuis, nivea v. alba, ad superficiem farinosa, subcontigua v. tenuiter rimulosa, hydrato kalico non tincta, hypothallo obsoleto. *Apothecia* sat crebra, adnata v. basi innata, erumpentia margine accessorio thallino cincta, ab ipsis rimulâ separata, ab initio plana, sæpe angulosa, disco atro, demum nudo, margine crasso, obtuso, farinose albo v. demum livido, numquam nudo, persistente. *Paraphyses* conglutinatæ, subhyalinæ, apicem versus sensim saturatius fusco-violaceæ. *Sporæ* 8næ, ellipticæ, obtusæ, biloculares, ad septum paullo constrictæ, 0,012—15 m. m. longæ, 0,006—10 m. m. latæ, demum nunc subhyalinæ, nunc sæpius totæ v. maculatim violaceæ v. nigrifule suffusæ.

Hab. lichen, externe *Rhizocarpo* calcareo minori similis, in *Bejeren* ad *Troelid* prope cataractam rivi *Tullaaen*.

126. LECIDEA LAPICIDA (*Ach.*) *Fr.*

Hab. rarior, ut videtur, hujus agri quoque in *Throndenæs* ad *Harstadvavn*; in *Sör-Reisen* ad *Bakkejord* (eximia).

127. LECIDEA ARCTICA, *Smf.*

Hab. lichen per magnam partem agri frequentior quoque in *Bejeren* ad *Troaa*; in *Throndenæs* ad *Seljestad*; in *Maalselven* ad *Sandnæs*, ad *Bugten* & alibi; in tractu *Tromsöensi* frequentior; in *Alten* passim copiose; in insula *Seiland* ad *Komagnæs*; ad *Havösund*; in *Tanafjord* ad *Lille-Lerpollen*, ad *Algasvarre*.

128. LECIDEA NEGLECTA, *Nyl.* (?).

Occurrit crusta sterilis, tantummodo semel unico apothecio visa, ad hanc speciem, ut suspicor, pertinens frequentius per agrum quum prope littora maris tum ad cacumina alpium elevatissima ex. gr. in *Bejeren* ad alpes prope *Arstaddal*, in

Vesteraalia ad *Hadselö*; in *Finmarkia occidentali* ad *Garrajok* præfecturæ *Alten*; ad *Havösund*; in *Finmarkia orientali* ad *Jakobselv* & cet.

129. LECIDEA ELABENS, *Fr.*

Hab. quoque in *Bejeren* supra *Heminghyt*; in *Maalselven* ad sceleta Pinorum frequenter copiose; in *Skjervö* ad partem interiorem convallis *Reisendal*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta flumina *Karasjok* & præcipue *Anarjok* frequentius copiose & optime evoluta. Hæc species locis citatis adhuc frequens, tamen in futurum quoque anno rarior fiet, prout sceleta Pinorum & trunci a vento dejecti silvas antea obruentes, ad quos lichen habitat, in usum oeconomicum convertentur v. putredine delebuntur.

130. LECIDEA TURGIDULA, *Fr.* β. DENUDATA, *Fr.*

Hab. quoque in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Anarjok*.

131. LECIDEA TENEBROSA, *Fr.*

Hab. nov. civ. Flor. arct. Norvegiæ in insula *Tromsö*. Determinavit *Th. Fries*.

132. LECIDEA AGLÆA, *Smf.*

Hab. quoque in *Gildeskaal* ad cacumen jugi prope *Skovvold*; nec non ad cacumen jugi *Seidafjeld* *Finmarkiæ* orientalis.

133. LECIDEA ELATA (*Schär*).

Hab. rarior species quoque in *Throndenæs* ad *Harstadhavn* prope littora maris; in *Salangdal* interiore ad alpes supra *Lund*.

134. LECIDEA ARMENIACA (*DC.*) β. METALEUCA, *Smf.*

Hab. rarior species quoque ad *Thomasjordaasen* prope *Tromsö*; nec non in *Finmarkia continentali* interiore ad alpem *Rastegaise*, juxta fl. *Anarjok*, ibi formæ ad primariam magis accedentes.

135. LECIDEA RAMULOSA, *Th. Fr.*

Hab., antehac e *Flöifjeld* prope *Tromsö* a detectore indicata, quoque in *Bejeren* prope *Solövand* infra terminum culturæ Cerealium, ad *Meraftenklumpen*; in *Salangdal* ad alpes supra *Lund*; nec non in *Sör-Reisen* ad alpem *Middagsfjeld*, vulgo supra terminum *Betulæ* nascens. Specimina mea a descriptione cl. *Th. Fries* (*Bot. Not.* 1866 p. 14) apotheciis

sessilibus abhorrent. Non raro crusta facile dignota tantum sterilis occurrit.

136. LECIDEA EPIPLOICA, *Norm.*

Hab. in *Sör-Reisen* (o: parochia Tranø, non „Tromsø“) ad cacumen alpis *Middagsfjeld* elevatius supra terminum Betulæ.

137. LECIDEA GEOPHANA, *Nyl.*

Hab. nov. civ. Flor. arct. in convalle *Maalselven* prope *Moen*; in insula *Tromsö* passim; nec non in *Varangria boreali* ad *Iakobselv*, ibi latit. bor. attingens 70° 6—7.

Sporæ sæpissime & typice 16næ, in hoc tractu haud raro minores quam a clo. *Nylander* visæ, præcipue in specimenibus *Varangricis*, ubi tantummodo 0,004—5 m. m. latæ, tamen huic speciei, non affini *L. boreellæ*, referendis. Gelatina jodo intense cærulescens, demum subnigricans.

138. LECIDEA VITELLINARIA, *Nyl.*

Hab., antehac ex *Alten* indicata, quoque in *Gildeskaal* ad *prædium pastoris*; in *Vesteraalia* ad *Hadselö* prope *Melbo*; in *Balsfjord* ad *Myre*; nec non in insula *Tromsö*.

139. MYCOBLASTUS SANGVINARIUS (*L.*)

Hab. frequentior lichen quoque ex. gr. in *Gildeskaal* ad *Indyr*; in *Bejeren* ad *Heminghyt*; in *Vesteraalia* ad *Hadselö*; in *Maalselven* frequenter copiose; præterea in *Finnmarkia continentali* interiore juxta flumina *Karasjok* & *Anarjok* frequentius. Occurrit quoque *saxicola*, tamen revera sæpius supra crustas tennes aliorum lichenum saxicolarum, raro immediate ad saxum ipsum, ex. gr. ad *Stokmarknæs* insulæ *Hadselö*, in *Sör-Reisen* ad *Bakkejord* & cet. Occurrit f. *plethorica*: crusta crassiore eximie verrucosa, verrucis strato sangvineo (sub gonimo) repletis. Hæc ex. gr. in *Maalselven* ad *Elveskiftningen*, nec non alibi.

140. SPOROSTATIA CINEREA (*Schär.*)

Hab., antehac ex unico loco hujusce Floræ & Scandinaviæ indicata, quoque ad tractum meridionalem insulæ *Tromsö* ad parietes rupium septentrionem spectantes. Specimina collecta, quia mihi intercederunt, examinare non potui; sed cl. *Th. Fries*, qui ante tres annos species paucas tunc a me lectas benigne determinavit, ea huc pertinere declaravit.

141. SARCOGYNE PRIVIGNA (*Ach.*) β . *clavus* (*DC.*)

Hab., antehac e *Saltdalen* indicata, quoque, vulgo a

varietate comitata, in *Gildeskaal* ad *prædium pastoris* (quoque disco pruinoso); in *Throndenæs* ad *Harstadhavn*; in insula *Rollen* prope *Ibbestad* (ibi eximia).

142. SARCOGYNE PRUINOSA (*Sm.*)

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in *Gildeskaal* ad *Indyr*; nec non, magis in præcedentem vergens, in *Throndenæs* ad *Harstadhavn*. Sporæ maturæ non a me visæ.

143. SARCOGYNE CHALCOMAURA, *n. sp.*

Crusta passim interrupta latius expansa, cervina v. e cervino nigricans tenuis, rugulosa, sulcato-areolata areolis minutis, v. his remotiusculis, v. obsoleta. *Apothecia* magnitudine S. pruinosa, saturate brunneo-nigra v. nigra, intus tota fusco-nigra, nuda, adnata, juvenilia plana margine manifesto v. subobsoleto, tenui, integro, v. minutissime ruguloso, atro, nitidulo cincta, demum convexa margine excluso. *Paraphyses conglutinatae*, fuscidule hyalinæ (segmento crassiore fuscæ), apice saturate fuscæ. Sporæ globosæ v. subglobosæ, 0,001—3 m. m. latae. *Hypothecium* simplex fusco-nigrum, usque ad 0,12 m. m. crassum. *Gelatina* hymenii jodo post cærulescentiam levior viridulam saturate fuscenscens.

Hab. in insula *Tromsö* ad scopulos calcis primitivæ.

144. BUELLIA PAPILLATA (*Smf.*)

Hab. quoque in *Salangdal* ad alpes supra *Holtet*; in *Sör-Reisen* ad *Middagsfjeld*; in *Maalselven* ad *Rostafjeld*.

145. BUELLIA THIOCONIS, *n. sp.*

Thallus latius expansus, leprosus, pallide sulphureus v. albidus, hypothallo obsoleto. *Apothecia* usque ad 0,5 m. m. lata, vulgo minora, disco primitus concaviusculo, mox plano, margine subexcluso. *Paraphyses* arcte conglutinatae, fuscidulæ, apice saturate fuscæ. Sporæ 8næ v. suboctonæ, oblongæ, sat obtusæ, 4-loculares, 0,010—18 (vulgo 0,012) m. m. longæ, c. 0,005 m. m. latae. *Hypothecium* crassiusculum, obscurius fuscum, (etiam tenui segmento visum).

Hab. in insula *Tromsö* ad terram musci & lichenibus destructis vestitam.

146. BUELLIA CONIOPS (*Wg.*)

Hab. quoque in insula *Tromsö* passim copiose.

147. BUELLIA SCABROSA (*Ach.*) β CINERASCENS, *Th. Fr.*

Hab. quoque in *Bejeren* prope *Solövand*; in *Finnmarkia continentali* interiore juxta fl. *Karasjok* ad *Assebakte*.

148. BUELLIA CONVEXA, *Th. Fr.*

Hab., antehac e Storfjeldet Varangriæ indicata, quoque in insula *Tromsö* supra *Physciam cæsiam*.

149. RHIZOCARPON ALBO-ATRUM (*Hoffm.*) MARGARITACEUM (*Smf.*)

Hab., antehac e Saltdalen indicatum, quoque in *Gildeskaal* ad *prædium pastoris*; in *Throndenæs* ad *Harstadhavn*; in *Sör-Reisen* ad *Finsæt*, ibi latit. bor. attingens 69° 7.

GRAPHIDEI.

150. LECANACTIS DILLENIANA (*Ach.*)

Hab., antehac sterilis rarius lecta in Saltdalen, quoque in *Throndenæs* ad *Harstadskaret* inter *Skaanland* & *Nipen*; in *Maalselven* pluribus locis etiam in convalle *Bardu* ad radicem alp̄is *Blaabjerg*; ad partem meridionalem insulæ *Tromsö*; ad alp̄em *Flöifjeld*; nec non vestigium ejus, nisi fallor, in *Alten* ad rimas rupium inter *Bossekop* & *Goskavarre* visum, ibi tamen incerta, omnibus locis fere semper sterilis vel initiis apotheciorum ornata; præterea in *Finmarkia orientali* ad *Jakobselv* Varangriæ borealis prope cataractam infimam (ad prærupta ripæ occidentalis), ibi fructificans & sporigera latit. bor. attingens 70° 7—8. Apothecia nunc bene evoluta, nunc prolifera & difformia, disco sæpius p. umoso. Sporæ septis obsoletis, post evacuationem contenti manifestis, angustiores, 0,020—24 m. m. longæ, 0,004—5 latæ. Gelatina jodo flammee rubens.

151. OPEGRAPHA PERSOONII, *Ach.*

Hab. nov. & inopinata civ. Flor. arcticæ in *Gildeskaal* ad *Indyr* & *Skovvold*; in *Throndenæs* ad tractum prædii *Hardstad* copiosius; in *Maalselven* paullo intra *Maalsnæs* non parce; in insula *Tromsö* parce, ad alp̄em *Flöifjeld* supra terminum *Betulæ*, his locis latit. bor. attingens 69° 39—40.

An lichen revera hæc species sit, non certe dijudicare possum defectu speciminis authenticici. A descriptione optima *Stitzenbergii* præcipue recedit *thallo* vulgo (semper?) erythrogonimico, itaqve recente statu rufescente, v., si cinereo, immo cinereofusco, in rufum tamen paullo vergente, intus luteo, gonidia chroolepidea fovente. E *Gildeskaal* eam thallo albicante reportavi. *Apothecia* aggregata, confluentia, sæpe flexuosa, ramosa, prolifera, glomerulos sparsos constituentia.

Externe optime evoluta, quoad partes internas tamen sæpe incompleta, nunc omnino sterilia, nunc sporas male evolutas, simplices v. biloculares, raro quadriloculares liberas alentia. *Sporæ* sunt 0,015—20—24 m. m. longæ, 0,004—5 m. m. latæ, vulgo lanceolate acutiusculæ. *Paraphyses* fuscescentes, sat conglutinatæ, difficulter separandæ. *Gelatina* hymenii jodo rubens.

152. ARTHONIA ASTROIDEA, *Ach.*

Hab., antehac e *Saltdalen* & *Polmak* indicata, quoque in *Gildeskaal* ad *prædium pastoris*, ibi quoque ut f. *radiata* (Pers.) occurrens; in *Salangdal* ad *Elvevold*; in *Maalselven* passim ex. gr. ad *Moen*, *Bakkehoug*, *Iselvmo*, *Bjerkeng*; in insula *Tromsö*; ad radicem alpis *Flöifjeld* (69° 39—40); nec non in *Varangria meridionali* ad *Klostervand* prope *Svanvig*; ibi non bene evoluta, sporis raro occurrentibus, gelatina hymenii jodo non tincta v. ochracee lutescente (f. *passiva*, m.) Locis supra enumeratis alnicola est.

153. ARTHONIA MEDIELLA, *Nyl.*

Hab., antehac tantummodo e *Bossekop* indicata, in quo tractu eam v. formam appropinquantem alnicolarum prope *Eiby* legi, quoque in insula *Tromsö* copiose, ad alpem *Flöifjeld* (ad *Alnos*). Observandum est, thallum manifestum non raro adesse, primitus hypophloeodem, demum efflorescentem, leprosum, viridule cinereum (madidum virentem).

154. ARTHONIA PUNCTIFORMIS, *Ach.*

Hab., antehac in *Saltdalen* a *Sommerfelt* lecta, quoque in *Gildeskaal* ad *Indyr* ad ramos juniores *Populi*.

155. ARTHONIA SORBINA, *Körb.*

Hab. nov. civ. *Flor. arcticæ* in insula *Tromsö* ad *Prunum Padum*, nisi fallor (*Sorbum*?). Specimini lecto apothecia sunt minus bene evoluta, rarissime ascos & sporas (in specimine *Silesiaco* authentico frequentes) producentia. Hæ 0,010—12 m. m. longæ, obsoletius 2—3—4loculares. *Gelatina* paraphysium jodo cærulescens, demum sordide cærulea (non rubens), qualis in specimine *Körberiano*; coloratio ascorum non visa (in *Silesiaco* rubens). Hac reactione nec non characteribus externis ab *A. astroidea*, qualis in hoc agro occurrit, distincta; in hac nempe gelatina rubet sine præcedente cærulescentia.

156. ARTHONIA EXCENTRICA, *Th. Fr.*

Hab. nov. civ. Flor. arct. Scandinaviæ in *Maalselven* ad radicem alpium *Istinderne*, ibi supra terminum *Betulæ* nec non in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*.

157. ARTHONIA PATELLULATA, *Nyl.*

Hab. nov. civ. Flor. arct. Norvegiæ in *Maalselven* prope *Moën*; in *Skjervö* ad partem mediam & superiorem convallis *Reisendal*; in *Varangria meridionali* prope *Klostervund*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Karasjok* passim copiosissime, ibi unacum aliis lichenibus (parcioribus) truncos *Populetorum* omnino albos efficiens; nec non juxta partem interiore fluminis *Tanaelv* frequentius.

158. XYLOGRAPHA PARALLELA (*Ach.*)

Hab. quoque ex. gr. in *Gildeskaal* ad *Indyr*; in *Vesteraalia* ad *Hadselö*; in *Maalselven* passim; in insula *Tromsö* ad sepes frequenter; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Karasjok* passim. Ad juniperos sæpe occurrens, præcipue tamen ad ligna *Pini* copiosa & pulchrius evoluta.

159. AGYRIUM RUFUM (*Pers.*)

Hab. quoque ex. gr. in *Bejeren* ad *Solö*; in *Gildeskaal* ad *Indyr*; in *Maalselven* passim; in insula *Tromsö* ad sepes copiosissime & optime evolutum; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*.

CONIOCARPI.

160. TRACHYLIA TIGILLARIS (*Pers.*)

Hab. quoque in *Maalselven* ex. gr. ad *Moën*; in *Alten* prope *Bossekop*, ad *Nallovarmoën*, ad *Eibydal* & alibi; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Karasjok* ad ramos *Pinorum* emortuos frequenter, ibi sæpe ecrustacea v. subecrustacea.

161. TRACHYLIA TYMPANELLA, *Ach.*

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in *Alten* supra ramos sceleti *Pini* ad latera jugi prope *Melladal*, ibi latit. bor. attingens 70°.

162. CALICIUM HYPÉRELLUM, *Ach.*

Hab. quoque in *Maalselven* ad *Moën*, ad *Bakkehoug*, ad *Bjerkeng*, ad partem inferiorem convallis *Bardu*.

163. CALICIUM TRACHELINUM, *Ach.*

Hab. quoque in *Maalselven* ex. gr. ad *Tagelvdal*, in *Bardu* interiore ad *Karlstad*.

164. CALICIUM TRABINELLUM, *Ach.*

Hab. quoque in *Maalselven* ex. gr. ad *Bjerkeng*, ad *Nordmoen*; in *Alten* prope *Bossekop*, ad *Eibydal*, ibi latit. bor. attingens fere 70°; nec non in *Varangria meridionali* prope *E venæs.*

165. CALICIUM PUSILLUM, *Ach.*

Hab. quoque in insula *Tromsö.*

166. CALICIUM BYSSACEUM, *Fr.*

Hab. quoque in insula *Tromsö.*

167. CONIOCYBE FURFURACEA (*L.*)

Hab. quoque in *Maalselven* ad latera jugi supra *Iselvmo* parce visa (68° 54—58).

168. CONIOCYBE CONIOPHÆA, *n. sp.*

Coniocybæ albæ similis, ab ea distincta *excipulo* unicum stipitibus juvenilibus cinnamomee v. ochracee pruinoso *Thallus* (si proprius?) cinereus v. albicans subobsoletus. *Stipites* vix 2 m. m. superantes, demum obscure fusci, interdum angulosi. *Massa sporalis* rufidule ochracea. *Sporæ* globosæ hyalinæ 0, 003—5 m. m. latæ.

Hab. in *Maalselven* ad truncum *Betulæ* vestustæ prope *Finkrogen* convallis *Bardu.*

PYRENOCARPI.

169. DERMATOCARPON RUFESCENS (*Ach.*)

Hab. quoque in *Gildeskaal* ad *Indyr*; in *Throndenæs* ad *Seljestad*; in *Maalselven* ad *Istinderne.*

170. NORMANDINA LÆTE-VIRENS (*Turn.*)

Hab. quoque in *Vesteraalia* ad *Hadselö*; in *Sör-Reisen* ad *Bakkejord*; in *Maalselven* ad *Moen*, ad *Divimo*, ad radicem alpium *Istinderne*; prope *Tromsö* ad alpem *Flöifjeld*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Karasjok* ad alpem *Dafteroavve* prope terminum *Betulæ.*

171. DACAMPIA HOOKERI (*Borr.*)

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ & Scandinaviæ optime evoluta in *Bejeren* ad *Meraftenklumpen* (c. 66° 59); in *Salangdal* ad alpes supra *Lund & Holtet*; in *Sör-Reisen* ad alpem *Middagsfjeld*, ibi latit. bor. attingens c. 69°—4, his locis omnibus supra terminum *Betulæ* nascens, interdum quoque supra terminum *Salicum* majorum, semper ad solum calcareum. Nulla ratione a speciminibus Europæ australioris differt.

Lichenologis Scandinaviæ, lichenes desideratos in vicem præbituris, hunc & alios libenter offero.

172. PERTUSARIA BRYONTHA (*Ach.*)

Hab. quoque in *Maalseven* ad alpem *Aglapen*.

173. PERTUSARIA COMMUNIS, *DC.*

β . ARCOLATA (*Clem.*)

Hab. *forma primaria*, nov. civ. Flor. articæ, in *Gildeskaal* ad Betulam vetustam putrescentem prope *prædium pastoris*, ibi latit. bor. attingens 67° 3—4. Qvod partes externas optime evoluta; sporæ tamen raræ, tum usque ad 0,135 m. m. longæ. *Varietas* v. subspecies, antehac tantummodo in Saltdalen lecta, occurrit in *Gildeskaal prope Skovvold*.

174. PERTUSARIA DACTYLINA (*Ach.*) *Nyl.*

Hab. nov. civ. Flor. arct. Norvegiæ in *Bejeren* ad alpes prope *Arstaddal*; in *Sör-Reisen ad Middagsfjeld*; in *Maalseven* ad *Istinderne*, his locis supra terminum Betulæ; dein in *Finmarkia orientali* ad *Kjöllefjord*, ad *Jakobselv* Varangriæ borealis (f. dubia, forsitan huc non pertinens). Omnibus locis fructifera lecta, apothecii interdum sublecanorinis, disco ut in *P. bryontha* colorata, frequentius quasi operculo thallino adnato eo modo tecto, ut sulcus lividus orbicularis inter hoc & marginem apothecii ut solum vestigium ejus (disci) remaneat. In pluribus speciminibus asci usque ad 0,15 m. m. longi observati, sporæ maturæ nunquam.

175. PERTUSARIA LEIOPLACA (*Ach.*) β LÆVIGATA, *Th. Fries.*

Hab. *forma primaria*, nov. civ. Flor. art. Scandinaviæ, in *Gildeskaal* ad *Skovvold* (ad *Populum*; crusta alba); in *Bejeren* prope *Heminghyt* (ad *Salicem nigricantem*); in *Sa-langen* ad *Elvevold*; in *Sör-Reisen* ad *Tömmervand*, locis ultimis ad *Salicem pentandriam*, ultimo latit. bor. attingens 69° 11—12.

Thallus præcipue ad verrucas hydrato kalico lutescit. Magnitudo sporarum in eodem apothecio a 0,045 m. m. v infra inde ad 0,090 m. m. longitudine variat. Sporæ nunc 4næ nunc 6næ v. 5næ, nunquam, ut videtur, 8næ, sæpe in eodem asco 2—3 minores, 1—2—3 majores.

Forma lævigata, antehac tantummodo e Saltdalen indicata, hab. quoque in *Bejeren* prope *Solövand* ad *Prunum Padum* (forma ad primariam nimis vergens, verrucis elevatis, sporis 6nis v. 7nis raro 8nis c. 0,045 m. m. longis); porro

alnicola in *Salangdal* inter *Krogen* & *Forset* (eximia); in *Maalselven* per majorem partem convallis frequenter copiose ex. gr. ad *Moen*, ad *Bakkehoug*, ad *Nordmoen*, ad *Ejerkeng*, immo ad convallē *Dividal* interiorem. In hoc tractu latit. bor. attingit 69° 8—9.

Thallus hydrato kalico lutescit, demum intensius. Sporæ minime semper 8næ, quoque 7næ, 6næ, numquam, quantum observavi 4næ. Quoad numerationem sporarum, asci iis minus maturis gaudentes soli respiciendi sunt. Facilius & certius, ut credo, numerandum est, cum segmentum apothecii crassitudine commoda exsectum tincturâ jodi imbuatur ante pressionem inter vitra, quippe asci tum multo tenaciores fiunt. Differentiæ inter varietatem & formam primariam a verrucis & partibus externis sumtæ nullo modo valent, sæpe contrariæ, ut magna copia speciminum ad differentes species arborum lectarum docet.

176. PERTUSARIA SOMMERFELTII (*Flk.*)

Hab., antehac e Nordlandia Saltensi & Jarfjorden indicata, quoque in *Bejeren* supra *Muldjord*, ibi ad Juniperos & eximia ad truncos & ramos Pini; in *Gildeskaal* ad *Indyr* (ad Juniperos), ad *Skovvold*, ibi ad Populum. Hydrato kalico leviter v. obsoletius fuscescit v. lutescit præcipue ad ostiola verrucarum juvenilium.

177. PERTUSARIA ANGUSTICOLLIS, *Anzi.*

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in *Bejeren* ad radicem denudatam Betulæ prope *Solövand*. Differt noster a lichene Bormiensi crusta, præcipue verrucis parcius albis, his simplicioribus sæpe 1-ostiolatis (f. *candidula*). Sporæ 0,027—30 m. m. longæ. Species ab omni *P.* Sommerfeltii primo obtutu dignota figuratiōe verrucarum depresso globosarum, basi angustiore sessilium, ostiolo semper impresso brunneo-nigro, hydrato kalico circumcirca primam citrine lutescente, demum fulvescente v. rufescente, thallo cetero (præcipue in f. arctica) citrine lutescente.

178. PERTUSARIA (?) PHLYCTIDEA, *n. sp.*

P. (Lecanoræ) protuberanti (Smf.) similis, forsitan hujus varietas. Crusta cinerea (demum quidem non hypophloeodes), tenuis, passim rimulosa, hydrato kalico sordide lutescens. Velum verrucæ præcocis rumpens ut margo thallinus dilaceratus persistens. Nucleus discoideus mox denudatus, c. 0,5 m. m. latus ægre 1 m. m. attingens, sæpe circumscissus (a

velo marginiformi separatus), planiusculus, inæqvabilis, e pallide roseo albus, ab initio farinose fatiscens. Sporæ 8næ, ellipticæ, 0,022—24 m. m. longæ, 0,012—14 m. m. latæ, late limbatae, contento endosporii utraque extermitate truncato.

Hab. nov. forma Floræ arct. Norvegiæ in *Maalselven* ad Alnos prope *Bjerkeng*.

179. PERTUSARIA GLOMERATA, *Ach.*

Hab., antehac in Saltdalen parcius a *Sommerfelt* lecta, quoque in *Maalselven* ad alpem *Rostaffeld*, ibi latit. bor. attingens 68° 55. Hydrato kalico thallus primo lutescit, dein saturate rubet.

Var. octomela, f. primariae omnino similis & ab ea vix inspectione externa distingvenda. Apothecia ostiolo vulgo umbonato, cinereo-nigricante, poro centrali nigro pertuso. Differt tantummodo sporis 8nis v. suboctonis, quæ sunt ellipticæ, late limbatae, 0,054—72 m. m. longæ, 0,015—27 m. m. latæ in ascis usque ad 0,3 m. m. v. ultra longis. Hab. in convalle *Maalselven* ad lignum pini putrescens prope *Bjerkeng*.

180. PERTUSARIA TROCHISCEA, *n. sp.*

P. glomeratae & quibusdam formis *Aspicilia verrucosæ* similis. Ab illa differt colore (in herbario) persistente niveo, verrucis vulgo minoribus, multo humilioribus, valde deplante globosis, ad ostiolum impressiusculis, ambitu paullo angulosis, hydrato kalico ægre v. non affectis (non fulvescentibus nec demum rubentibus). Ab *Aspicilia verrucosa* recedit sporis 4nis, indole exactius examinata revera pertusaroidea. (*P. verrucosa*, Th. Fr. in herb.) Verrucæ dense stipatæ, compressione mutua sæpe omnino angulosæ, confluentes interdum 2—3 ostiolatæ. Sporæ 0,042—64 m. m. longæ, 0,024—30 m. m. latæ.

Hab. in *Maalselven* ad alpem *Aglapen* supra terminum *Betulae*.

181. PERTUSARIA XANTHOSTOMA (*Smf.*)

Hab., antehac e tractu oppidi *Bodø* indicata, quoque in *Gildeskaal* copiose ad *Indyr*, ad *Skovvold*. Præcipue ad Juniperos, rarius ad *Vaccinium uliginosum*, quoque ad muscos juxtapositos, immo parcissime ad saxum calcareum adjacentes sese extendens observata.

182. VARICELLARIA MICROSTICTA, *Nyl.*

Hab. quoque ad *Jakobselv* *Varangriæ borealis* prope ostium rivi *Vandelv*.

183. MICROGLENA SPHINCTRINOIDES (Nyl.)

Hab. quoque in *Sør-Reisen* ad alpes prope *Gumpendal* supra terminum *Betulæ*; in *Maalselven* ad *Istinderne*; ad *Flöifjeld* prope *Tromsö* copiosius; in *Alten* pluribus locis copiose; in *Varangria meridionali* ad *Elvenæs*; nec non ut forma *arenicola* juxta fl. *Tanaelv* ad *Storfossen*, latere *Fennico*.

* M. SPHINCTRINOIDEA (Nyl.)

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ Norvegiæ, socia præcedentis, ad alpem *Flöifjeld* prope *Tromsö*, nec non in *Fennia* Finmarkiæ orientali adjacente juxta fl. *Tanaelv* ad *Storfossen*. In forma maxime typica (*Tromsøensi*) thallus manifestus, siccus cinereus albus, humectatus viridulus, apothecia quum madida tum sicca nigra, perithecio non gelatinose translucente, humectata (recentia) ostiolo vix impresso nec manifeste umbilicato, sicca minora, collabentia, sæpe toto vertice patelliforme invaginato. In *M. sphinctrinoide* maxime typica apothecia madida (viva) fusca, perithecio gelatinose subtranslucido, ostiolo eximie umbilicato, sicco profundius impresso. Reactio jodi sæpe fere eadem in utraque specie, sc. gelatina hymenii manifeste cærulescens quoque in *M. sphinctrinoide*, & asci in *M. sphinctrinoide* ad verticem macula cærulea saturatiore quam cæteri tincti. In *sphinctrinoide* apothecia vulgo minora, sed adest f. *arenicola* *M. sphinctrinoide*, cujus apothecia non majora, obsoletius umbilicata, humectata tamen perithecio fusco, gelatinose subtranslucido, sacco interiore asci jodo intensius luteo-rufescente. Præterea occurrit forma *sphinctrinoide*, cujus apothecia sicca non tam collabuntur & invaginantur ut f. maxime typica.

184. MICROGLENA MUSCICOLA (Ach., Nyl.)

Hab. nov. civ. Flor. arct. Norvegiæ in insula *Hadselö* prope *Stoknarknæs*; in *Kvæfjord* ad *Vig* & *Vogteren*; nec non in insula *Tromsö*, ibi latit. bor. attingens 69° 38'—43'. Sporæ, quæ in hoc tractu minores (sæpe 0,036—40 m. m. longæ) quam alibi quoque occurrere videntur, interdum 5næ immo 8næ observatæ sunt. Character negativus reactionis jodi constans & pretiosus videtur.

185. MICROGLENA PERTUSARIELLA (Nyl.)

Hab. nov. civ. Flor. arct. Norvegiæ, ante me a clo *Th. Fries* alibi agri lecta, quoque in *Maalselven* (ad paginam interiorem epidermidis revolutæ *Betulæ*) prope *Bjerkeng*.

Differt a descriptione *Nylanderii* ostiolo vix obscuro (nisi accidentaliter), sporis sæpius 4nis v. 6nis, tamen huc pertinet secundum sententiam *Th. Friesii* in litt.

186. SEGESTRELLA LECTISSIMA, *Fr.*

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in *Gildeskaal* ad lapidosa & rupes chaoticas supra *prædium pastoris*, ibi latit. bor. attingens 66° 59. Sporæ 0,018—24 m. m. longæ. Gelatina hymenii jodo non tincta, contentum ascorum flavescens.

187. SEGESTRELLA (*Thelidium*) PHÆOBÆA,
n. sp.

Crusta qvalis in præcedente, colore tantum saturatiore. *Apothecia* basi innata, parvula, 0,12 v. ultra lata, fusca v. nigricantia, depresso hemisphærica, ostiolo simplice (non impresso nec manifeste pertuso), perithecio dimidiato. *Paraphyses* non bene distinctæ, massam grumulosam constituentes. *Sporæ* in ascis ventricosis v. subpyriformibus 8næ, cuneato-oblongæ, 0,016—27 m. m. longæ, 0,06—8 m. m. latæ, typice 4—6-loculares, ad septum medium solum paullo constrictæ, maturæ sæpe halone mucoso, tenui, jodo rubente & tum primum visibili. *Gelatina* hymenii jodo saturate coccinee rubens.

Hab. prope *Tromsø* ad rupes micaceo-schistosas sub fluxu maris insulæformes littori adjacentes, *Juledagene* nominatas. Qvoad genus, hæc species inter *Segestrellam* & *Thelidium* intermedia est; perithecio, habitu, affinitate naturali illi proxima, characteribus internis ad hoc accedens. Spermogonia crebra spermatiis 0,004—6 m. m. longis.

188. BELONIA RUSSULA, *Körb.*

Hab. eximius lichen, antehac ad Mortensnæs Varangriæ borealis a clo *Th. Fries* parcissime lectus, qvovque in *Gildeskaal* ad *prædium pastoris* passim copiosius (67° 3—4); in insula *Rollen* ad saxa pratensia prope *Ibbestad* (68° 47); in *Maalselven* ad radicem alpis *Aglapen* in prædio *Aglapmo* (68° 55—56); nec non ad *Jakobselv* Varangriæ borealis quom prope cataractam infimam tum prope cataractam rivi *Vandelv*, ibi latit. bor. attingens 70° 8—9. Vulgo prædiligit parietes sat perpendiculares rupium, qvi a terra & cæspite supposito imminente sub pluvio & deliquentia nivis modice irrigantur. Species saxi, cui insidet, nunc micaceo-schistosa, nunc chloritico-argillacea, nunc arenaria. Ut videtur, centrum dispersionis ejus in Norvegia boreali qværendum est, ubi quinque locis inter se longe distantibus jam lectus est.

nec haud dubie multis aliis locis invenietur. Lichenologis specimen impertire possum.

Paraphyses guttulis minimis seriatis russulis. *Spora* 0,074—90 m. m. longæ. *Gelatina* hymenii jodo levius cærulescens, mox sordide viridula, demum dilute fusco-violacescens.

189. THELOPSIS MELATHELIA, *Nyl.*

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ, antehac ad alpem Ben Lawers Scotiæ & Walkeamæki Rossicæ Onegensis lecta, in *Gildeskaal* ad *prædium pastoris* (67° 3—4); nec non in *Kvæfjord* ad *Vig & Vogteren*, ibi latit. bor. attingens c. 68° 45, utroque loco supra cæspitulos muscorum ad parietes arduos rupiu.n.

Lichen externe magis singularis (fere monstrose apprens) quam nobilis, structura contra interna eximius habet *thallum* statu recente semper intense *russeolum* erythrogonimicum, tamen, ut in aliis, post 2—3 annos in herbario cinereo-virescentem, qualis a cl^o. *Nylander* describitur. *Gonidia* viridia chroolepidea (usque ad 0,028 m. m. v. ultra lata) in lichene recente pro majore parte flammee rufa. *Hymenium* usque ad 0,25 m. m. v. ultra altum. *Gelatina* hymenii jodo, ut in speciminibus Scotiis sed non in Rossicis secundum *N. Linnæum*, leviter cærulescit præcipue ad ascos juveniles, postea interdum violacescit.

Lichen hic unacum *Ducampia Hookeri*, pluribus aliis novitiis *Pyrenocarporum* infra allatis, nec non *Lopadiorum fusco-luteo*, Lichenæ Nordlandicæ characterem quendam Scoticum tribuit, analogum ei, quo Flora vascularium Norvegiæ occidentalis australioris insignitur.

190. POLYBLASTIA TERRESTRIS, *Th. Fr.*

Hab. species eximia, antehac e Mortensnæs & Fløifjeld indicata, quoque in *Maalselven* ad alpem *Istinderne* supra terminum Betulæ.

191. POLYBLASTIA BRYOPHILA, *Lönr.*

Hab. quoque in *Ofoten* inter *Lidland* & *Lerosen*, sociæ *Aspiciliæ verrucosæ*; in *Salangdal* ad alpes supra *Lund & Holtet*; in *Maalselven* ad *Rostafjeld*; in *Varangria meridionali* ad *Bugönæs*.

192. POLYBLASTIA SENDTNERI, *Krmp.*

Hab., in agro citranordcapensi antehac ad *Skjærstad* indicata, quoque in *Bejeren* prope *Solövand*; in *Gildeskaal* ad *Indyr*; in *Salangdal* ad *Krogen*, ad alpes supra *Lund* &

Holtet; in *Maalselven* juxta fl. Beinelv ad alpes *Langfjeldene*. Variat *fimbriata*: thallo in plagulas parvulas, squamæformes, juxtapositas, ad ambitum reflexum rhizinis densis fimbriatas soluto; nec non *gregaria*: apotheciis passim dense aggregatis, sæpe confluentibus, acervulos nigros discretos constituentibus. Utraque forma sine ullo limite in primariam transit. Differentia inter hanc speciem & præcedentem a colore sporarum sumpta non constans, sæpe contraria; color apothecii in *P. bryophila* pure niger, in *P. Sendtneri* subpruinose lividule niger secundum mea specimina characterem forsitan constantiorem præbere videtur.

193. POLYBLASTIA GELATINOSA (*Ach.*?)

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ Norvegiæ in insula *Tromsö*.

Incerto mihi, num mea species (*P. caliginosa*, m. in hb.)

revera huc pertineat, descriptionem sequentem afferre liceat. *Crusta* muscos vestiens, mediocris, tenuis, e fuscidulo obscure cinerea v. nigricans. *Apothecia* crebra, interdum confluentia, c. 0,3 m. m. lata, semi-immersa, atra, opaca, perithecio globoso, tantummodo ad partem emersam carbonaceo, ostiolo impressiusculo, pertuso. *Sporæ* 8næ, obsoletius loculosæ, 0,024—36 m. m. longæ, 0,015—18 m. m. latæ, contento nebuloso. *Gelatina* jodo saturate purpurascens.

194. POLYBLASTIA INTERCEDENS, *Nyl.*

Hab., antehac e *Mortensnæs* & *Næsseby* indicata, quoque ad *Jakobselv* Varangriæ borealis intra stagnum intimum rivi *Vandelv* ad rupes saxi conglomerati copiose; in *Por-sangriá* prope ostium fluminis *Børselv* ad rupes calcareas; prope *Tromsö* ad alpem *Flöifjeld*; nec non omnino e crustacea in *Sör-Reisen* ad cacumen ipsum alpis *Middagsfjeld*, ibi ad chrystallos granatorum a rupibus micaceo-schistosis dissolutis ortos.

195. POLYBLASTIA TYPOSTOMA, *n. sp.*

Crusta ochracee pallida, tenuis, cum substrato confer-ruminata, contigua v. paullo crassior tenuiter rimulosa. *Apothecia* majuscula, usque ad 1 m. m. lata, substrato incavata; parte dimidia v. tertia v. vertice solo emersa, atra, opaca, rugulosa, globosa v. subdifformia, ostiolo impresso, demum poro hiante pertuso, vulgo umbilico eximio ob marginem v. sulcum ambientem limitato; perithecio integro crasso, amphithecio albedo, nucleo intensius carneo. *Sporæ* ellipticæ obsoletius muriformes, contento sæpe fuscidulo, 0,027—40 m.

m. longæ, 0,015—18 m. m. latæ. *Gelatina* jodo intense cærulescens, dein passim rubens, v. ab initio etiam passim rubens.

Hab. in *Bejeren* ad rupes calcareas dissolutas prope *Solövand*.

196. POLYBLASTIA (*Arthropyrenia*) FALLACIS-SIMA, *Stzb.*

Hab. nov. civ. Floræ Norvegiæ in *Sör-Reisen* ad alpes prope *Gumpendal*, ibi ad eas Betulas nascens, quæ ipsum terminum arborum constituunt. Apothecia sub-elliptica, perithecio fusco (non nigro). Sporæ primum 2-loculares, ad septum primarium paulo constrictæ, loculamentis inæqualibus, pressione facile separandis, mox ob septula secundaria tenuiora murali-divisis, 0,015—18 m. m. longæ, 0,006—7 m. m. latæ. Affinitate naturali & indole primaria sporarum ad *Arthropyrenias* numeranda est, nisi fallor.

197. THELIDIUM SPRUCEI (*Leight.*) * GYMNOHOLUM.

Ad formam primariam characteribus plurimis accedens, sed habitu recedens. *Thallus* cervinus, intus albissimus. *Apothecia* nigra, opaca, subrugulosa, umbilico parvulo impresso, perithecio integro, nunc basi sola nunc dimidia parte immersa. *Sporæ* 0,030—40 m. m. longæ, 0,012—14 m. m. latæ. *Gelatina* jodo pulchre cærulescens, dein per virescentiam rubens. Forma forsitan *Th. incavato* revera affinior & ei subjungenda.

Hab. nov. civ. Flor. arctic. in insula *Tromsö* ad rupes calcareas.

198. THELIDIUM INCAVATUM (*Nyl.*) *Mudd.*

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in *Gildeskaal* ad rupes calcareas prope *Indyr*; nec non in *Throndenæs* ad tractum prædii *Harstadhavn*, ibi latit. bor. attingens 69° 42—43.

199. THELIDIUM IMMERSUM, *Mudd.*

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in *Gildeskaal* ad rupes calcareas prope prædium *pastoris*. Sporæ constanter 2-loculares, 0,020—24 m. m. longæ, 0,010—12 m. m. latæ. *Gelatina* jodo rubens.

200. THELIDIUM ZWACHII (*Hepp.*) *Körb.*

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in insula *Tromsö* ad rupes calcareas dissolutas prope *Sandnæs*, ibi latit. bor. attingens 69° 40—42.

201. THELIDIUM PYRENOPHORUM (*Ach. Nyl.*)

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in *Throndenæs* ad parie-

tes rupium septentrioni expositos, ibi latit. bor. attingens 68° 48—49.

Thallus cinereus v. dissolutus albissimus. *Sporæ* paullo breviores & proportionaliter angustiores quam in speciminibus a rev. Anzi (*Sagedia Borreri*) editis, sc. 0,015—18 m. m. longæ, 0,006—7 m. m. latæ. *Gelatina* hymenii jodo sine ulla cærulescentia præcedente rubens.

202. THELIDIUM ACROGLYPTUM, *Norm.*

Occurrit ad rupem delapsam (seu saxum giganteum) ædiforem in radice jugi inter *Indyr* & *Oldervig*, ultimo loco propioris.

203. SAGEDIA KÖRBERI (*Fr.*); *Körb.*

Hab. nov. civ. Floræ arcticæ in *Gildeskaal* ad rupes micaceo-schistosas prope *prædium pastoris*, ibi latit. bor. attingens 67° 3—5.

204. SPORODICTYON THELEODES (*Smf.*)

Hab., antehac e locis paucioribus indicatum, quoque in *Gildeskaal* ad *prædium pastoris*, ad *Indyr*, prope *Oldervig*; in *Throndenæs* prope *Harstadhavn*; in *Salangdal* prope *Forset*; in *Maalselven* *exteriore* ad *Sandnæs*, *interiore* ad *Traungen* convalis *Dividal*; in insula *Tromsö* passim; nec non in *Finmarkia orientali*, unde antehac non notatum, ad *Jakobselv* Varangriæ borealis prope ostium rivi *Vandelv*, ibi latit. bor. attingens 70° 8—9. Ad rupes graniticas, ut cl. Th. Fries indicat, hanc speciem hætenus non offendi, tantummodo ad calcareas immo dissolutas, micaceo-schistosas nec non arenarias.

205. STAUROTHELE UMBRINA (*Wg.*)

Hab. nov. civ. Flor. arct. Norvegiæ (cfr. Th. Fries L. arct. p. 270) ex. gr. in *Finmarkia continentali* *interiore* ad lapillos inundatos riparum fluminis *Karasjok* ad *Assebakte*, ad *Haldivuovde*, loco ultimo prope ostium affluentis *Jesjok* copiose.

206. VERRUCARIA NIGRESCENS, *Pers.*

Hab., antehac e Nordlandia meridionali & Mortensnæs *Finmarkiæ orientalis* indicata, quoque in *Throndenæs* ad *Harstadhavn*.

207. VERRUCARIA TRACHINODES, *Norm.*

Non in insula *Hadselö* ipsissima occurrit, sed in insula minima littori ejus prope *Melbo* adjacente.

208. VERRUCARIA HYDRELA, *Ach.*

Hab., antehac tantummodo e Saltdalen indicata, quoque in insula *Tromsö* ad saxum in pratum dejectum, ibi latit. bor. attingens 68° 39—40.

209. VERRUCARIA MURALIS (*Ach.*)

Hab., antehac e Saltdalen & Mortensnæs Varangriæ indicata, quoque in *Throndenæs* ad *Harstadhavn* unacum varietate *ferruginosa* Nyl., ex hoc agro non prius notata.

210. VERRUCARIA LIMITATA, *Kmph.*

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in *Throndenæs* ad saxa inundata prope cataractam intra *Harstadskaret*, ibi latit. bor. attingens 68° 48—49. Sporæ c. 0,030 m. m. longæ, 0,012—15 m. m. latæ.

211. VERRUCARIA DUFOUREI, *DC.*

Hab. nov. & inopinata civis Floræ arcticæ in *Salangdal* Nordlandiæ ad alpes supra *Holtet*, ibi, socia *V. plumbeæ*, elevatius supra terminum *Betulæ* nascens, latit. bor. attingens c. 98° 37.

Apothecia paullo minora quam in speciminibus ex Europa meridionali. *Sporæ* longitudinem 0,011 vix superantes, itaque tantum minores speciminum australium æqvantes. Cæterum specimina arctica hisce omnino identica; nec ulla ratione distingvenda a speciminibus ex *Europa media magis boreali* ex. gr. ab eo, quod cl. *Malbranche* (Lich. Normand. No. 97) distribuit. Colore thalli, apotheciis magis emersis, habitu toto, modo habitandi magis quam characteribus definitis a præcedente differt.

212. VERRUCARIA PLUMBEA, *Ach.*

Hab. nov. civ. Floræ arcticæ in *Throndenæs* ad rupes sublittorales prope *Harstad*, ibi latit. bor. attingens 68° 48—49; in *Salangdal* ad alpes prope *Lund & Moholtet* loco altius supra terminum *Betulæ* elevato copiosior & melius evoluta (68° 37).

213. VERRUCARIA FOVEOLATA, *Mass.*

Hab., antehac e Saltdalen & Mortensnæs Varangriæ indicata, quoque in *Gildeskaal* ad *Dal*; in *Throndenæs* ad *Harstadhavn*; nec non in insula *Tromsö* loco suo copiose, (ibi quoque f. *lepadicola*, *Smf.*)

214. VERRUCARIA XYLOXENA, *Norm.*

Occurrit ad extremitates trabium, e quibus ponticuli fossarum in viis *Tromsøensibus* constructi sunt, quæ trabes

pulvere calcareo & argillaceo viarum conspurcantur. Hac re fit, ut lichen, etsi lignicolus, substantiis anorganicis copiosius fruatur, nec ratione chemica tam absolute organicolus sit, ut opinari facit.

215. VERRUCARIA CONDUCTRIX, *Norm.*

Apothecia speciei parasiticæ semel lectæ nec denuo re-pertæ recentia nitidula in herbario opaciora fiunt.

216. THROMBIUM EPIGÆUM (*Pers.*)

Hab. nov. civ. Flor. arct. Norvegiæ in *Sör-Reisen* ad *Lyshoug* convallis *Skoelvdal*; in *Maalselven* ad *Moen* & alibi prope viam; nec non in insula *Tromsö* passim copiose (anno 1867 quidem), ibi latit. bor. attingens 69° 40–43.

Observandum est, hunc lichenem ut quoque *Lecideam geophanam* in hoc tractu quidem per paucos annos tantum vigere (bi-triennes), dein a vegetatione alia vulgo muscosa sæpe expelli & opprimi. Ubi terra constructione viarum, erutione fossarum, demolitione propter fluxum fluminum denudatur, hi lichenes post tempus quoddam brevius apparent, sæpe copiosi, plagas vastas mere vestientes. Vegetatio autem alterat. Lichenes majores & præcipue musci loca eadem occupant & tam dense tegunt, ut vestigium primi coloni vix detegi possit.

217. ARTHROPYRENIA FUMAGO (*Walr.*)

Hab. quoque eximie evoluta ad Alnos in isthmo *Kvæfjordeidet* Nordlandiæ.

* A. RHYPONTA (*Ach.*) *Körb.*

Hab. nov. forma Flor. arct. Norvegiæ in *Maalselven* ad *Bakkehoug*; in *Tanaffjord* ad *Store-Lerpollen*, utroque loco ad Salices, ultimo latit. bor. attingens 70° 26.

218. * A. FALLAX (*Nyl.*) quoque in hoc agro lecta est.

219. LEPTORHAPHIS ALBISSIMA (*Ach. Nyl.*)

Hab., antehac e Nordlandia meridionali & Nyborg Finmarkiæ orientalis indicata, quoque in *Vesteraalia* ad insulam *Hadselö* (*Stokmarknæs*). Verisimiliter in hoc agro *Arthro-pyreniâ* Betulæ & seqvente specie rarior est.

220. LEPTORHAPHIS TREMULÆ, *Körb.*

Hab., antehac e Saltdalen & Polmak indicata, quoque in *Bejeren* prope *Heminghyt*; in *Gildeskaal* ad prædium *pastoris*; in tractu littorali exteriore ad *Hadselö* *Vesteraaliæ*; in *Salangdal* ad *Forset*; in *Maalselven* ud *Moen*, ad *Rub-*

ben partis intimæ convallis *Bardu*; in *Balsfjord* ad *Myre*; in *Skjervö* ad partem mediam convallis *Reisendal*; in *Varangria meridionali* juxta fl. *Pasvigelv*; præterea in *Finmarkia continentali* interiore juxta fl. *Karassjok* frequenter ex. gr. ad *Haldivuorde*, ad *Assebakte*.

221. MICROTHELIA MICULA (*Fr.*)

Hab., antehac in Tanen a *Th. Fries* parce lecta, quoque in *Maalselven* passim ex. gr. ad *Bakkehoug*; in *Salangdal* ad *Krogen*, ad *Forset*, his locis omnibus ad Alnos præcipue ad eas, quæ fluxu fluminum inundantur & sedimento terreno conspurcantur. Specimina legi, ubi apothecia hujus speciei per crustam *Pertusariæ leioplacæ* crebre erumpunt, speciem Endococci simulantes, & tum, quod consideratione dignum videtur, gelatinam hymenii jodo sæpius etsi levissime cærulescentem offerunt. In nostris speciminibus paraphyses sat distinctæ haud raro obveniunt. Sporæ 0,015—18 m. m. longæ. Quoad observationem & conjecturam ei fundatam cli *Körber* de dehiscencia apotheciorum, notare liceat, apothecia in hoc agro frequenter poro manifesto immo hiante dehiscere.

222. MICROTHELIA BETULINA (*Lahm.*)

Forma populicola. *Thallus* macula hypophloeode alba manifesta notatus. *Apothecia* hemisphærica, ostiolo demum impressiusculo tenuiter pertuso, usque ad 0,28 lata, aureola nulla v. obsolete cincta. *Paraphyses* ramosæ magis minusve distinctæ. *Sporæ* 5næ—8næ, 0,009—13 m. m. longæ, loculamentis vulgo æqualibus.

Hab. nov. civ. Flor. arct. Norvegiæ in *Gildeskaal* ad *Populus* prope *Skovvold*.

223. MICROTHELIA ATRAMENTEÆ, *Norm.*

Prædiligit schistos a rupibus solutos ad loca paullo umbrosa (a *Betulis* fruticulosis inumbrata). Loco indicato copiosa est. Forsitan varietas *M. scopulariæ Nyl.*, cujus specimen non observare licuit.

224. ENDOCOCCUS PYGMÆUS (*Körb.*)

Hab., antehac e *Finmarkia* orientali ut frequens sine locis specialibus indicatus, quoque in *Throndenæs* ad *Seljestad*; in *Salangdal* ad alpes prope *Lund*; in *Sör-Reisen* ad alpes prope *Gumpendal*; in insula *Tromsö* supra *Lecideas* & *Placodium albescens* passim frequens; ad *Havösund* *Finmarkiæ* occidentalis; ad *Jakobselv* *Varangriæ* borealis.

Forma heterospora. *Apothecia* magnitudine f. prima-

riæ, ad partem tertiam v. dimidiam v. fere tota denudata, ostiolo sæpe impressiusculo. *Sporæ* numerosæ & quoad formam & quoad magnitudinem in eodem apothecio variabiles, 0,004—6—7 immo 0,010 m. m. longæ, nunc ellipticæ v. fusiformes v. dacryoideæ, nunc subglobosæ, raro omnino difformes, septo tenui biloculares v. frequenter simplices, vulgo dilutius fusæ. *Gelatina* jodo primum lutescens, mox rubens. Hab. in *Gildeskaal* ad *Indyr* supra crustam sterilem albam (vix propriam, verisimiliter ad *Rhizocarpon albo-atrum* β . *margaritaceum* pertinentem). Quod hæc forma de usu cautione minutiarum formæ sporarum ratione systematica admo- neat, huc non pertinet.

* E. VENTOSICOLUS, *Mudd.*

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in *Gildeskaal* ad *prædium pastoris*; in insula *Tromsø* prope *Sandnæs*. Vix specie differt ab E. pygmæo, qualis in hoc agro evadit. In specimenibus parce lectis sporæ sæpe non majores quam in E. pygmæo; color earum saturatius brunneus interdum quoque in hoc observatur, sed differt non tantummodo ascis submaturis obovato-clavatis, sed præcipue gelatina hymenii jodo cærulescente.

225. ENDOCOCCLUS GEMMIFER (*Tayl.*)

Hab., antehac e Finmarkia orientali indicatus, quoque in *Gildeskaal* ad *prædium pastoris*; in *Throndenæs* ad *Harstadhavn*; in insula *Tromsø*; in *Varangria boreali* ad *Jakobselv*.

226. ENDOCOCCLUS CALCARICOLUS (*Mudd.*)

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in *Gildeskaal* ad *Indyr* copiose; in *Throndenæs* ad tractum prædii *Harstadhavn*, ibi latit. bor. attingens 68° 48—49.

227. ENDOCOCCLUS COCCISPORUS, *n. sp.*

Thallus nullus. *Apothecia* vulgo crebra, summo vertice solo v. vix magis quam tertia parte emersa, 0,11—20 m. m. v. paullo ultra lata, atra, perithecio integro globoso, vertice applanato, ostiolo sub microscopio manifeste pertuso (poro 0,020—24 m. m. lato). *Sporæ* 8næ, typice late ovales, quadriloculares, loculamento vulgo unico, nunc intermedio nunc terminali, longitudinaliter uniseptato haud raro submurales, 0,06—8 m. m. longæ, 0,04—5 m. m. v. paullo ultra latæ. *Gelatina* hymenii per flavescientiam sordidule rubens.

Hab. parasitans in *Pyrenopside hæmalea terricola* in *Sör-Reisen* ad alpes prope *Östgaard* convallis *Gumpendal*.

Sporæ loculamenta terminalia intermediis vulgo breviora, immo brevissima ægre distingvenda. Septa linea latiore obscura notata.

COLLEMACEI.

228. COLLEMA QVADRATUM, *Lahm.*

Hab. in insula *Tromsö* ad *Salices*.

229. LEPTOGIUM SATURNINUM (*Dicks.*)

Hab. quoque in insula *Rollen* ad *Ibbestad*; in *Maalselven* ad *Bangen* convallis *Bardu*, ad *Moen*, ad *Bjerkeng*, ibi fructificans latit. bor. attingens 68° 54—55. Sporæ maturæ non visæ.

230. SYNALISSA SYMPHOREA (*D C.*)

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in *Gildeskaal* ad rupes calcareas sublittorales prope *Indyr*, sæpe socia *Thalloidimatis rimulosi*, quod interdum in ipso thallo *Synalissæ* nascitur. Ad rupes ejusdem tractus *Psora lurida* copiosior quam alibi agri visa.

231. PYRENOPSIS GRANATINA (*Smf.*)

Hab. quoque remotius a littorali locis supra mare altius elevatis ex. gr. in *Sör-Reisen* ad alpes prope *Östgaard* convallis *Gumpendal* elevatius supra terminum *Betulæ*; in *Maalselven* ad latera alpibus *Rostafjeld*, ibi quoque in regione humiliore ad *Divimo*, ad *Moen*. In tractu littorali quoque ad insulam *Tromsö*.

232. PYRENOPSIS HÆMALEA (*Smf.*)

Hab. lichen rarus, antehac e *Saltdalen* & *Hammerfest* indicatus, quoque in insula *Hadselö* supra *Melbo*; nec non ut f. *terricola* disco apothecii pallidior in *Sör-Reisen* ad alpes prope *Gumpendal* in vicinia termini *Betulæ*.

233. PYRENOPSIS HÆMATOPIS (*Smf.*)

Hab., antehac in *Saltdalen* a *Sommerfelt* lecta, quoque in *Salangdal* ad alpes prope *Lund* (latit. bor. c. 68° 37).

234. PHYLLISCUM ENDOCARPEOIDES, *Nyl.*

Hab. quoque in *Gildeskaal* ad *Indyr*; in *Bejeren* interiore supra *Heminghyt*; in *Maalselven* prope ostium fluminis; nec non in insula *Tromsö*.

235. LICHINA CONFINIS (Müll.)

Hab. quoque in *Gildeskaal* ad *Dal*; prope ostium fluminis *Maalselven*; in insula *Tromsø* suo loco copiose.

PSEUDOLICHENES.

236. SCUTULA KREMPELHÜBERI, *Körb.*

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in *Throndenæs* ad tractum prædii *Harstadvavn* supra thallum *Solorinæ saccatæ*. Apothecia usque ad 0,45 m. m. lata. Sporæ 0,017—19 m. m. longæ. Gelatina hymenii post cærulescentiam levissimam rubens.

237. ABROTHALLUS SMITHII, *Tul.*

Hab., antehac in *Saltdalen* a *Sommerfelt* lectus, quoque in *Maalselven* interiore ad *Bjeikeng* (supra thallum *Parmeliæ saxatilis*), ibi latit. bor. attingens 68° 54—55.

238. CELIDIUM STICTARUM, *Tul.*

Hab. quoque in *Ofoten* ad *Evenæs*; in *Maalselven* ad *Tagelvdal*, ibi ut *var. nephromea*, in pagina superiore thalli *Nephromatis levigati* parasitans, bullas patelliformes sat regulares 1—2 m. m. latas efficiens, minutis paucis exterioris & interioris a primaria paullo recedens, ut parasitum nutricem insolitam infestantem decet.

239. NESOLECHIA PUNCTUM, *Mass.*

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in *Maalselven* supra thallum *Cladoniæ*, nulla ratione a specimine *Massalongiano* differens.

240. LECIOGRAPHA PARASITICA, *Mass.*

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in *Gildeskaal* ad *Indyr* supra thallum *Dermatocarpî miniati*. Apothecia numerosa in accervulos usque ad 3 m. m. v. ultra latos dense conglomerata, sæpe confluentia, demum interdum in pulvinulos cerebriformes luxuriantia. Margo apothecii sæpe elevatior & hypothecium crassius quam in specimine *Massalongiano*, cui similis est quoad characteres interiores. Sporæ, ut in hoc, 0,015—16 m. m. longæ, c. 0,005 m. m. latæ. Gelatina hymenii jodo saturatius fusco-rubens.

241. POLYCOCCUM SAUTERI, *Körb.*

Hab. nov. civ. Flor. arcticæ in *Lapponia Fennica* juxta fl. *Tanaelv* prope *Storfossen*, loco paullo supra mare elevato, infra terminum *Pini* sito.


Ibi occurrit ut forma *margarcdes*: cephalodia vulgo

tota Stereocauli alpini, tum tumentia & albescentia (in herbario cinerascens v. fuscescens) occupans, apotheciis dense juxta positis immersis, tantum vertice denudatis. Quoad characteres internos non a primaria recedit, quæ ipsa in hoc agro quoque occurrit, si ab inspectione externa judicare liceat.

EXPLICATIO FIGURARUM.

Fig. 1. ($\frac{1}{1}$).

- 2. ($\frac{1}{1}$). E nodo radicali secundario (n. r. s.) tres proembryones rameæ („Zweigvorkeim“ Pringsh.)
- 3. Individuum juvenile ($\frac{6}{1}$); a, p. = apex proembryonalis.
- 4. Folium ($\frac{40}{1}$).
- 5. Pars superior sporophyæ junioris ($\frac{140}{1}$); c = coronula, 10-cellularis.
- 6. Sporophyas submaturus, coronula amissa ($\frac{64}{1}$).



Thronøhjem.

Tolypella Normaniana.
(Nov. spec. O. Nitt.)

Schult. Lith.



P. 60:1
S. 4